M. DEGUY

CONSULTATIONS ET FORMULAIRE

DE

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

1910

Laboratoires CLIN

COMAR & Cie

20, Rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

VIN NOURRY

IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin

GOUT AGRÉABLE, ASSIMILATION PARFAITE

Cinq centigrammes d'Iode
Dix centigrammes de Tanin } par cuillerée à soupe.

Indications : **Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile.**

DOSES : Adultes, une cuillerée à soupe
Enfants, une cuillerée à café } aux repas

SIROP D'AUBERGIER

AU LACTUCARIUM

A base de Lactucarium d'Auvergne (fournie par la laitue géante). *Possède les propriétés sédatives et calmantes de l'opium sans en avoir les inconvénients.*

...nsomnies

...ffé par jour

22102165189

Med
K46351

HUNYADI JÁNOS
dite EAU DE JÁNOS
Le Purgatif des Familles
LA REINE
des Eaux Purgatives Naturelles
Exiger le nom :
Andreas SAXLEHNER Budapest
Se méfier des Contrefaçons et Substitutions

PEPTONE CATILLON

Adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine.

En POUDRE : *Produit* supérieur, pur, inaltérable, agréable au goût, *représentant* 10 *fois son poids de viande de bœuf.*

ON NE PEUT PLUS NUTRITIF ET ASSIMILABLE :

1 cuiller dans un grog, du lait sucré ou du bouillon

En liquide : *représentant 3 parties de viande de bœuf assimilable.*

Lavement nutritif : *2 cuillers, 3 g. laudanum, 125 eau, 1 jaune d'œuf.*

Aliment des malades qui ne peuvent digérer ou qu'on veut suralimenter. Remplace la viande crue, fait tolérer le régime lacté.

On nourrit ainsi tous les malades malgré la fièvre, ils résistent mieux et on abrège la convalescence.

VIN DE PEPTONE CATILLON

30 gr. viande et 0,40 glycéro-phosphates par verre à madère

Rétablit les **FORCES, l'APPÉTIT, les DIGESTIONS**

Très utile à tous les débilités : Enfants, Convalescents, Maladies d'Estomac, d'Intestin, Consomption, Anémie, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, CRÉTINISME, GOITRE, etc.

TABLETTES DE CATILLON

0 gr. 25 de corps

THYROÏDE

Titré stérilisé

Goût agréable — Tolérance parfaite — Efficacité certaine.

1 à 2 contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obésité, Goitre, etc — PRIX : **3** fr.

Médaille d'Or Expos. Univers. Paris 1900.

Granules de Catillon

à 0,001 **Extrait Titré** de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine de Paris en 1889. Elles prouvent que 2 à 4 par jour produisent une **diurèse rapide,** *relèvent vite le* **cœur affaibli,** *atténuent ou dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards.

Effet immédiat, innocuité, ni intolérance, ni vasoconstriction, on peut en faire un usage continu.

On peut, en cas urgent, donner 5 et 12 Granules d'extrait pour activer la Diurèse

Granules de Catillon

à 0,0001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

Tonique du Cœur par excellence, non diurétique.

TOLÉRANCE INDÉFINIE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON,

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

3, Boul[d] St-Martin, Paris ET P[ies].

Grande Librairie Médicale

A. MALOINE

25-27, Rue de l'Ecole de Médecine

PARIS

Grand assortiment de livres de médecine. Vente avec réduction et franco de port et d'emballage. (Pour les expéditions à faire par **poste recommandée** 5 % seulement en plus du prix net).

Catalogue Bibliographique gratuitement et franco sur demande.

CHAILLOU. *Hygiène générale d'une crèche*, in-18, avec figures, 1908. 2 fr. 50, net 2 fr. 25

CONTANT. *Autour du berceau.* La natalité en France, mortalité des enfants en bas-âge, l'allaitement artificiel rendu salutaire, in-12, 1896. 2 fr. 50, net 2 fr. 25

DONNADIEU. *Pour lire en attendant Bébé*, conseils aux jeunes mères, préface du Dr Budin, 4e édit. revue et augmentée, in-18 cart., 1907. 2 fr. 75, net 2 fr. 50

« J'ai, nous dit l'auteur, essayé, sous une forme moins scientifique que pratique, de mettre au service des jeunes mamans les réflexions suggérées par quatorze années de pratique médicale dans un milieu où le prestige de l'uniforme rehausse les titres scientifiques et nous vaut une confiance absolue, confiance sans laquelle on ne peut faire ni clinique, ni thérapeutique, ni hygiène ».

C'est ainsi qu'il a réuni dans une série de onze « visites » ou causeries, tous les conseils nécessaires aux jeunes mères pour élever leurs enfants sans avoir recours ni à des méthodes compliquées, ni

à l'usage d'aucun remède, mais en suivant simplement les voies de la nature.

Instruire en amusant, tel est le but qu'il s'est certainement proposé, et comme l'atteste le professeur Budin, dans la préface dont il a honoré son livre, il a pleinement réussi. Aussi en recommande-t-il la lecture à tous ceux qui espèrent en la venue prochaine d'un enfant ; dans ces pages tout à fait vivantes, ils trouveront réunis l'utile et l'agréable.

FUMOUZE-ALBESPEYRE. *Le livret de l'enfant,* in-8, avec fig. 6 fr. net — 5 fr. 50

GASTOU. *Hygiène et pathologie cutanées du premier âge,* in-8, 1905, avec 13 pl., 7 fig. 4 fr. net — 3 fr. 50

GASTOU. *Le coryza syphilitique,* rhinopharyngite purulente, septico-pyohémique chez les nouveaux-nés syphilitiques, in-8, 1904. 2 fr. net — 1 fr. 75

MANTEL. *Pour les mamans.* Guide médical pratique, in-8, cart. 1906. 5 fr. net — 4 fr. 50

***MOLL-WEISS** (Mme A). *La femme, la mère, l'enfant.* Guide à l'usage des jeunes mères, préface de M. le Dr Morache, in-8, cart.. 3e édit., 1909. 2 fr. 50 net — 2 fr. 25

Ce petit volume, destiné aux jeunes femmes qui vont devenir mères, est vraiment des plus utiles en même temps que des plus intéressants. Il renferme tous les renseignements dont la femme enceinte ou la mère peuvent avoir besoin. Il trace une ligne de conduite à celles qui n'ont jamais eu d'enfants et donne, à celles qui, déjà mères, désirent mieux connaître l'importance de leur rôle maternel et l'étendue de leurs devoirs, une foule de renseignements précieux.

MOLL-WEISS (Mme A.). *L'alimentation de l'enfant* de 2 à 6 ans dans la famille et à l'école maternelle, in-18, 1909. 2 fr. net — 1 fr. 75

APERT. *Traité des maladies familiales et congénitales,* préface de M. le professeur Dieulafoy, in-8, 1907, avec 95 fig. 7 fr. net — 6 fr. 25

APERT. *Les enfants retardataires,* in-16, 7 fig. (*Actualité médicale*). 1 fr. 50 net — 1 fr. 35

APERT et **MARFAN.** *Précis des maladies des enfants.* in-8, 1909, avec 76 figures. 10 fr. net — 9 fr.

AUSSET, professeur agrégé à Lille. *Leçons cliniques sur les maladies des enfants, faites à l'hôpital Saint-Sauveur,* 1896-97. 1897-98, 1898-99, 3 vol. in-8. 15 fr. net — 13 fr. 50

Les 2e et 3e séries se vendent séparément au prix de 5 fr. net 4 fr. 50

L'école des Bretonneau, des Louis et des Trousseau, si fertile en enseignements pratiques, et qui consiste à classer dans des leçons cliniques les différents chapitres de la pathologie humaine, est de plus en plus abandonnée. Tandis que les ouvrages didactiques, les manuels, les traités de pathologie schématique se succèdent et se multiplient, nous rencontrons rarement un chef de service qui **recueille au jour le jour des observations pour les couler dans le même creuset nosologique et en présenter un ensemble parfaitement classique et intéressant.** C'est ce que M. Ausset a cherché à réaliser dans un ouvrage **aussi riche en observations cliniques qu'en indications thérapeutiques.**

AUSSET. *Eléments d'hygiène infantile* à l'usage des établissements d'éducation des jeunes filles. Préface du professeur Budin, in-18, 1906, cartonné. Net 1 fr.

CALOT. Le traitement de la *coxalgie*, in-12 rel., 1895, avec 41 fig. 5 fr. net 4 fr. 50

CALOT. *Technique du traitement de la coxalgie*, avec 178 figures, in-8, 1904. 7 fr. net 6 fr. 25

CALOT. *Technique du traitement de la luxation congénitale de la hanche*, in-8, 1905, 206 fig. et 5 planches. 7 fr. net 6 fr. 25

CALOT. *Technique du traitement des tumeurs blanches*, in-8, 1906, avec 199 fig. dans le texte. 7 fr. net 6 fr. 25

CALOT. *Traitement rationnel du mal de Pott*, à l'usage des praticiens, in-8, 1906, 120 fig. 3 fr. net 2 fr. 75

CALOT. *L'orthopédie indispensable aux praticiens*, in-8, avec 874 fig. 1910, cart. 3e édit. 20 fr. net 18 fr.

CHIPAULT. *Manuel d'orthopédie vertébrale*, in-18, 1904. 4 fr. net 3 fr. 50

Le livre que vient de publier le Dr Chipault sur l'orthopédie vertébrale, c'est-à-dire sur le traitement des fractures vertébrales, de la scoliose, du mal de Pott, ces affections si communes, est essentiellement un manuel, c'est-à-dire un livre pratique. D'une clarté parfaite, abondant en détails précis et complets, il ne pouvait être écrit avec cette netteté que par un spécialiste ayant de l'orthopédie vertébrale une expérience personnelle aussi étendue que le Dr Chipault qui, on le sait, est un maître incontesté en la matière.

GILLET. Formulaire pharmaceutique des *maladies infantiles* et *indications hydro-minérales*, in-18, 2e édit., 1907. 4 fr. 75, net 4 fr. 25

GRANCHER, COMBY. *Traité des maladies de l'enfance*, 2e édit., 1905, 5 vol. in-8. 112 fr. net 100 fr.

Tome I. Physiologie et hygiène. Maladies infectieuses. Maladies générales de la nutrition. Intoxication. 22 fr. net 20 fr.

Tome II. Tube digestif, pancréas, péritoine, foie, rate, capsules surrénales. Maladies génito-urinaires, 1904, in-8. 22 fr. net 20 fr.

Tome III. Appareil respiratoire, appareil circulatoire, in-8, 1904. 22 fr. net 20 fr.

Tome IV. Système nerveux, système musculaire, maladies de la peau. 22 fr. net 20 fr.

Tome V. Maladies du fœtus et du nouveau-né, maladies chirurgicales. Thérapeutique, in-8, 1905. 24 fr. net 22 fr.

HECKER, TRUMP, APERT. *Atlas manuel des maladies des enfants*, in-16, 1906, 48 pl. col. et 174 fig. Relié souple. 20 fr. net 18 fr.

HUTINEL (V.). *Les maladies des enfants*. 5 forts volumes gr. in-8, avec figures en noir et en couleurs, planches hors texte. 100 fr. net 90 fr.

Tome I. Généralités. Hygiène infantile. Maladies infectieuses. Collaborateurs : MM. Lesné, Louis Martin, Darré.

Tome II. Infections chroniques. Paludisme. Rhumatismes. Maladies du sang. Maladies de la nutrition. Collaborateurs : MM. Pierre Lereboullet, Bigard, L. Tixier.

Tome III. Maladies de l'apparcil digestif, du foie, des reins et des organes génitaux. Intoxications. Collaborateurs : MM. Nobécourt, P. Merklen.

Tome IV. Maladies de l'appareil respiratoire, de l'appareil circulatoire et de la peau. Collaborateurs : MM. Paisseau, Vitry, G. Leven, Jeanselme.

Tome V. Maladies du système nerveux. Collaborateurs : MM. Babonneix, Roger Voisin.

MESNARD. *Attitudes vicieuses et déviations vertébrales*. Principes relatifs à leur traitement par la gymnastique orthopédique et les appareils, in-8, 1909. Net 1 fr.

MONIN. *Médecine de l'Enfance* jusqu'à l'adolescence, in-18, cart., 1905. 5 fr. net 4 fr. 50

Ce livre contient les données les plus essentielles relatives à la médecine infantile, jusqu'à l'adolescence. La puériculture y est comprise d'une manière nouvelle et originale. L'éloge du style précis et coloré de l'auteur, dont le talent littéraire agrémente les sujets les plus ardus, n'est plus à faire. Aussi recommandons-nous spécialement ce volume à ceux qui sont soucieux de traitements développés avec le plus grand flair par le thérapeute.

Produits organiques de F. VIGIER

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

FARINE ALIMENTAIRE VIGIER

Nutrition des Enfants en bas âge, Allaitement insuffisant, Sevrage.

Les Enfants sont *très friands* de cette préparation qui, essentiellement *nutritive*, constitue un *excellent aliment* et permet de leur faire absorber une grande quantité de lait. Elle convient également aux *convalescents, malades, dyspeptiques*, etc.

BORO-BORAX VIGIER

1 ou 2 cuillerées à bouche dans un litre d'eau, COMME ANTISEPTIQUE pour les soins de la bouche, toilette intime, lavage des blessures, plaies, etc. Prix de la boîte : 3 fr. franco.

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE

des Troubles de la Ménopause et de la Castration, des Troubles de la Puberté, du Retard des Règles, de l'Aménorrhée Dysménorrhée, de l'Ostéomalacie, des Maladies Nerveuses, de la Maladie de Basedow, par les

Capsules Ovariques Vigier

Chaque Capsule contient **0.20 centigr.** de substance ovarienne pure.

Capsules de Corps Thyroïde VIGIER, à 0 gr. 10 — *Obésité*. Myxœdème. — *Fibrome*. Métrorrhagie — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, Rhumatismes, Sénilité.

Capsules Surrénales Vigier, à 0 gr. 25. — Maladie d'Addison. Diabète insipide. Myocardite scléreuse (Arythmie), Rachitisme.

Capsules Hépatiques Vigier, 0 gr. 30, contre la Cirrhose, Ictère, etc.

Capsules Orchitiques Vigier, à 0 gr. 20 — Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile, Impuissance.

Capsules de Thymus Vigier, à 0 gr. 30. *Chlorose*, Aménorrhée. Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade, pour le développement des seins.

Capsules Pancréatiques Vigier, à 0 g 50 contre le Diabète (Calme la soif).

Capsules Spléniques Vigier, à 0 gr 30 de rate, contre : Cachexie palustre Anémie, etc.

Capsules Prostatiques Vigier, à 0 g 20 contre les Maladies de la Prostate.

Capsules Galactogènes, à 0 gr. 30 de placenta, pour activer la sécrétion lactée

Capsules Rénales, à 30 c. de rein. - Albuminurie, Néphrites, Insuffisance urinaire.

Capsules de rétine, à 0 gr. 10 de rétine — Insuffisance rétinienne, Rétinite pigmentaire.

Ces diverses capsules s'administrent à la dose de 2 à 6 par jour.

Traitement de la Syphilis par les injections mercurielles intra-musculaires VIGIER

Huile grise stérilisée Inodore Vigier à 40 0/0 (Codex 1908).

Seringue spéciale du Dr Barthélemy et Vigier pour injections d'huile grise.

Huile au calomel indolore Vigier à 0 gr. 05 par cmc.

Huile au bi-iodure de mercure Indolore Vigier à 0 gr. 01 par cmc.

Huile de Sublimé Vigier à 1 cgr par cmc

Emplâtre caoutchouté au calomel de Quinquaud contre la syphilis de l'enfance.

RIGOUREUSEMENT EXEMPT DE TOUS GERMES NOCIFS

SUC PUR INALTÉRABLE
DE VIANDE DE BŒUF CRUE
ASSOCIÉ AUX DIASTASES OXYDANTES DU PLASMA SANGUIN



MUSCULOSINE
BYLA

LE FLACON
500 cm3
8 FRANCS
LE ½ FLACON
250 cm3
4 Fcs 50

PLASMA MUSCULAIRE
AU MAXIMUM DE PURETÉ
& D'ACTIVITÉ PHYSIOLOGIQUE
CONTROLÉES

LES ÉTABLISSEMENTS BYLA JEUNE
GENTILLY (SEINE)
AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS ORGANIQUES

Coaltar Saponiné Le Beuf

Désinfectant — Cicatrisant

Admis dans les Hôpitaux de la Ville de Paris

Très efficace dans les **Maladies des Enfants** (*Angines couenneuses, stomatites, dartres, etc.*). Ses qualités assainissantes et toniques le rendent d'autant plus incomparable dans l'**Hygiène de la toilette**, qu'il n'est ni irritant, ni vénéneux (*lavage des nourrissons, soins de la bouche, de la chevelure, etc.*).

DANS LES PHARMACIES

PRODUITS IODURÉS & BROMURÉS
SOUFFRON

Iodure de Potassium ou de Sodium CHIMIQUEMENT PUR

Solution Souffron à 1/15. — Une cuillerée à potage contient 1 gr. KI ou NaI.
Sirop Souffron à 1/20. — Une cuillerée à potage contient 1 gr. KI ou NaI.
Dragées Souffron dosées à 0 gr. 25 centigr.

Iodure bi-ioduré CHIMIQUEMENT PUR ($KI + HgI_2$)

Solution bi-iodurée Souffron ($KI + HgI_2$) Une cuillerée à potage contient KI, 1 gr. + HgI_2, 1 cent.
Dragées bi iodurées Souffron. — Une dragée contient KI, 0 gr 25 + HgI_2, 2 milig. 1/2

Notre solution bi-iodurée, *plus forte que les préparations similaires, ne porte pas sur l'étiquette les mots* : Mercure, Hydrargyre, Syphilis, etc. ; *elle évite toute suspicion.*

Bromure de Potassium ou de Sodium CHIMIQUEMENT PUR

Solution Souffron 2/15 — Une cuillerée à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.
Sirop Souffron 2/20. — Une cuillerée à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

Laboratoire SOUFFRON, 10, Rue Delaborde, PARIS
Détail : Pharmacie, 58, rue Miromesnil, PARIS

Alimentation des Enfants

BABEURRE DE LAIT FRAIS, STÉRILISÉ.

Tiré du lait frais, non aigri. Stérilisé. Se conserve. S'administre en nature ou sert à preparer des bouillies.

Le flacon de 300 gr..... fr. **0.35**

LAIT HUMANISÉ, par le procédé du Pr Backhaus

Le lait N° 1, aussi digestible que le lait d'ânesse, et le lait N° 2, relativement plus riche, constituent, avec le lait stérilisé pur, une gamme d'aliments appropriés aux différents âges pour l'enfant normal, aux degrés de tolérance digestive pour l'enfant malade.

Se vend en bouteilles de 125 gr. (fr. **0.25**), 300 gr. (fr. **0.55**) et 600 gr. (fr. **0.65**).

LAIT STÉRILISÉ.

La stérilisation, pratiquée immédiatement après la traite, sur un produit de qualité parfaite, a été conduite de manière à ménager au maximum la constitution chimique délicate du lait ; la saveur conservée en témoigne. Se vend en bouteilles de 300 gr. (fr. **0.45** et 600 gr. (fr. **0.55**).

LAIT ÉCRÉMÉ STÉRILISÉ.

Le lait écrémé est recommandé, notamment par le M le Prof. Gilbert, chez les sujets (hépatiques en particulier) digérant mal les graisses.

Se vend en bouteilles de 1 litre (fr. **0.60**), 600 gr. (fr. **0.45**) et 300 gr. (fr. **0.35**).

KÉFIN-CARRION.

Nos 1, 2 et 3 d'une digestion plus facile que le lait, employé en thérapeutique infantile dans certaines entérites.

Le flacon de 250 gr..... fr. **0.35**

H. CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

CONSULTATIONS ET FORMULAIRE

DE

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

5530

CONSULTATIONS ET FORMULAIRE

DE

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

PAR

LE Dr M. DEGUY

Ancien interne des Hôpitaux de Paris

Ancien Chef de Laboratoire à l'Hôpital des Enfants Malades

PARIS

DIRECTION :
9, Rue d'Assas, 9

A. MALOINE, Éditeur
25 et 27, Rue de l'École-de-Médecine

1910

WELLCOME INSTITUTE
LIBRARY
Coll. welMOmec
Call No.

AVANT-PROPOS

I. — Nous avons ramené toutes nos formules à la Posologie en volume qui est la seule rationnelle et permet, par un calcul très simple, de savoir la teneur en principes actifs des cuillerées de sirop formulées. Il suffit de retenir les données suivantes :

La cuiller à soupe contient	*15*	*cmc.*
» *à entremets* »	*10*	»
» *à café* »	*5*	»
Un verre à liqueur contient	*30*	*cmc.*
» *madère* »	*50*	»
» *bordeaux* »	*70*	»
» *ordinaire* »	*150*	»

La manière de calculer est très simple. Supposons, en effet, la formule suivante :

Iodure de potassium.....	*6 gr.*
Eau.....	*50 gr.*
Sirop d'écorces d'oranges. q. s. pour 90 cmc.	

Nous voyons de suite que cette potion contient :

90 : 15 = 6 cuillerées à soupe
90 : 10 = 9 » entremets
90 : 5 = 18 » café

La cuillerée à soupe contient donc :
6 gr. : 6 = 1 gr. de iodure de potassium ;
à entremets :
6 gr. : 9 = 0.66 centig. de iodure de potassium ;
à café :
6 gr. : 18 = 0.33 centig. de iodure de potassium.

On comprend ainsi l'avantage de cette notation, car elle n'a pas à tenir compte du poids, ni de la densité du véhicule employé, et on peut, en se basant sur le seul volume, savoir la dose exacte du médicament formulé.

II. — Pour les doses moyennes que nous avons indiquées, nous nous en sommes presque toujours tenu aux doses maniables, non dangereuses, souvent plus faibles que celles qu'il est possible d'administrer, lorsqu'on en a l'expérience. Mais nous nous hâtons de faire remarquer que : 1° les doses de médicaments peuvent être changées selon le gré et l'expérience du médecin. 2° Il n'y a pas forcément progression parallèle entre l'augmentation des doses de médicaments, et l'âge de l'enfant. Tels médicaments peuvent s'administrer aux

mêmes doses à 2 et à 10 ans, et donner des résultats également satisfaisants. D'autre part, dans « **un médicament, il y a plusieurs médicaments** » *et la dose en peut varier selon l'effet recherché et désiré.*

III. — Quand la posologie, dans ce formulaire, est exprimée en gouttes, elle correspond aux gouttes du **compte-gouttes normal** *et non aux gouttes comptées au bonchon ou au moyen de certains flacons compte-gouttes très souvent employés dans le commerce, et dont* **une** *goutte* **égale** *souvent deux gouttes du compte-gouttes normal.*

IV. — Les abréviations de notre livre sont les suivantes :

(D. S. A.) = Doses selon l'âge.
(Q. S.) = Quantité suffisante.

V. — On pourra remarquer que, dans notre formulaire, il y a très peu de noms propres cités et ceci a été voulu ; d'abord, pour permettre une clarté plus grande, ensuite parce que la grande majorité des formules n'a pas été copiée simplement dans les livres antérieurement publiés.

Toutefois, nous nous faisons un devoir de mentionner les sources auxquelles nous avons puisé, où nous avons trouvé des idées, des renseignements, ou une direction ; ce sont : a) l'excellent

livre de notre ami Brissemoret. « Essai sur les préparations galeniques, chez Dausse, Paris, 1908 » ; b) Les drogues usuelles par Brissemoret et Joanin (Doin, éditeur, 1898) ; c) Formulaire des principales spécialités de Parfumerie et de Pharmacie, par Cerbelaud (Paris, 1905) ; d) Formulaire des Pharmaciens du Loiret (Orléans, 1903) ; e) Précis de Posologie infantile, par R. Nogué (Maloine, éditeur, 1895) ; f) Traité de thérapeutique infantile, par Legendre et Broca (2e édition Steinheil) ; g) Les produits biologiques médicinaux, par Pierre Byla (Rousset, éditeur, 1904) ; h) Thérapeutique infantile, par M. Marfan, in Traité des maladies de l'enfance, 1er vol. (Masson, éditeur, 1re édit.) ; i) Formulaire thérapeutique, par Lyon et Loiseau (Masson, éditeur) ; j) Formulaire par Gilbert et Yvon (Doin, éditeur), etc., etc.

Nous nous sommes également inspiré des œuvres et publications des médecins contemporains qui se sont spécialisés en Pédiatrie et dont la notoriété est telle qu'il serait superflu d'énumérer leurs travaux.

VI. — C'est pour nous une dette de reconnaissance de rappeler ici que notre initiation dans la Médecine Infantile a été faite sous les auspices de deux de nos grands maîtres de la Pédiatrie, MM. Sevestre et Marfan. Nous avons toujours

cherché à nous pénétrer de leur enseignement si clair, si précis, d'un si haut sens clinique, et c'est grâce à la forte impression de cette éducation première que nous sommes redevables d'avoir pu tenter cet ouvrage.

VII. — Nous tenons encore à remercier bien vivement notre ami M. Lesure, docteur en pharmacie, pour la complaisance qu'il a mise à vérifier nos formules au point de vue pharmacologique. Son savoir et ses conseils nous ont été souvent utiles, et il nous est agréable d'en témoigner ici.

IX. — En terminant, nous exprimons un désir : Nous serions très heureux que nos confrères veuillent bien nous adresser les critiques ou les desiderata que ce formulaire leur suggère. Nous mettrions à profit, au cas d'une seconde édition, les observations que nous aurions ainsi recueillies.

Du même auteur

Le Cœur et l'Aorte des Syphilitiques. (Baillière, éditeur, 1900).

Manuel pratique du traitement de la Diphtérie. (En collaboration avec Benjamin Weill). (Masson, éditeur, 1902).

Traité de Microscopie clinique. (En collaboration avec Guillaumin). (Masson, éditeur, 1906).

Thérapeutique vénérienne. (Steinheil, éditeur, 1909).

***

Traitement des Péricardites. (1 brochure, extrait du Journal des Praticiens, 1902).

La Digitale dans la Pneumonie. (1 brochure, extrait du Journal des Praticiens, 1897).

ERRATA

Page 23. — Ligne 1. — Lire « contient 0 gr. 50 de bromure de calcium ».

Page 34. — Ligne 14. — Lire « Plaees » au lieu de « Plaies ».

Page 40. — Ligne 8. — Lire « Alcool » au lieu de « Acide borique ».

Page 49. — Le paragraphe « Arthritisme » est intercalé par erreur au milieu de l'article « Arthrite tubereuleuse ».

Page 92 — Lignes 2 et 3. — Lire « Iode pur bisublimé », « K : ».

Page 195. — Ligne 9. — Lire « Iodure de potassium 4 gr. » au lieu de « 20 gr. ».

INTRODUCTION

La médecine de l'enfance est une branche bien spéciale de notre art qui nécessite une éducation et une aptitude particulières complétées ensuite par l'habitude et l'expérience, car elle diffère essentiellement de la médecine de l'adulte aussi bien pour la Clinique que pour la Thérapeutique.

En clinique, par exemple, nous savons que certaines maladies infectieuses sont particulières et presque exclusives à l'enfance, que d'autres atteignent à cet âge, leur maximum de fréquence ou de gravité, que d'autres enfin évoluent avec des allures propres.

Les mesures prophylactiques ont, de ce fait, dans l'enfance un rôle primordial et dominent la thérapeutique.

Une particularité tout à fait remarquable de la médecine de l'Enfance, est la très grande part qu'il faut faire à l'Evolution. L'enfant est un être qui se développe, qui change, qui se transforme chaque jour ; à côté de ce qui cons-

titue sa pathologie vraie, il y a aussi une évolution toute physiologique qui peut présenter des heurts, des difficultés, des perturbations, sans qu'il s'agisse à proprement parler de maladie, sans qu'il y ait adjonction d'éléments pathogènes, et qui pourtant nécessite une surveillance et des soins assidus.

En thérapeutique, puisque c'est le sujet que nous traitons, il existe des considérations spéciales, il y a des principes généraux qu'il faut toujours avoir à l'esprit.

Il convient de s'abstenir le plus possible des médicaments chez les enfants, et surtout dans le tout premier âge.

Tous les médicaments ne sont pas utilisables chez les enfants. Les uns sont à rejeter complètement ; d'autres, bien tolérés, peuvent être administrés à doses relativement considérables, en comparaison avec la dose d'usage courant chez les adultes ; d'autres enfin, quoique assez bien tolérés doivent être maniés avec prudence, si on veut en obtenir des résultats favorables.

Les modes d'administrations médicamenteuses ne sont plus les mêmes que chez les adultes ; la méthode hypodermique est exceptionnelle ; la posologie en cachets ou en pilules rencontre souvent des difficultés insurmontables ; aussi

la plupart du temps, doit-on avoir recours aux solutions, potions, granulés, etc.

La médication par les agents physiques, tels que balnéation, enveloppements froids, locaux ou généraux, cures d'altitude, bord de la mer, est extrêmement importante en médecine infantile.

Ces principes généraux, nous avons tenu à les appliquer dans notre formulaire qui est divisé en 3 grands chapitres.

1° L'évolution normale et déviée de l'enfant, et ce chapitre comprend : La nourriture et les troubles inhérents à une mauvaise direction ; l'évolution dentaire ; la croissance ; la puberté.

2° Les principales maladies de l'enfant et leur traitement.

3° Les médicaments utilisés ou utilisables avec leur posologie et l'indication de la dose, suivant l'âge.

En terminant, nous disons que nous nous sommes mis d'accord avec les exigences du récent codex.

Venant après beaucoup d'autres, notre formulaire n'aspire pas à les détrôner ; s'il a, à côté d'eux, une place honorable et rendu quelques services, nous en serons satisfait.

PREMIÈRE PARTIE

ÉVOLUTION NORMALE DE L'ENFANT SON ALIMENTATION

Pendant les trois premières semaines ou même jusqu'à la fin du premier mois, le nouveau-né reste ordinairement sous la direction de l'accoucheur ; puis, à cette époque, il est confié au médecin, qui doit diriger soit un allaitement maternel, soit un allaitement artificiel, soit un allaitement mixte.

Allaitement maternel

L'allaitement maternel doit toujours être préféré à tout autre mode d'alimentation, lorsqu'il est possible, c'est le seul logique, le seul naturel. Il

faut être tenace et persévérant en présence des difficultés de début que peut présenter l'allaitement maternel ; la plupart ne sont pas insurmontables. Le découragement provoqué par les premiers déboires, le nervosisme chez les jeunes femmes, les mauvais conseils de l'entourage sont la plupart du temps les principaux obstacles.

Il ne faut pas immédiatement affirmer qu'une mère n'aura pas assez de lait à la suite d'un semi-échec de quelques jours.

Les femmes saines qui ne peuvent pas nourrir sont la minorité infime. Beaucoup ne le veulent pas et ne le désirent pas.

L'analyse du lait est un leurre et ne doit pas, par elle seule, faire cesser un allaitement maternel. L'observation médicale attentive du nourrisson doit, en dernier ressort, trancher la question.

Une femme qui allaite doit se consacrer presque exclusivement à son nourrisson.

Une femme qui allaite doit avoir un minimum de repos de 9 heures, et doit être à l'abri des émotions violentes, des fatigues et du surmenage.

La femme qui allaite doit se soumettre à un régime alimentaire spécial et assez rigoureux qui peut se résumer ainsi :

Abstention de vin, café, liqueurs, boire de la bière non alcoolisée ou de la bière de malt, de l'eau

d'Evian, ou de l'eau pure, de préférence bouillie. Ne pas manger de crudités, de sauces épicées, de viandes faisandées, de conserves, de fruits crus ; manger des viandes fraîches et bien cuites, des légumes divers, des fruits cuits.

La femme qui allaite doit suivre une hygiène corporelle sévère, et veiller à la propreté absolue des seins.

Les crevasses du début, si douloureuses, sont facilement guéries par l'application, la nuit, ou dans l'intervalle des tetées, de petits pansements humides composés d'un tampon de ouate hydrophile imbibé d'une solution de nitrate d'argent à 1 pour 300, recouvert d'un petit morceau de taffetas-chiffon et d'une couche de ouate assez épaisse pour empêcher le nitrate d'aller sur le linge. Ces pansements sont continués 3 à 4 jours au maximum.

La durée de l'allaitement au sein doit être de 10 à 14 mois, un an en moyenne.

On ne doit jamais le cesser pendant les grandes chaleurs ou au moment d'une poussée dentaire.

Il y a un intervalle minimum entre les tetées qui doit être respecté et qui est de deux heures, au début, et deux heures 1/2 ou 3 h. par la suite. Les tetées du matin sont d'ordinaire toujours plus abondantes que celles du soir.

Il y a par tetée une quantité maximum de lait qu'il ne faut pas naturellement dépasser sous peine de s'exposer à des troubles digestifs.

L'usage de la balance est absolument nécessaire et obligatoire pour une alimentation rationnelle, car c'est la sauvegarde des nourrissons.

La quantité de lait à donner à un enfant par jour et par tetée n'est pas uniforme, elle dépend du poids initial de l'enfant, de sa capacité stomacale, de sa courbe de progression.

La quantité de lait nécessaire et suffisante est celle qui permet au nourrisson de progresser quotidiennement de 25 à 32 grammes jusqu'au 4e mois, de 20 à 25 de 4 à 6 mois, de 15 à 20 au delà avec diminution progressive au fur à mesure que l'enfant avance en âge. Les troubles digestifs sont surtout fréquents et redoutables jusqu'au 5e mois ; aussi, doit-on être très sévère et très scrupuleux pour les pesées.

La plupart du temps, on pèche plus par excès que par défaut de nourriture.

A chaque tetée, autant que cela est possible, il faut ne donner qu'un seul sein. Nous conseillons la manière de faire suivante :

De la fin du premier mois, jusqu'à la fin du cinquième, donner 7 tetées par 24 heures aux heures suivantes :

7 heures du matin,
9 heures 1/2,
midi,
2 heures 1/2 du soir,
5 heures,
7 heures 1/2,
10 heures.

Souvent, on sera obligé d'avancer d'une demi-heure celle du matin, ou de retarder d'une demi-heure ou d'une heure celle du soir, mais de toute façon, la mère aura un repos suffisant.

Les quantités de lait à donner sont en moyenne les suivantes :

	2e mois	3e mois	4e mois	5e mois
1re tetée	90	120	120	130
2e tetée	90	110	120	130
3e tetée	80	110	120	120
4e tetée	75	100	100	110
5e tetée	80	100	100	120
6e tetée	80	90	100	110
7e tetée	85	90	120	120
Total par jour :	580 à 720	720 à 780	780 à 840	840 à 880

On remarquera une certaine variation dans les tetées tenant à des causes différentes : secrétion maternelle plus ou moins abondante par manque de repos ou sans cause apparente, inégalité dans

la secrétion des deux seins, appétence plus ou moins grande de l'enfant. Nos chiffres représentent des moyennes prises sur des enfants prospères et sains.

A partir du 6e mois, on ne donnera plus que 6 tetées aux heures suivantes :

6 heures,
9 heures,
midi,
3 heures,
6 heures,
9 heures.

On peut, à cette époque, se relâcher dans les pesées des tetées et se borner à peser l'enfant 2 à 3 fois par semaine pour contrôler son accroissement régulier.

Les tetées sont naturellement plus abondantes, puisqu'elles sont moins nombreuses.

Après le 6e mois, la quantité de lait à donner change peu, elle progresse de 880 grammes pour arriver à 1 litre à la fin de la première année, sans que cette dose ne doive être jamais dépassée.

Dyspepsies par suralimentation dans l'allaitement maternel.

Caractérisées par :

Regurgitations, grumeaux blancs dans les selles, diarrhée, plus tard vomissements acides, selles rosées verdissant à la lumière, ou vertes d'emblée, multiples ; non augmentation de poids.

Diminuer la quantité de lait ingérée, donner de l'eau bouillie sucrée.

Toutes les deux tetées, pendant quelques jours, avant la tetée, un des paquets suivants dans un peu de lait :

Bicarbonate de soude.....	0.10 centigr.
Paneréatine	0.05 centigr.

(Par paquet)

Dyspepsies par hypo-alimentation.

Compléter les tetées insuffisantes par du lait bouilli, ou remplacer une tetée par un biberon.

Hoquet.

Faire avaler, avec une cuillère à café, un peu de sucre en poudre.

Allaitement par une nourrice mercenaire.

N'est pas à recommander et ne doit être institué que si l'allaitement par la mère ou l'allaitement mixte sont impossibles, et l'allaitement artificiel dangereux. Les nourrices mercenaires peuvent léguer leurs tares à leurs nourrissons : tendance à l'eczéma, aux scrofulides, au nervosisme.

Allaitement mixte.

On doit *compléter* les tetées, si elles sont insuffisantes et non pas chercher à les remplacer par le biberon.

Si la mère qui allaite est trop fatiguée, il faut suppléer à la tetée du soir pour permettre le repos.

Les raisons mondaines qui nécessitent de suppléer à une tetée, celle du soir en particulier, ne

doivent être valables que si l'enfant a dépassé 6 mois, c'est-à-dire l'âge des troubles digestifs graves.

Allaitement artificiel.

Employer le lait d'une vache qui répondra autant que possible aux desiderata suivants :

Etre de race normande.

Etre nourrie avec du foin, des betteraves, avec le moins possible de drèches ou de tourteaux et jamais avec les pulpes fermentées de betteraves.

Avoir subi l'épreuve de la tuberculine.

Etre tenue dans un état de propreté absolue.

Etre dans une étable saine, bien aérée, être sortie le plus souvent possible, et avoir comme boisson de l'eau bien pure.

Le lait recueilli après la traite doit être réparti dans des flacons de 100 grammes, scrupuleusement nettoyés et bouillis. Le lait est passé au Soxhlet pendant 10 minutes environ.

Si ces conditions ne peuvent être remplies, avoir recours aux laits stérilisés commerciaux.

On peut employer le lait cru, lorsque l'animal qui le fournit présente toutes garanties, lorsqu'il est possible de pratiquer fréquemment la traite pour l'avoir toujours frais.

Si le lait de vache est mal toléré, on peut essayer le lait d'ânesse ou le lait de chèvre.

Si les laits stérilisés industriellement ne réussissent pas, on peut employer les laits maternisés, les laits pasteurisés, les laits concentrés, mais ce ne sont que des pis-aller.

On doit autant que possible rejeter de l'alimentation de l'enfant les laits conservés grâce à l'adjonction de produits chimiques. Au début, le lait de vache ne doit pas être employé pur, mais coupé d'eau bouillie légèrement sucrée.

Il faut employer un biberon très simple avec une tetine ébouillantée chaque fois, et essayer aussi rapidement que possible, de donner le lait au verre.

Sevrage.

Sevrer l'enfant vers le 12e mois environ.

Ne pratiquer le sevrage qu'à une époque de l'année où on n'est pas exposé aux chaleurs.

Choisir pour le sevrage, un intervalle de dentition.

Si la dentition est difficile, attendre pour le sevrage que l'enfant ait 16 ou au moins 12 dents.

Le sevrage peut être brusque ou progressif. Il

doit être brusque si l'allaitement maternel ou artificiel crée à certains moments des ennuis, il doit être progressif, si au contraire l'évolution est satisfaisante.

Nourriture de l'enfant sevré de 12 à 16 mois : cinq repas.

7 heures, 1 bouillie claire ou 200 gr. de lait.
10 heures, 1 timbale de lait de 200 gr.
1 heure, 1 bouillie ou un tapioca au lait ou une panade avec jaune d'œuf. Un gâteau sec.
4 heures, timbale de lait de 200 gr.
7 heures, 1 bouillie faite avec 200 gr. de lait ou phosphatine.

Il est préférable de sucrer les bouillies et le lait.

Il faut donner le lait à la tasse et non au biberon.

De 11 à 16 mois, la quantité de lait à donner à un enfant ne doit pas dépasser un litre.

Pendant la période de transition qui précède le sevrage absolu, il faut : 1° Faire tomber de 6 à 5 le nombre des prises d'alimentation ; 2° Exercer l'enfant à prendre, une fois par jour, à la tasse, du lait bouilli ou une bouillie claire.

Les meilleures bouillies se font avec :

L'arrow-root.
Le gruau d'avoine.
— d'orge.
— de maïs.
Les crèmes de riz.
La farine de froment.

On peut les chocolater. Les œufs et les panades doivent être employés avec modération. User exceptionnellement des purées de féculents.

Nourriture de 16 mois à deux ans :

Diminuer progressivement le lait pour arriver à 700 gr. et à un demi-litre.

On peut commencer à donner des bouillons frais, de la semoule, du tapioca, du pain, des purées de légumes, des fromages cuits ou frais. Donner à boire de l'eau d'Evian. Continuer les 5 repas.

Nourriture vers la fin de la 2e année :

Amener l'enfant à ne prendre que 4 repas.

Commencer un peu de viande (ris de veau, cervelles), poissons, fruits cuits.

Dentition

Première dentition (Dents de lait).

Comprend l'évolution de 20 dents, et est achevée vers 2 ans, 2 ans 1/2. Les dents apparaissent en 5 groupes selon un ordre déterminé :

1er groupe : Deux incisives médianes inférieures,

paraissent entre 6 et 8 mois, se succèdent en l'espace de 15 jours.

2e *groupe* : Quatre incisives supérieures, paraissent 1 mois à 6 semaines après les précédentes, débutent par les 2 incisives médianes, puis les deux latérales, mettent 3 à 4 semaines pour sortir.

3e *groupe* : Comprend 2 incisives latérales inférieures et 4 petites molaires, d'ordre d'apparition variable, suivent de 1 à 2 mois le groupe précédent.

4e *groupe* : Quatre canines (œillères), dents les plus difficiles à sortir, débutant souvent par les canines supérieures, mettent 6 semaines à 2 mois pour sortir, et poussent entre le 18e et le 22e mois, de telle sorte qu'un enfant de 2 ans doit avoir ses canines.

5e *groupe* : Quatre molaires définitives évoluant entre 2 ans, 2 ans 1/2.

Les anomalies dans la date d'apparition, et dans la durée des périodes intercalaires entre l'apparition des divers groupes, sont fréquentes.

Dentition de 6 ans ou 2e Dentition.

Se produit de 5 à 7 ans, quelquefois seulement après les dents de remplacement, se compose de 4 molaires.

Peut donner lieu à des sinusites.

Dentition de remplacement ou 3e Dentition.

Ordre d'apparition généralement le même que celui des dents de lait. Ne paraissent pas par paires.

Excellente chose, si elles apparaissent tardivement.

Début moyen de l'apparition : 7 ans.

Consultation sur la Dentition.

Tant que la gencive de l'enfant présente une crête, la dent n'est pas près d'apparaître ; quand la gencive gonfle et s'aplatit, l'éruption est proche.

Au moment de l'éruption dentaire, l'enfant devient grognon, irritable, bave, mordille les objets, met les doigts dans sa bouche. Les frictions sur les gencives l'apaisent. On emploie le sirop Delabarre :

Suc de Tamarin frais.....	3 gr.
Infusion de safran à 3 p. 100.....	2 gr.
Miel fin.....	10 gr.
Teinture de vanille.....	0 gr. 15

Il peut y avoir des convulsions, des envies fréquentes d'uriner, du spasme glottique, des troubles digestifs, du méningisme, de la fièvre. Donner du Bromure de calcium. Le sirop de Teyssèdre, couramment employé, contient :

Bromure de calcium....	2 gr. 50
Eau distillée.....	2 gr. 50
Sirop de fleurs d'oranger.....	95 gr.

Une cuillerée à soupe (20 gr.) contient 0,20 de Bromure de calcium.

Donner du bromure de potassium (de 0.30 à 0.40 cg. par jour, à 6 ou 8 mois. Administrer par cuillerées à café de 0.50 cg. à 1 gr. à 8 ou 10 mois).

S'abstenir de chloral.

Quelquefois, inciser la gencive.

Arracher les dents de lait (une des 2 petites molaires) si les dents de la 3e dentition poussent de travers.

Constipation des Bébés

Bien veiller à la régularité de l'alimentation.

Donner une cuillerée à café d'eau lactosée avant chaque tetée.

S'il y a alimentation artificielle, couper le lait sucré avec une décoction d'orge.

Au moment du sevrage, donner de temps en temps du bouillon de poulet.

Moyens médicamenteux :

Le massage abdominal.

L'huile de ricin (une cuillerée à café 2 ou 3 jours de suite).

La magnésie anglaise (une à 3 pincées avant une tetée).

Suppositoires au beurre de cacao ou à la glycérine.

Lavements d'eau simple bouillie, d'eau de guimauve ou de camomille (50 gr. pour les 6 premiers mois, 100 gr. jusqu'à un an, 150 gr. à partir d'un an). On peut l'additionner de 2 à 4 cuillerées d'huile d'amandes douces.

Passé 16 mois, faire prendre dans la journée la préparation suivante :

Eau bouillante.....	200 gr.
Manne en larmes.....	30 gr.
Follicules de Senè.....	4 gr.
Poudre de café torréfié.....	10 gr.

Passer. (Sevestre).

Si la constipation est pathologique, avoir recours aux médicaments.

Puberté

C'est surtout au moment de la formation que les jeunes filles peuvent présenter divers troubles, comme :

1° De l'anémie. Donner alors des préparations ferrugineuses ou du quinquina.

2° Des douleurs ovariennes. On les calmera par

des lavements d'antipyrine et on favorisera la régularisation des règles par l'administration de seneçon ou d'anémonine.

Trois à quatre jours, avant l'apparition présumée des règles, donner une des deux préparations suivantes :

Extrait fluide de seneçon.....	4 gr.
Elixir de Garus.....	120 cmc.

(2 cuillerées à soupe par jour).

Ou :

Teinture d'anémone pulsatile au 1/5.....	ââ 0 gr. 50
Teinture de noix vomique.....	
Eau distillée..... q s pour	60 cmc.

(2 cuillerées à café par jour).

3° Des troubles nerveux généraux. Donner alors pendant quatre jours, quatre tablettes d'ovarine de 0,08 centigr.

DEUXIÈME PARTIE

LES MALADIES DE L'ENFANCE

Abcès chauds

Avant que le pus soit collecté, appliquer toutes les heures ou toutes les deux heures des compresses d'eau bouillie très chaudes et recouvertes d'un taffetas chiffon.

Quand le pus est collecté, incision précoce. Pansement humide pendant 24 à 48 heures avec drainage par une mèche de gaze. Quand l'inflammation est tombée, pansement demi-sec au nitrate d'argent en continuant le drainage avec une mèche de gaze jusqu'à guérison.

Abcès froids

Evacuer le pus à l'aide d'un de nos trocarts pour ponction d'articulation. Injecter dans la poche, à l'aide d'une aiguille mousse, une des solutions suivantes :

I

Gaïacol	5 gr.
Iodoforme	2 gr.
Huile d'olive stérilisée	100 gr.

(Injecter 5, 10, 20 cmc.)

II

Iodoforme	5 gr.
Glycérine ou Vaseline liquide	100 gr.

(Mêmes doses)

III

Iodoforme	5 gr.
Ether	100 gr.

(5 à 10 cmc.)

IV

Thymol	10 gr.
Camphre	20 gr.

(Injecter de 2 à 4 cmc.)

V

Gaïacol synthétique	45 gr.
Camphre	55 gr.

(Injecter de 1/4 à 1/2 cmc.)

VI

Gaïacol	5 gr.
Iodoforme	1 gr.
Huile d'olive stérilisée	100 gr.

(Injecter de 2 à 4 cmc.)

VII

Créosote	2 gr.
Iodoforme	5 gr.
Ether, Huile stérilisée	âà 50 gr.

VIII

Iodoforme finement pulvérisé	5 gr.
Mucilage de gomme arabique	2 gr.
Glycérine	8 gr.
Eau distillée	50 gr.

IX

Naphtol B	10 gr.
Camphre	20 gr.

(1 à 2 seringues de Pravaz)

Quand on retire le drain du trocart, fermer au collodion.

Faire la ponction très oblique.

Souvent, nécessité de plusieurs ponctions.

Si possible, par petitesse de l'abcès, incision large, curetage de la poche, attouchements avec une solution de chlorure de zinc à 1/10. Suture.

Traitement général de la tuberculose.

Abcès retropharyngiens et Latéropharyngiens

Incision précoce par voie buccale suivie de lavage.

Possibilité de mort subite ou d'apnée au cours de l'intervention. N'entreprendre l'incision que si on a avec soi le nécessaire pour trachéotomie d'urgence.

Après incision, lavages fréquents à l'eau boriquée.

Abcès sous-cutanés multiples

Avant maturation, propreté méticuleuse. Les isoler sous un petit morceau d'emplâtre à l'ectogan.

Après maturation, ouverture au bistouri ou à la pointe du galvanocautère. Soins de propreté extrêmes.

Donner 3 fois par jour gros comme une noisette de levure de bière.

Modifier les fonctions intestinales avec des ferments lactiques.

Acné

Médication générale par l'huile de foie de morue et le sirop iodo-tannique.

Eviter la constipation. Donner des amers ou des stimulants.

Régime alimentaire sévère.

Traitement local :

Extraire quotidiennement un certain nombre de comédons avec un extracteur à comédons de Unna; laver la place avec de l'eau de Cologne puis, avec le doigt, faire incruster dans les glandes évacuées une poudre comme :

I

Hermophenyl..... 2 gr.
Oxyde de zinc ..... 10 gr.

(Mêler finement).

Ou

II

Sulfobore.

S'il y a acné pustuleuse, détruire chaque pustule avec une pointe très fine de galvanocautère, laver à l'eau de Cologne et traiter avec une des poudres ci-dessus.

Avoir recours aux pommades, si ce traitement est impossible :

III

Soufre précipité ..... 10 gr.
Alcool camphré..... 20 gr.
Eau de roses..... } ââ 30 gr.
Glycérine..... }

Ou

IV

Soufre précipité..... } ââ 2 gr.
Oxyde de zinc..... }
Essence de violette..... q. s.
Lanoline..... } ââ 5 gr.
Huile d'amandes douces..... }

Ou

V

Soufre précipité..... }
Glycérine pure..... }
Carbonate de potasse..... } ââ 10 gr.
Eau de laurier-cerise..... }
Alcool à 90°..... }

Dans quelques cas, avoir recours aux emplâtres caoutchoutés qui peuvent être faits à l'ichthyol, au soufre ou à l'ichthyol soufré.

Adenie

Médication générale : Iode, Huile de foie de morue, arsenic, phosphore ou bains salés.

Frictions locales avec une pommade iodurée faible.

Adénites aiguës

Traiter la cause.

Pansements à l'eau chaude fréquemment renouvelés. S'il y a formation d'abcès, traiter comme ces derniers. Ne pas trop se presser d'ouvrir dans la région cervicale, car on peut ne pas trouver de pus. N'intervenir que si on est certain de l'abcédation. N'ouvrir que la peau au bistouri et aller ensuite prudemment à la recherche du pus avec la sonde cannelée.

Adénites chroniques

Traitement général de la tuberculose et surtout traitement maritime. Application de pommades iodurées, s'il y a micropoly-adénopathies. Dans les adénopathies limitées et assez volumineuses, extirpation, si possible, quand les ganglions ne sont pas suppurés.

S'il y a impossibilité, faire des injections interstitielles avec :

I

Teinture d'iode au 1/10e	10 gr.
Alcool à 96°	5 gr.

Ou

II

Iode	1 gr.
Iodure de potassium	2 gr.
Eau distillée	10 gr.

Ou

III

Iodipine à 10 pour 100	
Camphre	ââ 0 10 ctg.
Gaïacol	

Ou

IV

Chlorure de zinc	1 gr.
Chlorhydrate de Cocaïne	0 gr. 10
Eau distillée	19 gr.

Introduire d'abord l'aiguille seule préalablement vaselinée, n'ajuster la seringue et pousser l'injection que si on est arrivé au centre du ganglion. Quantité de liquide à injecter variant de 1 2 à 1 cmc., sauf le chlorure de zinc dont on injecte II gouttes par plaies. Renouvellement à temps variable des injections.

Si les ganglions sont suppurés, extirpation si possible. Si impossible, faire une petite incision, laver, cureter la poche ganglionnaire, cautériser au chlorure de zinc à 1/20, puis pansements iodoformés ou pansements humides de nitrate d'argent à 1 pour dix mille, suivis de pansements demi-secs au nitrate.

S'il y a fistulisation : grattage de la fistule, suivi de cautérisation au chlorure de zinc, puis pansement.

Weber injecte dans la fistule 1 seringue de

Pravaz d'extrait glycériné concentré de foies frais de morue (Sanas) et il obstrue avec un tampon de coton. On renouvelle de temps en temps.

Adénoïdes (Végétations)

Indications générales de l'extirpation :

1° Quand les adénoïdes trop volumineuses sont un obstacle à la respiration nasale régulière et empêchent le développement normal du thorax ;

2° Quand les adénoïdes, obstruant la trompe d'Eustache, déterminent de la surdité ;

3° Quand les adénoïdes, chroniquement infectées, s'accompagnent d'un chapelet ganglionnaire cervical, déterminent des poussées fébriles ou des coryzas récidivants ;

4° Quand les adénoïdes s'accompagnent de stridulisme ;

5° Attendre autant que faire se peut, que l'enfant ait dépassé la 6e année, avant d'opérer.

Contre les adénoïdes infectées, mettre 3 fois par jour, dans chaque narine, gros comme une noisette de la pommade suivante :

Eucalyptol	0,30 centig.
Resorcine	1 gr.
Vaseline	30 gr.

Donner, à l'intérieur, de l'huile de foie de morue, de l'arsenic ou de l'iode. S'il y a fièvre, avoir recours à l'antipyrine. Cures du bord de la mer ou d'altitude. Bains salés. Pratiquer l'extirpation en dehors des poussées fébriles.

Adénopathie trachéo-bronchique

Donner, deux fois par semaine, un bain salé.

Huile de foie de morue.

Liqueur de Fowler avant les repas pendant 15 jours par mois.

Les 15 autres jours, avoir recours à la médication iodée (sirop d'iodure de fer, sirop iodo-tannique).

Révulsion locale soit avec des mouches de Milan, soit en faisant 2 fois par jour des frictions locales avec la mixture suivante :

Ammoniaque liquide	4 gr.
Camphre	2 gr.
Essence de térébenthine.....	40 gr.
Huile d'olive	40 gr.

Albuminurie

Régime lacté absolu, tempéré ou non, selon les nécessités, par un régime lacto-végétarien. Suppression des chlorures.

Laisser l'enfant au lit ou tout au moins dans la position horizontale. Donner trois fois par jour de 10 à 15 gouttes de la teinture suivante :

Teinture de viscum album.....	10 gr.

Alterner avec le sirop d'iodure de fer, le sirop iodo-tannique ou le Lactate de Strontium.

Lactate de Strontium.....	10 gr.
Sulfate de spartéine.....	0,10 centigr.
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop d'écorces d'oranges..	q. s. pour 100 cmc.

Une cuillerée à dessert matin et soir.

Eviter les refroidissements et faire des frictions sèches sur le corps.

Alopécie

Frictions avec des lotions excitantes :

Alcoolat de lavande ..... }	
Alcolat de romarin ..... }	aâ 100 gr.
Resorcine	1 gr.
Chlorhydrate de quinine...	0,10 centigr.
Chlorhydrate de pilocarpine	0,05 centigr.

S'il y a insuffisance thyroïdienne, avoir recours à l'iodothyrine ou à la médication thyroïdienne.

Amygdalites aiguës

On a le choix entre 3 méthodes.

α) Les lavages de la gorge.
β) Les attouchements antiseptiques.
γ) Les pulvérisations antiseptiques.

Lavages :

Enfant enroulé dans un drap, immobilisé et assis sur les genoux d'un aide. Mise en place d'un ouvre-bouche type O'Dwyer, tenu en même temps que la tête par un second aide. Inutile, si l'enfant est docile. Tête un peu inclinée au-dessus d'une cuvette. A l'aide d'un irrigateur composé d'un bock, d'un tube de caoutchouc et d'une canule en os, laver avec un jet assez fort la gorge de l'enfant. Eviter que l'enfant n'avale la solution. Solutions à employer :

I

Acide borique..... }	âà 20 gr.
Borate de soude..... }	
Eau bouillie tiède.....	1 litre.

II

Liqueur de Labarraque ..	50 gr.
Eau bouillie.....	1 litre.

III

Hydrate de chloral.....	5 gr.
Eau bouillie.....	1 litre.

IV

Eau oxygénée	50 à 100 gr.
Eau bouillie.....	1 litre.

Irrigations fréquentes, faites de temps en temps à l'eau bouillie, l'action mécanique du lavage étant souvent favorable.

Attouchements antiseptiques : Se font avec des tampons de coton hydrophile enroulés à l'extrémité d'un porte-tampon.

Attouchements légers ne devant pas faire saigner, à renouveler toutes les deux ou 3 heures. Les solutions à employer sont les suivantes :

α) Solution de nitrate d'argent dans l'eau distillée à 1 pour 300.

(Faire attention aux doigts et au linge).

β) Eau oxygénée chirurgicale dédoublée.

γ)

Resoreine.....	1 gr.
Glycérine	30 gr.

δ)

Teinture d'iode au 1/10e...	1 gr.
Glycérine.....	30 gr.

Pulvérisations antiseptiques :

Rarement possibles, avec les petits pulvérisateurs à vapeur. Employer notre pulvérisateur et, toutes les 3 heures, faire une petite pulvérisation dans la gorge avec :

α) Solution de nitrate d'argent au millième.

β) Protargol.....	0,50 centigr.
Glycérine neutre	5 gr.
Eau bouillie.....	200 gr.

δ) Thymol.....	0,10 centigr.
Menthol.....	0,10 centigr.
Eucalyptol.....	0,20 centigr.
Acide Borique.....	10 gr.
Eau distillée.....	100 gr.

En même temps que le traitement local, si nécessaire, appliquer des compresses d'eau chaude sur le cou, donner de l'antipyrine contre la fièvre, surveiller les urines.

Faire évaporer dans la pièce de la teinture de benjoin et d'eucalyptus (une cuillerée à café dans une casserole d'eau bouillante).

Amygdalite phlegmoneuse

Même traitement, et incision précoce de l'abcès. Gêne opératoire due au trismus. Traverser le pilier antérieur.

Amygdalite ulcéro-membraneuse

Même traitement, ou préférer les badigeonnages au bleu de méthylène.

Bleu de méthylène.....	3 gr.
Glycérine.....	âà 15 gr.
Alcool.....	

Amygdalite chronique

Disciser les cryptes de l'amygdale avec le galvano-cautère, après cocaïnisation.

Amygdale (Hypertrophie de l')

Se contenter d'élargir l'orifice des cryptes au galvano cautère si l'hypertrophie est modérée, s'il n'y a ni enchatonnement, ni adhérence aux piliers.

Morcellement, si le volume est excessif.

Ablation totale après énucléation, s'il y a enchatonnement, et libération des adhérences s'il y en a.

Amygdale (Kystes épithéliaux de l')

Disciser.

Anasarque

Mettre l'enfant au régime lacté absolu.

Donner trois fois par jour un des cachets suivants :

Theobromine..... .....
Phosphate neutre de soude.... } aâ 0 gr. 25

Par cachet.

Pratiquer, si nécessaire, des mouchetures sur les jambes (3 à chaque jambe, pratiquées avec une pointe très fine de thermocautère).

Ventouses scarifiées sur la région hépatique, si le foie est volumineux.

Anesthésie

Chloroforme pour les longues opérations. Bromure ou Chlorure d'éthyle pour les interventions rapides. Cocaïne ou stovaïne pour anesthésie localisée.

Anémics

Ne pas prolonger trop longtemps l'alimentation lactée.

Donner du jus de viande, du fer ou de l'hémogloline.

Protoxalate de fer.....	0,15 à 20 eg.
Suere de lait.....	0.50 cg.

Deux paquets par jour dans du lait, pendant 8 à 10 jours.

Tartrate ferrico-potassique. / Eau de cannelle..... \	ââ 2 gr.
Sirop de sucre.....	100 eme.

1 à 2 cuillerées à café.

Hémoglobine ..... / Glyeérine neutre..... \	ââ 10 gr.
Sirop de vanille.	q. s. pour 80 emc.

Deux à quatre cuillerées à café par jour.

Parfois, avoir recours à l'iode, à l'arsenic, au phosphore.

Dans l'anémie leucémique, donner de la moelle osseuse.

Moelle osseuse préparée : de 1 à 5 gr.

Angines

Comme amygdalites. Voir diphtérie.

Angiomes

Extirpation si possible. Si impossible :

Applications de radium,

ou Electrolyse,

ou Cautérisation ignée au thermo ou au galvano-cautère.

Anorexie

Teinture de gentiane.....		
— de colombo.....	ââ	10 gr.
— de noix vomique.....		2 gr

De 5 à 15 gouttes dans un peu d'eau.

Anthrax

Fréquemment, dans la journée, faire des pulvérisations avec un pulvérisateur de Championnière, dans lequel on mettra une cuillerée à soupe d'une des solutions suivantes :

Hermophényl.....	0 gr. 50
Eau distillée.....	100 gr.

Ou :

Oxycyanure d'Hydrargyre.....	0 gr. 50
Eau distillée.....	100 gr.

Pendant la nuit, faire des pansements humides avec une solution de nitrate d'argent à un pour 10.000.

S'il n'y a que peu de bourbillons, dès qu'ils sont acuminés, les ouvrir et détruire profondément avec le galvanocautère ou la pointe fine du thermocautère. Les nettoyer très fréquemment avec une petite mèche de coton montée au bout d'un stylet et trempée dans une solution de nitrate d'argent à un pour 300. Si l'anthrax est volumineux, incision cruciale au thermocautère et décollement des quatre oreilles formées.

Donner, à l'intérieur, de la levure de bière ou de la staphylase.

Antisepsie Intestinale

Donner cinq des paquets suivants par jour :

Benzonaphtol.....
Salicylate de bismuth..... } ââ 0 gr. 10
Phosphate tribasique de chaux.

Par paquet.

Ou :

Betol.....
Dermatol..... } ââ 1 gr.
Glycyrrhizine.....
Julep gommeux..... 120 cmc.

(De 3 à 5 cuillerées à soupe par jour).

Dans certains cas, donner :

Calomel.....	0 gr. 01
Sucre de lait	0 gr. 10

(Par paquet). Deux à cinq par jour.

Aphtes

Badigeonnages avec :

Salicylate de soude.....	4 gr.
Eau	20 gr.

Attouchements avec le crayon de nitrate d'argent non mitigé.

Gargarismes avec :

Phenosalyl : 100 gr.

Mettre 20 gouttes dans un verre d'eau bouillie.

Appendicite aiguë

Maintenir au lit dans la position horizontale.

Appliquer une vessie de glace, en saupoudrant l'abdomen de poudre de talc et interposant une double épaisseur de flanelle.

Ne donner pour toute alimentation que de l'eau bouillie.

Ne pas donner de purgatifs ou de lavements pendant quatre à cinq jours.

Donner toutes les 3 heures une pilule d'extrait thébaïque de un centigr. ou une cuillerée à café de sirop thébaïque. (Doses selon l'âge).

Calmer les vomissements par :

Teinture de Lichen d'Islande.
(Quinze gouttes 3 fois par jour).

Quand la fièvre tombe et la douleur diminue : tenter l'alimentation lactée, donner des lavements d'eau bouillie et glycérinée, sans pression. Reprendre progressivement l'alimentation avec prudence, et arriver tardivement aux purgatifs comme l'huile de ricin. De préférence, donner le lavement purgatif suivant tiède :

Sulfate de soude.....	15 à 25 gr.
Miel de mercuriale.....	ââ 10 gr.
Follicules de sené	

Indications opératoires : Laparotomie d'urgence quand il y a perforation.

Incision précoce, quand il y a péritonite enkystée et abcès péri-cæcal.

Opérer à froid quand :

La reprise de l'alimentation est pénible ou dangereuse.

Les récidives sont rapprochées.

Les douleurs abdominales sont persistantes.
L'amaigrissement ne disparaît pas.
Les vomissements sont incoercibles.

Appendicite chronique

Maintenir pendant la nuit des compresses d'alcool recouvertes de taffetas chiffon.

Alimentation surtout composée de purées, de légumes cuits, de pâtes alimentaires, de laitages.

Donner tous les jours, et avec peu de pression, un lavement soit d'eau bouillie simple, soit d'eau additionnée de glycérine ou d'huile d'olive. Si les évacuations sont insuffisantes, donner un lavement purgatif avec :

Sulfate de soude.....	10 à 25 gr.
Miel de mercuriale.....	àà 10 gr.
Follicules de Sené.....	

Ou de l'huile de ricin.

Après chacun des deux principaux repas, donner un verre à bordeaux de bouillon Paralactique soit des comprimés de Paralactine.

Souvent, on se trouvera bien de l'usage de laits fermentés Kefir nº 2, Yohourth.

Si on n'obtient pas rapidement une amélioration, ne pas trop différer l'intervention.

Arthrites aiguës

Ponction simple si l'articulation est trop distendue par du liquide séreux.

Incision, s'il y a du pus.

Dans tous les cas, immobilisation de la jointure en bonne position.

Mobiliser ensuite aussi rapidement que possible pour éviter les ankyloses. — Massage.

Arthrites tuberculeuses

Traitement général par l'huile de foie de morue, l'extrait glycériné concentré de foies frais de morue, l'arsenic, le phosphore.

Séjour permanent ou intermittent au bord de la mer.

Arthritisme

Cures mensuelles de :

Bicarbonate de soude.....	0, 10 cgr.
Benzoate de lithine.....	0, 05 cgr.

Par paquet.

(2 par jour pendant 15 jours).

Immobiliser en bonne position l'articulation, c'est-à-dire dans la position où, par suite d'ankylose, le membre donnera le maximum de rendement utile. Si on ne peut immobiliser d'emblée en bonne position, la rectifier brusquement ou lentement.

Révulsion locale par des pointes de feu.

Injections interstitielles de chlorure de zinc au 1/20e. (5 à 6 gouttes par semaine ou tous les 15 jours).

Si abcès : évacuation et injection d'éther iodoformé.

Dans les formes graves, avoir recours aux grattage, résections, amputations.

Arythmie

Dans la plupart des cas, donner du Bromure de potassium, de la valériane, faire de l'Hydrothérapie systématique.

Si le cœur paraît être en cause, donner chaque jour, pendant quinze jours, une cuillerée à café de :

Solution alcoolique de Digitaline cristallisée de Petit-Mialhe	XV gouttes.
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop de cerises..... q.s. pour	75 cmc.

(Repos de trois semaines et recommencer.)

Ascite

Ponctionner, si elle est gênante.
Traitement général.

Asthme

Dans la crise, injecter, selon l'âge, 1/4, 1/2 ou 3/4 de seringue de morphine, et, s'il est possible d'éviter l'injection, donner du sirop de morphine. (Doses appropriées à l'âge).

Lorsque la période douloureuse est passée, mais que l'enfant est encore en imminence de crise, donner la potion suivante :

Sirop de morphine	
Sirop d'éther	ââ 40 gr.
Sirop de belladone	
Teinture de Lobelie enflée..	
Teinture de Drosera rotundifolia.....	ââ 2 gr.
Eau de tilleul.....	q.s. pour 180 cc.

(De 3 cuillerées à café à 4 cuillerées à bouche selon l'âge).

Dans l'intervalle des crises, administrer les alcalins, les iodures, l'arsenic. Cures du Mont-Dore ou de St-Honoré. Calmants du système nerveux.

Asystolie

Immédiatement, régime lacté absolu.

Donner un lavement purgatif ou un purgatif drastique.

Appliquer des ventouses scarifiées (3) sur la région hépatique.

Ponctionner les épanchements s'ils sont trop abondants.

Donner, pendant 3 jours, 3 cuillerées à café de la potion suivante :

Solution alcoolique de Digitaline cristallisée de Petit-Mialhe au millième.	XXX gouttes.
Eau distillée.....	20 gr.
Sirop de cerises..... q.s. pour	45 cmc.

(Doses à modifier selon l'âge).

Ces trois jours passés, maintenir le diurèse par l'administration de théobromine et soutenir le cœur par une potion à la caféine.

Caféine..... } Benzoate de soude..... }	âà 0 gr. 50
Eau distillée.....	50 gr.
Sirop de menthe..... q.s. pour	90 cmc.

Ne cesser le régime lacté qu'après complète guérison et le remplacer par le régime lacto-végétarien déchloruré.

Athrepsie

Si la chose est possible, reprendre l'alimentation au sein.

En cas d'impossibilité, donner du lait d'ânesse ou du lait maternisé de Backhaus.

Frictions alcooliques sur le corps.

Injections quotidiennes de 10 à 20 cmc. de sérum de Hayem.

Donner à l'intérieur, la potion suivante :

Acide lactique.....	1 gr.
Eau de tilleul.....	40 gr.
Sirop de mûres..... q.s. pour	90 cmc.

(De 4 cuillerées à café à 5 cuillerées à entremets par jour).

Atrophie musculaire

Electrisation, massage, révulsion sur la colonne vertébrale, bains sulfureux. A l'intérieur, donner du sulfate de strychnine.

Balanite

Lavages entre le gland et le prépuce avec une petite sonde en caoutchouc souple. Employer une solution de nitrate d'argent à 1 pour dix mille.

Pratiquer de bonne heure la circoncision.

Pansements humides avec une solution de nitrate d'argent à un pour dix mille ou dans les formes légères, badigeonnages avec une solution à un pour 300.

Bec de lièvre

En cas de bec de lièvre simple, opérer dès le jeune âge par le procédé Mirault-Lannelongue. En cas de bec de lièvre compliqué avec fissure palatine, attendre plus tard et recourir à un spécialiste.

Blépharites

Médication antiscrofuleuse.

Faire tomber les croûtes par des pansements humides à l'eau boriquée tiède.

Appliquer la pommade suivante :

Oxyde jaune de mercure..... 0,40 centig.
Vaseline ..... } ââ 10 gr.
Lanoline..... }

Dans les formes ulcéreuses, attouchements avec une solution de nitrate d'argent au centième.

Bouchons de cerumen

Pendant trois jours, matin et soir, introduire dans le conduit auditif quelques gouttes de :

Acide phénique..... 1 gr.
Glycérine ou Huile d'olive..... 40 gr.

Obturer avec un tampon de coton.

Au bout de ce temps, lavages du conduit auditif avec une seringue de Lermoyez à embout en caoutchouc. Employer de l'eau bouillie ou de l'eau boriquée. En cas d'insuccès, extirpation directe avec une curette mousse, après application de speculum auri et sous le contrôle d'un bon éclairage.

Bronchite aiguë

Mettre des bottes de ouate aux enfants.

Maintenir au lit avec une température égale.

Ne donner que du lait, des potages légers, du bouillon de poulet ou de jarret de veau.

Révulsion sur tout le thorax en frictionnant légèrement 3 fois par jour avec :

Essence de térébenthine.....
Huile d'olives..... } ââ.

Tisane calmante avec soit :

Tilleul. Fleurs d'oranger.
Violette. Tussilage.
Capillaire. Lierre terrestre.
Aunée. Coquelicots.

Au début, favoriser l'expectoration, calmer la toux, diminuer la température avec la potion suivante :

Benzoate de soude..... 2 gr.
Antipyrine.....
Terpine..... } ââ 1 gr.
Julep gommeux..... 60 gr.
Sirop de Tolu..... q. s. p. 120 cc.

(De 4 cuillerées à café à 4 cuillerées à soupe selon l'âge).

Au bout de quelques jours, donner des calmants et des desséchants.

Teint. de racines d'aconit au 1/10.
Teinture de Belladone..... } ââ 1 gr.
Eau de laurier-cerise..... 10 gr.
Sirop diacode..... 40 gr.
Sirop de Tolu..... q s. p. 120 cmc.

(De 2 à 6 ou 8 cuillerées à café selon l'âge).

Maintenir une atmosphère humide en faisant bouillir dans la chambre de l'eau où on mettra des feuilles d'eucalyptus, ou bien mettre dans un demi-

litre d'eau bouillante, une cuillerée à café de la mixture suivante :

Teinture d'eucalyptus	100 gr.
Teinture de Benjoin	5 gr.
Menthol, Thymol	ââ 2 gr.

Bronchite capillaire

Révulsion par les cataplasmes sinapisés, les ventouses, les enveloppements froids du thorax. Bains sinapisés très courts.

Injections alternées d'éther, de caféine, d'huile camphrée, de strychnine. Potion avec :

Acétate d'ammoniaque, Teinture de cannelle	ââ 5 gr.
Liqueur d'Hoffmann, Rhum	ââ 20 gr
Sirop d'écorces d'oranges amères.	q. s. p. 120 cc.

(Dose selon l'âge).

Bronches (Dilatation des)

Suralimentation et huile de foie de morue.

Injections de cacodylate de soude par séries de 8 piqûres tous les jours avec 10 jours de repos.

Donner la potion suivante :

Teinture d'eucalyptus.....	ââ 1 gr.
Acide phénique neigeux	
Alcool à 90°.....	10 gr.
Monosulfure de sodium cristallisé.	0,30 cg.
Sirop simple	q. s. p. 250 cc.

(D.S.A.)

Ou :

Hyposulfite de soude.....	2 gr.
Teinture d'eucalyptus	2 gr.
Benzoate de soude.....	5 gr.
Sirop de térébenthine.....	20 gr.
Sirop de Tolu	40 gr.
Eau de tilleul.....	q.s. p. 120 cc.

(D.S.A.)

Bronchopneumonie

Maintenir l'enfant dans une chambre bien aérée, à température constante.

Antisepsie des voies respiratoires supérieures.

Bottes de ouate aux jambes.

Régime lacté absolu.

Révulsion par les cataplasmes sinapisés. Selon la gravité ou : Bains tièdes (32 ou 35°).

Ou : Enveloppements froids permanents du thorax. Bains sinapisés.

Ou : Enveloppement froid total dans le drap mouillé essoré.

Maintenir la liberté des fonctions intestinales.

(Purgatif au Calomel).

Friction quotidienne avec gros comme une noisette de la pommade suivante :

Collargol	10 gr.
Eau distillée	5 gr.
Lanoline, Axonge Benzoïnée	âà 20 gr.

Si possibilité, remplacer par une injection quotidienne de 5 cmc. de

Solution injectable d'Electrargol au 1/100.

En ampoules de 5 cc.

Maintenir le diurèse par :

Théobromine, Phosphate neutre de soude	âà 0.10 etg.

(En cachets très petits et ronds.)

Soutenir le cœur par la caféine, la spartéine, l'éther, l'huile camphrée.

Injecter, si nécessaire, de la strychnine, du sérum artificiel, de l'eau de mer (à faibles doses), du sérum caféiné, de l'iodipine à 10 pour 100 (1 cmc par jour).

Donner la potion suivante :

Caféine, Benzoate de soude	âà 1 gr. 60
Vanilline	0 gr. 05
Sirop de Tolu	50 gr.
Rhum	20 gr.
Eau	q.s.p. 120 cmc.

Deux à 3 cuillerées à soupe par jour.

Soutenir l'état général par les stimulants diffusibles :

Acétate d'amoniaque..... / Teinture de cannelle..... \	ââ 5 gr.
Sirop de quinquina..... / Sirop d'éther..... \	ââ 40 gr.
Eau de Tilleul.....	q s. pour 120 cc.

(D. S. A.)

Dans quelques cas, la digitaline donne de bons résultats.

Solution alcoolique de digitaline cristallisée de Nativelle au millième..... ..	XXV gouttes.
Eau de tilleul.....	20 gr.
Sirop de maïs.....	q.s. pour 90 cmc

Donner selon l'âge de 1 à 2 cuillerées à café ou à entremets par jour.

L'alcool est presque toujours indiqué :

Teinture de cannelle.....	5 gr.
Eau-de-vie vieille ou Rhum... / Sirop simple ..... \	ââ 40 gr.
Eau distillée.....	q s. pour 150 cc.

(D. S. A.)

Brûlures

Sur les brûlures légères :

Irrigations d'eau froide.

Appliquer la pommade suivante :

Antipyrine Orthoforme	ââ 0.50 etgr.
Vaseline Lanoline	ââ 15 gr.

Ou du liniment oléo-calcaire fraîchement préparé.

Dans les brûlures phlycténulaires, ouvrir au point déclive la phlyctène avec une aiguille flambée. Panser avec la pommade précédente ou avec :

Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 05
Aristol Oxyde de zinc	ââ 0,50.
Vaseline Lanoline	ââ 20 gr.

Dans les brûlures très intenses ou suppurées, pansement humide antiseptique avec :

Acide picrique	0 gr. 50
Eau	100 gr.

Ou appliquer la pommade suivante :

Naphtolate de soude	3 gr.
Essence de Thym — Origan — Verveine — Géranium	ââ 0 gr. 25
Vaseline	100 gr.

Faire ultérieurement des greffes, si nécessaire.

Céphalées

Rechercher la cause.

1° Si hérédité syphilitique, faire tous les 15 jours une injection de 1/4 de cmc. d'huile à l'amalgame d'argent à 16 p. 0/0. Faire 6 à 8 injections.

2° Si astigmatisme ou troubles de la vision, faire porter des verres adaptés et imposer un repos relatif.

3° Si rhinite chronique ou végétations adénoïdes, les soigner d'urgence.

4° Si mauvaises digestions, donner, après chaque repas :

Pepsine.....	
Maltine.....	ââ 0 gr. 05
Paneréatine.....	
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 20

(Par paquet) n° 30, à donner 8 jours, suivis de 8 jours de repos, et continuer ainsi pendant 3 ou 4 mois.

Éviter la constipation en donnant du Sirop de pommes de reinette :

Extrait mou de séné.....	1 gr. 10
Manne en larmes.....	
Pulpe de Tamarin.....	ââ 5 gr
Sirop de coings.....	
Alcool à 90°.....	ââ 8 gr.
Caramel.....	0 gr. 50

Sirop de pomme	ââ 50 gr.
Sirop de sucre.....	
Eau distillée.....	20 gr.
Miel.....	80 gr.

ou du Sirop de figues de Californie :

Figues violettes coupées	25 gr.
Eau distillée.....	45 gr.
Sucre concassé.....	80 gr.
Extrait fluide de réglisse.....	5 gr.

ou Huile de Ricin, ou laxatifs variés.

5° Si neuro-arthritisme, donner du bromure et du benzoate de lithine.

6° Si anémie et faiblesse, donner du fer, du quinquina, de l'arsenic.

7° Si aucune cause appréciable, donner du phosphore, des glycéro-phosphates, de l'acide phosphorique, quelquefois, de la strychnine.

Sulfate de strychnine.....	0 01 à 0.02 cg.
Phosphate de soude.....	5 à 10 gr.
Eau	q. s. pr 100 cmc.

(2 à 3 cuillerées à café par jour).

Chlorose

Eviter les fatigues.

Séjour au lit pendant un minimum de dix heures. Aération soignée.

Alimentation composée de féculents (lentilles, pommes de terre, haricots en purée), de viandes rouges grillées, de viandes blanches, de légumes verts cuits, d'œufs, de boudin, de foie de veau, de beaucoup de pain.

Séjour autant que possible en pleine campagne. Un bain salé 2 fois par semaine.

Eviter la constipation et favoriser la digestion.

Donner du fer, de l'hémoglobine ou du manganèse.

Formuler par exemple :

Hémoglobine	10 gr.
Glycérophosphate de soude à 50 0/0	5 gr.
Glycérine neutre	10 gr.
Sirop de Vanille	q. s. p. 80 cmc.

(De 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.)

Ou :

Tartrate ferrico-potassique	2 gr.
Phosphate de soude	4 gr.
Eau distillée	40 gr.
Sirop d'écorces d'oranges	q. s. p. 150 cmc.

(D. S. A.)

Choléra Infantile

Immédiatement, régime de l'eau bouillie.

Injecter quotidiennement 20 centimètres cubes de :

Chlorure de sodium.....	0,70
Sulfate de soude	1 gr.
Eau distillée stérilisée.....	100 gr.

Ou :

20 cmc. d'Eau de mer.

Lavages de l'estomac, si nécessaire.

Lavements très haut portés, avec une solution de nitrate d'argent à 1 pour 10.000.

Faire prendre 4 cuillerées à café de :

Eau chloroformée officinale.

Soutenir le cœur par la strychnine, la caféine, la spartéine.

Chorée

Mettre délibérément l'enfant au lit pendant une quinzaine de jours. Isolement. Repos intellectuel absolu.

Saupoudrer les draps d'une grande quantité de poudre de talc.

Surveiller les urines, et laisser l'enfant au régime lacto-végétarien.

Donner 4 fois par jour une cuillerée à soupe de la potion suivante :

Antipyrine	1 gr.
Eau de tilleul.....	80 gr.
Sirop de sucre.....	q.s. p. 180 cmc.

Donner deux fois par jour une granule d'arséniate de soude de un milligramme, ou :

Liqueur de Fowler.

(De cinq à dix gouttes, deux fois par jour).

A titre exceptionnel : hydrothérapie par le drap mouillé.

Au bout de 15 jours, associer l'arsenic au fer.

Arséniate de soude cristallisé....	0 gr. 032
Sulfate ferreux.....	0 gr. 028
Acide citrique.....	0 gr. 04
Eau distillée.....	1 gr.
Sirop de sucre.....	q.s.p. 100 cmc.

(Deux cuillerées à café par jour).

Saison thermale à Bourbon-Lancy.

Circoncision

Indications : S'il y a phimosis avec adhérences.

S'il y a incontinence nocturne d'urine.

Si l'orifice préputial présente un calibre inférieur au canal de l'urètre, l'enfant en urinant détermine alors la formation d'une poche préputiale.

S'il y a formation abondante de smegma avec balanite.

Cirrhose

Régime lacté : Tisanes de chiendent ou de queues de cerises.

Potion avec :

Nitrate de Potasse..... / Aeétate de Potasse..... \	ââ 1 gr.
Oxymel seillitique..... / Sirop des einq raeines..... \	ââ 20 gr.
Infusion de baies de genièvre..	q. s. p^r 120 eme.

(D. S. A.)

Cirrhose cardio-tuberculeuse

Ponctions répétées de l'ascite.

Digitaline à dose faible comme toni-cardiaque :

Deux gouttes de solution aleoolique de digitaline eristallisée au millième, par jour, pendant 15 jours par mois.

Régime lacto-végétarien et déchloruré.

Si nécessaire, ventouses scarifiées sur le foie.

Traitement général de la diathèse tuberculeuse par l'huile de foie de morue, l'arsenic.

Cœur

Voir : Asystolie, Endocardites, Myocardites, Hypertrophie, Péricardites.

Coliques hépatiques

Application sur le ventre de cataplasmes laudanisés, de compresses d'eau chaude ou d'un sac d'eau chaude. S'il est nécessaire, faire une injection de morphine (D.S.A.). Sinon, donner la potion suivante :

Teinture de Belladone.....		XX gouttes.
Sirop d'éther..... ...	ââ	20 gr.
Sirop de morphine.....		
Eau chloroformée.....		40 gr.
Eau de tilleul.....q.s. pour		120 cmc.

(D. S. A).

Parfois, un lavement au chloral est nécessaire.

Dans l'intervalle des crises, administrer l'huile d'olive ou l'huile de Haarlem ou la glycérine. Donner des alcalins (eau de Vals ou eau de Vichy) et ne pas hésiter à avoir recours au glycogène ou à l'opothérapie hépatique.

Coliques intestinales

Appliquer soit des compresses d'eau chaude bien essorées, soit une vessie de glace, soit des compresses imbibées d'alcool. Massages légers avec :

Huile de jusquiame.....	ââ 40 gr.
Huile de camomille camphrée.	

Donner des infusions tièdes soit de camomille, soit de menthe.

Petits lavements répétés.

En cas de douleurs trop vives, potion avec :

Teinture de Belladone.....	1 gr.
Hydrate de chloral.....	0 gr. 50
Sirop d'éther..... q.s. pour	60 cmc.

(D S. A.).

Conjonctivites

Dans les conjonctivites simples, faire des lotions boriquées ou des lotions à l'eau de guimauve.

Instiller 3 fois par jour le collyre suivant :

Argyrol.....	0 gr. 50
Eau distillée.....	10 gr.

Ou, une seule fois par jour, le collyre suivant :

Sulfate de zinc.....	0 gr. 25
Eau distillée.....	10 gr.

Contre la conjonctivite gonococcique :

D'emblée, instiller une ou deux fois par jour le collyre suivant :

Nitrate d'argent.....	0,10 centig.
Eau distillée.....	10 gr.

Lavages fréquents toutes les heures des culs-de-sac conjonctivaux avec une solution de nitrate d'argent à 1 pour 10.000 à l'aide soit de tampons, soit d'une poire de caoutchouc.

Parfois, dans des cas graves, badigeonnages à pinceau de la surface conjonctivale avec une solution de nitrate d'argent à un pour 40.

Applications froides ou glacées sur les paupières, si les douleurs sont trop vives.

En cas d'ulcérations de la cornée, instiller un collyre à l'ésérine 2 fois par jour :

Sulfate d'ésérine.....	0,03 centig.
Eau distillée	10 gr.

Constipation

Alimentation végétarienne. Massages abdominaux.

Employer l'une des médications suivantes :

1° les suppositoires,
au beurre de cacao,
à la glycérine.

2° les lavements,
soit avec de l'eau pure,
soit avec de l'eau additionnée de glycérine neutre,
..... d'huile d'olive.
et, en cas de nécessité de :

Sulfate de soude.....	
Miel de mercuriale.....	ââ 15 ou 10 gr.
Follicules de séné.....	

3° les drogues suivantes :

Teinture de feuilles de Belladone au 1/10.....	0. 15 à 0.30
Extrait fluide de séné.....	0. 20 à 0.60
Sirop de cascara.....	30 gr.

Usage du sirop de pommes de reinette, du sirop de figues de Californie, de la poudre de réglisse composée, de la magnésie, de l'huile de ricin donnée avec du cassis, de la manne, des infusions de pruneaux et de séné, ou :

Manne en larmes.....	30 gr.
Follicules de séné.....	4 gr.
Poudre de café torréfié.....	10 gr.
Eau bouillante.....	200 gr.

(à donner dans la journée).

Convulsions

Pendant la crise :

Desserrer les vêtements. Aération large. Donner de suite un lavement huileux, et, si possible, le lavement suivant :

Hydrate de chloral.....	0.30 cg.
Musc.....	0.20 cg.
Camphre.....	1 gr.
Jaune d'œuf.....	n° 1.
Eau distillée.....	100 gr.

Faire respirer quelques gouttes d'éther, et, dans les cas graves, du chloroforme.

Immédiatement après la crise, bain tiède ou bain de tilleul.

Dans l'intervalle des crises :

Rechercher l'hérédosyphilis, et, dans ce cas : médication mercurielle (surtout en bas âge avant 1 an).

Examiner avec soin les fonctions digestives, user fréquemment des purgatifs et des laxatifs.

Surveiller l'alimentation (surtout de 1 à 5 ans).

Rechercher les stigmates de tuberculose.

Si les convulsions paraissent essentielles, calmer la débilité nerveuse par les cures bromurées et par le chloral.

Bromure de potassium.....	1 à 5 gr.
Chloral.....	0.05 à 1 gr.
Sirop de fleurs d'oranger..	20 gr.
Eau de tilleul.....	q.s. pour 120 cc.

On peut user du Bromidia qui contient :

Bromure de potassium.....	20 gr.
Hydrate de chloral.....	20 gr.
Extrait de chanvre indien.....	0 gr. 20
Glycirrhizine.....	1 gr.
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 20
Alcool à 60°.....	2 gr.
Eau distillée	80 gr.

ou de la Staphylase bromurée.

Coqueluche

A la période de début, quand le diagnostic est indécis, qu'il y a du catarrhe et une simple tendance spasmodique, mais non caractéristique, donner :

Terpine.....	0 gr. 60
Benzoate de soude ..... / Antipyrine..... \	ââ 1 gr.
Eau distillée ..... } Julep gommeux..... }	ââ 20 gr.
Sirop de Tolu.....	q.s. p. 100 cmc.

(Doses selon l'âge).

Pendant la période d'augmentation ou d'état des quintes, isoler l'enfant, même et surtout d'autres

enfants qui ont la coqueluche ; lui interdire tous jeux bruyants, et ne pas trop s'occuper de lui. Le laisser 12 heures en moyenne au lit. Éviter de le faire causer, et écarter tout ce qui peut le surexciter.

Donner en 4 fois dans la journée une dose variable d'antipyrine de 0.50 à 1 gr.

Antipyrine.....	4 gr.
Eau de Tilleul.....	40 gr.
Sirop de sucre.....	q. s. pour 100 cmc.

Deux fois par jour du sirop phéniqué.

Acide phénique pur.....	âà 0,50.
Alcool à 90°.....	
Sirop simple.....	99 gr.

(D. S. A.)

De 2 cuillerées à café à 2 cuillerées à soupe par jour selon l'âge. Surveiller les urines, cesser si elles tendaient à devenir noires, et de temps en temps quelques jours de repos.

Trois fois par jour, mettre dans chaque narine un peu de la pommade suivante :

Eucalyptol.....	0 gr. 25
Chloretone.....	0 gr. 50
Chlorhydrate de cocaïne.....	0 gr. 10
Vaseline pure	40 gr.

Faire remplir tous les jours par la famille, le tableau suivant :

Jours	Température		Nombre de quintes		Etat général	Urines		Vomissements
	matin	soir	jour	nuit		Aspect clair ou trouble abondantes ou non.	Albumine. Présence ou absence.	
I								
II								
III								

Le nombre des quintes augmente pendant les 15 premiers jours, reste stationnaire pendant 8 jours, décroît progressivement ensuite, et cesse en 5 à 6 semaines. A ce moment, faire changer l'enfant d'air et donner une médication reconstituante (jus de viande, arsenic, glycérophosphates, etc.).

Traitement par la Belladone :

Teinture alcoolique de feuilles de Belladone au 1/10e.....	
Teinture de Drosera rotundifolia au 1/5e.....	àà XX gouttes.
Teinture de Lobelie enflée au 1/10e.....	
Sirop de coquelicot.....	60 gr.
Sirop de Tolu..... q. s. pour	100 cme.

(D. S. A.)

Ou :

Extrait fluide de Grindelia robusta	1 gr.
Eau de laurier-cerise.....	10 gr.
Sirop de Belladone.....	20 gr.
Sirop de racines d'aconit	40 gr.
Sirop de menthe..... q.s. pour	120 cme.

(D. S. A.)

Traitement par le Bromoforme :

Bromoforme.....		XX gouttes
Eau de laurier-cerise.....		5 gr.
Alcool à 90°... .... Glycérine.....	âà	10 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....		q. s. p. 160 cme.

Donner 4 cuillerées (café, entremets, ou soupe selon l'âge) par jour.

Ou :

Bromoforme.....		7 gr.
Huile d'amandes douces..... Gomme arabique.....	âà	30 gr.
Sirop de fleurs d'oranger		40 gr.
Eau distillée.....		q.s.p. 300 cme.

Bien agiter avant d'en donner (Marfan).

(D. S. A.)

Surveiller très sévèrement la médication qui est très efficace, mais cesser dès les premiers signes d'intolérance.

Traitement par l'opium (Triboulet) :

Faire pendant 3 jours de suite une injection quo-

tidienne de 1/4 de cg. à 3/4 de cg. de chlorhydrate de morphine (selon l'âge).

Repos de 3 jours, puis nouvelle série et ainsi de suite.

La contr'indication est l'albuminurie.

Si on ne veut pas avoir recours aux piqûres, donner :

Sirop de morphine.....	
Sirop de codéïne.....	
— d'éther.....	ââ 20 gr.
— de Tolu.....	

(De 1 à 3 ou 4 cuillerées à entremets selon l'âge).

Contre les vomissements, employer l'eau chlorobromoformée.

Cornée (Keratites).

Justiciables en général de la pommade suivante :

Oxyde jaune d'hydrargyre	0 gr. 30
Vaseline	10 gr.

Lotions fréquentes avec de l'eau de guimauve boriquée.

En cas de nécessité, collyres faibles à l'atropine 3 fois par jour :

Eau distillée.....	10 gr.
Sulfate d'atropine.....	0 gr. 03

Si nécessaire, cautérisations légères au thermo ou galvano-cautère des ulcérations.

Corps étrangers

de l'oreille :

Essayer d'une injection d'eau tiède, de l'extraction directe, souvent avec un fil d'argent ou de laiton stérilisé et coudé en anse et qu'on fait passer derrière le corps étranger.

des voies aériennes :

Essayer la trachéobronchoscopie avec extraction directe, si on a les moyens. Sinon, trachéotomie, après 1 ou 2 tentatives de tubage.

de l'œsophage :

Utiliser soit le panier de de Grœfe, soit le crochet de Kirmisson.

des voies digestives :

Abstention dans la plupart des cas. Laparotomie en cas d'accident.

Coryza

Introduire 2 ou 3 fois par jour dans chaque narine, soit avec une cuillère, soit avec une petite seringue de Marfan, la solution suivante :

Résorcine	0 gr. 50
Huile d'olive	15 gr.

ou de la pommade avec :

Eucalyptol	0 gr. 20
Menthol	0 gr. 10
Resoreine	1 gr.
Vaseline	30 gr.

Traiter la cause (diphtérie, syphilis).

Coxalgie

Dès le début, immobilisation sur un lit plat et faire pendant 8 jours (ou plus, selon la nécessité) de l'extension continue. Dès que toute contracture ou toute douleur a cessé, faire un appareil plâtré, la jambe dans l'extension. Refaire, si nécessaire, 2 ou 3 appareils, mais en tous cas, immobilisation de 8 mois à un an.

S'il y a attitude vicieuse, prolonger l'extension continue, et parfois, faire des redressements progressifs sous chloroforme. Plâtrer en bonne position.

Ne permettre que lentement et progressivement les mouvements lors de la convalescence.

En cas d'abcès : ponctions et injections modificatrices d'éther iodoformé.

Traitement général de la tuberculose.

Séjour au bord de la mer autant que possible.

Craniotabes

Médication générale du Rachitisme et régime alimentaire approprié.

Donner pendant 8 jours une cuillerée à café ou à entremets, selon l'âge, de :

Huile phosphorée à un pour dix mille.

Repos de 8 ou 15 jours et recommencer. Surveiller la médication.

Crevasses

Faire porter des gants ; ne pas toucher à l'eau froide ou à la glace.

Le soir, au coucher, onctions soit à l'eau de Gorlier, soit avec la mixture suivante :

Glycérolé d'amidon à la glycérine neutre.....	40 gr.
Tanin.....	0, 20 cg.
Essence de roses.....	V gouttes.

Croissance (Troubles de la)

Anémies de croissance : peuvent être la conséquence de prolongation trop grande de l'alimentation exclusive par le lait ou d'une mauvaise direction de l'alimentation des premières années. Dans ce cas, médications ferrugineuses et iodées, alimentation carnée.

Fièvre de croissance, symptômatique de troubles divers. (Séjour à la mer ou à la campagne, phosphates).

Insuffisance d'élargissement du thorax avec troubles, cardiaques, ou pulmonaires (Gymnastique rationnelle).

Céphalées de croissance, troubles encéphaliques, nervosisme exagéré, excitation intellectuelle, fatigue rapide (v. céphalée).

Asynchronisme de développement organique : (Agir sur l'organe en retard sur les autres et s'occuper des glandes à sécrétion interne comme la thyroïde.

Elongation médullaire trop rapide, d'où fatigue cérébrale et générale, etc. (Douches, massage, médication phosphatique).

Croup

V. Diphtérie.

Cystite

Donner, selon l'âge, chaque jour, un ou deux des cachets suivants :

Urotropine.....	0 gr. 25

Par cachet.

Tisanes émollientes, d'orge, de graine de lin, de chiendent, de queues de cerises.

Parfois, avoir recours au salol :

Salol.....	1 gr.
Gomme adragante.....	0 gr. 05
Gomme arabique.....	1 gr.
Teinture de Tolu.....	2 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères	20 gr.
Eau distillée..... q.s. pour	100 cmc.

(Donner cette potion en 2 ou 3 jours).

Dans les formes graves, instiller dans la vessie, soit de l'huile gomenolée à 1 pour 20, soit faire des lavages vésicaux avec une solution de nitrate d'argent à un pour dix mille.

(V. vessie).

Diabète

Interdire les féculents. Donner de l'eau de Vichy.

Donner X gouttes à chacun des deux principaux repas, pendant 15 jours, de la solution suivante :

Arséniate de soude.....	0 gr. 25
Permanganate de potasse.....	5 gr.
Eau distillée.....	95 gr.

Les 15 jours suivants, recourir à l'arsenic et à la strychnine.

Arséniate de fer	0 gr. 001
Extrait de noix vomique.....	0 gr. 002
Extrait de gentiane.....	0 gr. 03
— de valériane.....	q. s.

par pilule, (1 à 3 par jour.)

Alterner avec la médication suivante :

Poudre de foie ou extrait hépatique.

Et, dans le cas d'amaigrissement :

Extrait pancréatique.

En cas de coma ou de tendance au coma, faire sucer de la glace, injections d'eau de mer, injections d'éther et de caféine.

Diarrhée

Contre la diarrhée non infectieuse par dyspepsie, colorée ou non en vert par de la bile :

Réduction momentanée ou changement de l'alimentation.

Si nécessaire, régime de l'eau ou du bouillon de légumes. Donner de l'eau de riz, de l'eau de chaux, de l'eau albumineuse.

Trois à quatre fois par jour un des paquets suivants :

Tannigène.....	0 gr. 10

par paquet

Ou :

Betol.....	1 gr.
Salol.....	0 gr. 40
Sirop de coings.....	40 gr.
Julep gommeux.....	q. s. p. 100 cmc.

Agiter. (D. S. A.)

Ou :

Sous-nitrate de Bismuth	1 gr.
Julep gommeux.....	60 gr.
Sirop de ratanhia.....	q. s. p. 80 cmc.

D. S. A.)

Ou :

Acide lactique.....	1 gr.
Eau de tilleul.....	50 gr.
Sirop de mûres.....	q. s. p. 90 cmc.

(1 cuillerée à café, 4 à 5 fois par jour).

Lors de la reprise de l'alimentation normale, donner des paquets eupeptiques (3 par jour) après les 3 principaux repas.

Biearbonate de soude.....	0 gr. 20
Pancréatine.....	0 gr 10
Enterokinase.....	0 gr. 10

ou de l'eau de Vals ou de Vichy.

Si la diarrhée est verte et fétide, sans fièvre, donner d'abord, avant d'instituer le traitement précédent, un paquet de :

Calomel....	(0.05 cg. par année d'âge).
Sucre de lait.....	0 gr. 50

Diarrhée verte infectieuse

Immédiatement, régime aqueux strict, et purgatif au calomel.

Le lendemain et jours suivants, injections de 20 cmc. d'eau de mer ou de sérum de Hayem.

Si vomissements : potion de Rivière, café, thé, un peu de rhum. Puis potion avec :

Salicylate de bismuth.....	0 gr. 50
Sous nitrate de bismuth.....	1 gr.
Résorcine.....	0 gr. 25
Julep gommeux.....	60 gr.
Sirop de coings.....	q. s. p. 90 cc.

Agiter (D. S. A.).

Grands lavages de l'intestin à l'eau salée à 1 p. 200, ou avec une solution de nitrate d'argent à 1 pour 12000.

Reprise prudente de l'alimentation, d'abord légère.

Diarrhée chronique

Administrer du phosphate de chaux en poudre ou des paquets de :

Craie préparée.....
Phosphate de chaux..... } ââ 0 gr. 20
Bicarbonate de soude.....

(2 à 3 par jour).

Dans les cas rebelles, avoir recours à l'opium sous forme d'élixir parégorique.

Diphtérie

Immédiatement, et sans attendre, injecter sous la peau de l'abdomen, à gauche, 20 centimètres cubes de sérum de Roux, (10 centimètres cubes seulement

chez les enfants au-dessous de 1 an chez qui la diphtérie est rare).

Dans les formes graves, renouveler la dose de sérum dès le lendemain.

Dans les cas à diagnostic clinique douteux, ne pas hésiter à faire une injection, si on ne peut pas voir fréquemment le malade. Pour peu que la diphtérie soit simplement soupçonnée, ne pas différer l'injection.

Lit et isolement. Lait. Examen quotidien des urines.

Soins minutieux de la bouche.

Si le nez est pris, instiller 3 fois par jour, dans chaque narine, avec une seringue de Marfan, un peu de la solution suivante :

Eucalyptol.....	0 gr. 25
Résorcine.....	1 gr.
Huile gomenolée au 1/50.....	30 gr.

En cas de coryza fétide et sanguinolent, pulvériser 2 ou 3 fois par jour avec un pulvérisateur spécial un peu de solution au nitrate d'argent à 1 pour 300.

Contre l'angine, abstention thérapeutique, si elle est légère.

Si l'exsudat est sanieux et fétide, lavages de la gorge (2 fois par jour en moyenne) avec une des solutions suivantes :

4 cuillerées à soupe d'eau oxygénée à 12 vol.
4 cuillerées à soupe de liqueur de Labarraque.
4 grammes de chloral
} par litre d'eau

Lorsque les fausses membranes se détachent facilement, dans les formes ordinaires, ne rien faire.

Pendant le détachement dans les formes associées, éviter les lavages, faire quelques attouchements avec des tampons de coton imbibés d'eau oxygénée à 12 vol. diluée dans 2 parties d'eau, ou mieux des attouchements avec une solution de nitrate d'argent à 1 p. 250 (se méfier pour éviter la coloration noire des mains).

S'il y a diphtérie laryngée ou croup :

Tenter d'abord le tubage, et, si on échoue, faire la trachéotomie.

Indications du tubage :

Quand l'enfant présente de la dyspnée continue et progressive, s'il n'y a pas au moins 12 heures qu'il ait été injecté au sérum.

Ne pas attendre pour tuber que l'enfant présente les deux tirages sus et sous-sternal, très accentués. Tuber aux premières ébauches du tirage sous-sternal.

Intervenir dans les accès de dyspnée spasmodique intense et prolongée ; attendre si on est sûr de soi et si on peut rester près de l'enfant ; intervenir toujours si on est obligé de s'éloigner.

Si on ne peut rester, tenter l'abstention d'intervention après 12 heures d'injection, en donnant de l'antipyrine et en pratiquant des enveloppements froids, mais ne pas trop temporiser.

Laisser toujours le tube en place *pendant au moins 48 heures.*

Détuber toujours par l'énucléation.

Ne pas quitter son malade après le détubage pendant au moins 2 heures.

Tuber l'enfant couché et à plat (diminution des aides, facilité plus grande de maintien, syncopes plus rares, position toute prête pour la trachéotomie).

Ne pas craindre de faire des tubages prolongés ou répétés dans quelques cas particuliers.

Sauf le cas d'obstruction du tube par fausses-membranes ou par mucosités, s'abstenir autant que possible d'injections intra-trachéales. Les employer alors soit à l'huile eucalyptolée, soit à l'huile gomenolée (au 1/100).

Le tubage bien fait doit être fait avec douceur et sans faire saigner le malade.

En cas d'impossibilité de tubage, d'impossibilité

de s'occuper sérieusement de l'enfant, de non soulagement de la dyspnée par le tubage, pratiquer la trachéotomie.

Respiration artificielle en cas de mort apparente.

Retenir que toute injection précoce supprime les causes d'intervention.

Maintenir de la vapeur d'eau dans la chambre à l'aide d'une bassine d'eau, laissée presque à l'ébullition dans laquelle on mettra soit :

des feuilles d'eucalyptus,

Soit 1 cuillère à café de la mixture suivante :

Eucalyptol	10 gr.
Essence de thym, — citron, — lavande	ââ 5 gr.
Alcool 96°	150 gr.

Accidents possibles du sérum avec date habituelle d'apparition.

Erythème au niveau de la piqûre le lendemain.

Eruption d'urticaire apyrétique prurigineuse (48 heures à 3 jours après).

Eruption d'érythème marginé aberrant fébrile (de 3 à 8 jours après).

Scarlatinoïde métadiphtérique fébrile (de 12 à 15 jours après) ne s'observe que dans des formes graves de diphtérie associée et est probablement indépendante du sérum.

Albuminurie passagère et légère d'élimination du sérum (dure 48 h. à 6 jours après l'injection).

Tous ces accidents sont sans gravité.

Paralysies post-diphtériques.

Injections répétées de sérum à petite dose (5 cc.)
Electrisation.
Administrer la strychnine.

Myocardites et Thromboses.

Injections de caféine, de spartéine, d'huile camphrée, de sérum caféiné ;

Caféine	ââ 0.50 centig.
Benzoate de soude	
Chlorure de sodium	0 gr. 07
Eau distillée stérilisée	100 cc.

Rarement, utiliser la digitale.

Diphtéries associées et graves.

Dès le début, injecter tous les jours 1 cme. d'Iodipine à 10 p.%, alterner avec l'électrargol (5 cmc), ou avec le glycophénique injectable ou l'iodophénique injectable.

I

Acide phénique	1 gr.
Glycérine pure à 30°	10 gr.
Eau distillée	100 gr.

Ou

℞

Iode pur.....	0 gr. 30
KI sublimé.....	0 gr. 06
Acide phénique pur.....	2 gr.
Glycérine.....	5 gr.
Eau distillée.....	q.s p. 100 cc.

(Une seringue de Pravaz par jour).

Bronchopneumonies.

Bains. Enveloppements froids. Caféine. Cataplasmes sinapisés.

Convalescence.

Donner des reconstituants, de l'arsenic, des glycérophosphates.

Faire faire l'ensemencement de la gorge 18 à 20 jours après l'injection de sérum, et, s'il est négatif on peut désinfecter la chambre et laisser l'enfant retrouver ses camarades.

Dysenterie

Purgatif à l'huile de ricin ; irrigations intestinales chaudes à l'eau naphtolée ; glace sur le ventre. Diète hydrique.

Le plus tôt possible, injecter 10 cc. de sérum anti-dysentérique, et renouveler l'injection le lendemain.

Tous les jours, pendant trois jours, deux lavements de nitrate d'argent au dix-millième.

On peut remplacer par les lavements à l'ipéca (5 gr. pour 100 d'eau).

Assez rapidement, avoir recours aux opiacés.

Diascordium	ââ 2 gr.
Sous-nitrate de Bismuth	
Julep gommeux.....	50 gr.
Sirop de groseilles	q.s. p. 120 cc.

(D. S. A.)

Ou :

Elixir parégorique.....	10 gr.
Benzo-naphtol.....	10 gr.
Julep gommeux	q.s. p. 120 cc.

(D. S. A.)

Le chlorure de calcium est indiqué d'une façon continue.

Chlorure de calcium.....	2 gr.
Sirop de menthe.....	40 gr.
Eau distillée.....	q.s. p. 100 cc.

(D. S. A.)

Dysidrose

Lavages ou bains à l'eau de son.

Poudrer avec :

Acide salicylique	0 gr. 50
Poudre d'amidon.....	30 gr.

(Mêler finement.)

Dans les formes graves, rompre les vésicules, laver avec une solution faible de formol et poudrer avec de la poudre de quinquina.

Dyspepsie

Hygiène alimentaire sévère.

Si on observe des vomissements, des régurgitations, une odeur acide et âcre, pratiquer des lavages de l'estomac.

Administration de Bicarbonate de soude (eaux de Vichy, de Vals).

Si tympanite, hoquet, flatulence, lenteur des digestions, donner après le repas un des paquets suivants :

Pepsine Maltine Pancréatine	ââ 0 g. 05 à 0 g. 10
Bicarbonate de soude	0,10 à 0 gr. 20

Par paquet.

Ou :

Pepsine liquide (titre 100) Pancréatine (titre 50) Diastase (titre 50)	ââ 5 gr.
Glycérine pure	30 gr.
Sirop de limons	q.s. p. 150 cmc.

(D. S. A.)

Ou :

Pepsine (liquide titre 100).....	
Maltine ..... (titre 50.....	ââ 5 gr.
Paneréatine.)	
Elixir de Garus.....	20 gr.
Eau distillée.....	60 gr.
Glycérine.....	20 gr.
Sirop simple.....	q s. p. 150 cmc.

(D. S. A.)

Avoir recours, à l'occasion, au suc gastrique de porc.

Si, la digestion intestinale est lente, donner :

Enterokinase granulée : de 0,20 à 0,40 cg.

Si l'absorption est lente, les selles fétides, essayer de modifier la flore bactérienne de l'intestin. Tenter :

Les bouillons lactiques.
La paralactine.
Les ferments lactiques (comprimés de Lactifère).
La staphylase.
La levure de bière.

Ou les laits fermentés : Kefir n° 2, Koumys, Yohourth.

Chez les enfants assez âgés, avec infections intestinales, donner avant chacun des 2 principaux repas :

Cinq gouttes de vanadine (tetraoxyde de vanadium) 1 heure après le repas.

Ou après :

Eau chloroformée saturée (1 cuillère à soupe).

Insister sur les laxatifs :

Poudre de réglisse composée.
Eau d'Hunyadi-Janos.
Magnésie anglaise.
Phosphate et sulfate de soude.
Sulfate de magnésie. Sel de Sedlitz.
Huile de ricin.
Eau de Montmirail.
Cures de Châtel-Guyon.

Ecthyma

Pansement humide sur les pustules.

Appliquer ensuite au choix :

Pommade, emplâtre, poudre au Peroxyde de zinc (ektogan).
Pommade ou poudre à l'aristol.
Emplâtre rouge de Vidal.

Eczéma

Distinguer l'eczéma non infecté et l'eczéma infecté.

Pour l'eczéma non infecté, différencier l'eczéma sec et l'eczéma suintant.

Eczéma suintant non infecté.

Avoir recours aux pommades à l'oxyde de zinc ;

Oxyde de zinc.....	1 gr.
Vaseline.....	ââ 15 gr.
Lanoline.....	

S'il y a des croûtes ou une irritation trop vive, commencer par appliquer quelques pansements humides soit avec de l'eau boriquée :

Acide borique.....	10 gr.
Eau bouillie.....	500 gr.

Soit avec une solution de nitrate d'argent à 1 p. 10.000.

Comme autres topiques, on peut formuler :

Glycérolé d'amidon à la glycérine neutre.....	30 gr.
Ichthyol ou Huile de cade.....	2 gr.
Carbonate de magnésie.	1 gr.

Si les pommades sont mal tolérées, saupoudrer avec une des poudres suivantes :

Oxyde de zinc.....	
Sous-nitrate de Bismuth.....	ââ 10 gr.
Talc.....	

Ou :

Dermatol.....	
Oxyde de zinc.....	ââ 10 gr.
Amidon.....	

Empêcher le grattage. Empêcher l'action de l'air. Abstention de bains. Pas de lavages au savon.

Pas de frottements. Lavages légers avec un tampon de coton imbibé de décoction tiède de bois de Panama. Séjour d'altitude. Usage des arsénicaux.

Si l'eczéma est légèrement infecté, avoir recours aux pommades antiseptiques comme :

Dermatol		1 gr.
Vaseline	âà	15 gr.
Lanoline		

Ou :

Résorcine	0 gr. 50
Axonge benzoïnée	20 gr.

Ou :

Peroxyde de zinc (ektogan)		0 gr. 50
Oxyde de zinc		1 gr.
Vaseline	âà	15 gr.
Lanoline		

Ou :

Aristol		1 gr.
Vaseline	âà	15 gr.
Lanoline		

Contre les eczémas secs :

Onctions au glycérolé d'amidon ou à la crème de sapolan blanc.

Acide tartrique		1 gr.
Goudron		2 gr.
Glycérolé d'amidon		40 gr.

Ou :

Huile de cade		1 gr.
Oxyde de zinc		2 gr.
Vaseline	âà	20 gr.
Lanoline		

Emplâtres caoutchoutés à l'oxyde de zinc ou mettre des bandelettes imbriquées :

A l'huile de cade désodorisée.
Au peroxyde de zinc et oxyde de zinc (ektogan).

Quelquefois, il est utile d'avoir recours aux préparations soufrées :

Soufre précipité	2 gr.
Oxyde de zinc.....	1 gr.
Axonge benzoïnée	40 gr.

Contre l'eczéma suintant et infecté.

Appliquer sans retard 3 à 4 pansements humides avec une solution de nitrate d'argent à 1 p. 300. Mettre des gants pour faire le pansement. Ne pas s'inquiéter de la coloration noire des tissus.

Puis, continuer par de larges onctions au glycérolé d'amidon en revenant sans crainte aux pansements nitratés, s'il se reproduit des foyers infectés ou des fissures profondes.

Embarras gastrique

Donner, si nécessaire, un vomitif, et, en tous cas, un purgatif, de préférence sous forme de lavement.

Donner de 2 à 4 cuillerées à entremets par jour de :

Eau chloroformée saturée.

Beaucoup d'eau de Vichy (Célestins), maintenir au régime de l'eau ou du lait. Donner cinq des paquets suivants par jour :

Betol.....	ââ 0 gr. 10
Magnésie.....	
Sucre en poudre.....	0 gr. 50

Par paquet.

Emphysème

Faire faire de temps en temps des cures iodurées.

Iodure de sodium.....	5 gr.
Sirop de Tolu.....	60 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères	q. s. p. 120 cmc.

(Une à 3 cuillerées à café par jour).

Potion à la terpine, s'il y a en même temps de la bronchite.

Terpine.....	ââ 0 gr. 80
Benzoate de soude.....	
Sirop de Tolu.....	ââ 50 gr.
Julep gommeux.....	
Eau de tilleul.....	q. s. p. 120 cmc.

Agiter.

(3 à 5 cuillerées à soupe par jour).

Cures d'altitude.

Empoisonnements

Thérapeutique très variable selon la cause. Les indications générales sont les suivantes :

S'il en est encore temps, évacuer la substance ingérée, soit de préférence par un lavage d'estomac, soit, à son défaut, par l'administration d'un vomitif.

Purger avec un purgatif approprié.

Mettre au régime de l'eau ou du lait.

Stimuler les fonctions urinaires et sudorales.

Soutenir le cœur.

Calmer les phénomènes d'excitation ou spasmodiques ou convulsifs par des médicaments appropriés.

Donner les antidotes réputés spécifiques pour chaque variété d'empoisonnement. (La plupart des carnets de visite que possèdent les médecins en donnent une nomenclature détaillée).

Endocardite

S'il s'agit d'*endocardite rhumatismale*, insister sur la médication salicylée et sur l'aspirine. Laisser l'enfant au lit, au lait. Bien surveiller la diurèse.

Contre l'éréthisme cardiaque, donner la digitale à faibles doses.

Solution alcoolique de Digitaline cristallisée de Nativelle au millième.....	XX gouttes
Eau distillée	40 gr.
Sirop de cerises... ....q.s. pour	60 cmc.

(Deux à quatre cuillerées à café par jour pendant 6 jours).

Lorsque la phase aiguë est terminée, faire prendre à l'enfant, 8 jours par mois, du salophène, et pendant 10 jours une préparation arsenicale. Faire faire une saison à Bourbon-Lancy.

Dans l'*endocardite infectieuse*, faire des applications de vessie de glace sur la région précordiale.

Administrer la quinine à doses faibles et répétées : donner, par exemple, quatre capsules de sulfate de quinine de 0 gr. 10, espacées toutes les trois heures.

Faire tous les jours une friction avec gros comme une noisette d'onguent au collargol.

Collargol.....	5 gr.
Lanoline	10 gr.
Axonge benzoïnée.....	20 gr.

Ou une injection sous-cutanée tous les deux jours de 5 cmc. d'électrargol. Quelques auteurs préfèrent l'injection intra-veineuse avec une aiguille très fine.

Il faut calmer l'éréthisme cardiaque par l'administration de bromures, de chloral.

Il faut être très sobre et très prudent dans l'administration de la digitale, qui peut donner lieu aux embolies ; on doit la donner à faibles doses continuées pendant quelque temps, mais on ne doit pas la donner quand il y a dilatation trop grande du cœur, tachycardie très accentuée, rythme fœtal ; il faut alors lui préférer la spartéine ou la caféine.

On peut formuler :

Teinture aleoolique de digitale au 1/10 ..... L gouttes
Sirop de cerises..... 60 eme.

(Deux à trois cuillerées à café par jour).

Lorsque la cicatrisation est faite et a laissé une lésion valvulaire déterminant des troubles d'hydraulique, insister sur l'hygiène : Eviter les fatigues physiques, les émotions vives, les troubles digestifs ; interdire les courses, les marches forcées.

Faire de la gymnastique rationnelle et passive, sans fatigue. Hydrothérapie bien conduite. Eviter le froid et l'humidité.

Une fois par mois, pendant cinq jours, donner cinq gouttes de la mixture suivante :

Teinture de Digitale.....
— seille..... } ââ 5 gr.
— aeonit.....

Engelures

Protéger contre le froid les parties prédisposées.

Lavages des mains avec de l'eau dans laquelle on mettra quelques gouttes de la solution ammoniacale suivante :

Saponine pulvérisée	0,50 cgr.
Teinture de savon	5 gr.
Lessive de soude	III gouttes.
Ammoniaque liquide....	250 gr.
Eau filtrée.....	q. s. p. 500 cmc.

Bains tièdes avec de l'eau de feuilles de noyer.

Pansements occlusifs avec de l'emplâtre à l'oxyde de zinc, ou applications pendant la nuit d'une des pommades suivantes :

Lycopode ..... Tannin.....	âà 0 gr. 50
Axonge fraîche.....	15 gr.

Ou :

Acide borique.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	1 gr.
Orthoforme	0 gr. 20
Lanoline	20 gr.

et, dans le jour, poudrer fortement avec de la poudre d'amidon.

Donner à l'intérieur de l'iode, du sirop antiscorbutique, de l'huile de foie de morue.

Quelquefois, il est bon de faire des badigeonnages iodés locaux tous les soirs.

Teinture d'iode.....	5 gr.
Glycérine	20 gr.

Entérite muco-membraneuse

Calmer la tendance au nervosisme par l'administration des bromures ou des préparations de valériane.

Eviter la constipation en donnant, chaque matin, pendant quinze jours, une cuillerée à soupe de graine de lin préparée et macérée pendant 1/2 heure.

Donner trois fois par jour, 6 gouttes de Teinture de Belladone ; augmenter de 2 gouttes chaque fois et chaque jour, de manière à arriver au 6e jour à une dose totale de 48 gouttes en trois fois. Maintenir cette dose pendant quatre à cinq jours ; puis faire suivre d'une période de quinze jours à trois semaines de repos.

Cesser la médication rapidement, s'il y avait de la dilatation pupillaire.

Si on ne veut pas avoir recours à la belladone, employer des doses faibles et longtemps répétées de sulfate de soude. Faire plusieurs cures successives à Châtel-Guyon.

Essayer le massage abdominal, l'électrisation abdominale, les grands lavages de l'intestin, mais sans pression, très espacés, et ne pas les poursuivre s'ils sont mal tolérés, ou s'ils ne paraissent pas produire de bons effets.

Quelquefois les injections d'eau de mer ont donné de bons résultats, surtout quand il parait y avoir dessèchement de l'organisme

Essayer les transformations biologiques de l'intestin par l'administration de levures de bière ou de vin sélectionnées, par les laits fermentés, Kefir, Yohourth, par les bouillons paralactiques ou les comprimés de ferments lactiques.

Une fois tous les quinze jours, un purgatif.

Entorse

Immobilisation et massage.

Epilepsie

Dans l'épilepsie symptomatique, traiter la cause.

Contre l'épilepsie idiopatique, emploi systématique des bromures.

Bromure de potassium — sodium — ammonium — calcium	ââ 5 gr.
Eau distillée	150 gr.
Sirop d'écorces d'oranges	q. s. p. 250 cc.

1, 2 ou 3 cuillerées à bouche par jour pendant 15 jours (repos de 8), reprise, etc.

Cures variables selon l'intensité.

Employer en même temps le régime déchloruré.

Hydrothérapie.

Au moment des crises, empêcher les morsures de la langue.

Epistaxis

Dans les formes légères, faire respirer de l'eau fraîche.

Dans les formes un peu sérieuses, sinapismes aux jambes.

Introduire dans les narines des tampons de coton imbibés de :

Antipyrine	2 gr.
Eau distillée	10 gr.

Ou :

Solution d'adrénaline au millième	1 gr.
Eau distillée	10 gr.

Ou :

Tamponner avec du Penghawar-Djambi, avec ou sans l'aide de pinces nasales et de spéculum.

Dans les formes graves, tamponnement complet des fosses nasales, antérieur et postérieur, en se servant de sonde de caoutchouc.

Cautérisation au galvanocautère des exulcérations de la muqueuse.

Erysipèle

Si l'érysipèle survient autour d'une plaie, appliquer des pansements humides répétés 2 fois par jour avec une solution de nitrate d'argent à 1 pour 10000.

E... Spontané de la face :

Même traitement. De préférence, toutes les heures ou toutes les deux heures, appliquer des compresses d'eau bouillie, aussi chaudes qu'on peut les tolérer, essorer rapidement et recouvrir de taffetas chiffon. Renouveler moins fréquemment la nuit.

Pulvérisations avec l'appareil de Championnière

toutes les 2 heures. Mettre avec l'eau à pulvériser 1 cuillerée à café de la solution suivante :

Sublimé	ââ 1 gr.
Acide tartrique	
Alcool 90°	100 gr.

Surveiller les urines. Régime lacté.

Injection d'électrargol tous les 2 jours (2 à 5 cmc.) ou d'une seringue de glycophénique :

Acide phénique	1 gr.
Glycérine pure à 30°	10 gr.
Eau distillée	100 gr.

Au moment de la desquamation, lavages avec des savons au goudron et enduire de la pommade suivante :

Résorcine	1 gr.
Lanoline	ââ 15 gr.
Vaseline	

Si les pulvérisations sont impossibles, employer la pommade à l'ichthyol :

Ichthyol	4 gr.
Goudron	2 gr.
Vaseline	40 gr.

Désinfection soigneuse des fosses nasales par la pommade suivante :

Menthol	0,25 cgr.
Résorcine	1 gr.
Vaseline	30 gr.

Erythèmes

Suppression de tout médicament.

Purgatif léger salin à l'eau d'Hunyadi-Janos ou à l'huile de ricin.

Lotions ou fomentations avec de l'eau de son, des infusions de camomille.

Bains d'amidon ou de son.

Poudrer avec de la poudre d'amidon.

Donner beaucoup de lait ou mettre au régime lacto-végétarien. Pas d'œufs. Boissons abondantes.

Erythème Induré

Repos au lit.

Médication salicylée, et, plus tard, huile de foie de morue et sirop iodo-tannique.

Enveloppement des membres avec des bottes de ouate après des frictions locales légères avec la pommade suivante :

Ulmarène	1 gr.
Essence de verveine	V gouttes
Vaseline, Lanoline	âà 25 gr.

Estomac

Voir Dyspepsies.

Favus

Faire tomber les croûtes à l'aide de savonnages et de pansements humides.

Epiler les parties malades et la bordure du favus. Maintenir la déglabration pendant trois mois.

Chaque soir, onctions sur le cuir chevelu avec :

Bioxyde jaune de mercure.....	0 gr. 20
Huile de cade.....	4 gr.
Axonge benzoïnée.....	20 gr.

Le matin, faire une lotion à l'eau tiède suivie d'une friction avec :

Alcool à 90°.....	100 gr.
Acide acétique cristallisable.....	1 gr.
Acide borique.....	2 gr.
Chloroforme.....	3 gr.

Dans la journée, recouvrir les parties malades de rondelles d'emplâtre de Vigo.

Contre le favus des ongles, arracher l'ongle après cocaïnisation et faire des pansements humides avec la solution suivante :

Iode	0 gr 50
Iodure de potassium	2 gr.
Eau distillée	1 litre.

Fièvre typhoïde

Nettoyages antiseptiques de la bouche et du nez. Lavage antiseptique des fesses et des organes génitaux.

Régime lacté, auquel on peut adjoindre, s'il n'y a pas contr'indication, du bouillon de légumes, du bouillon de poulet ou de jarret de veau dégraissé.

Application de glace sur le ventre. Saupoudrer celui-ci de beaucoup de poudre de talc, interposer une flanelle très épaisse et étaler la vessie de glace.

Bains froids de 4 à 5 minutes de durée donnés d'abord à 28° puis à 25°. Aspersions froides sur la tête pendant le bain.

Donner un bain toutes les 3 heures le jour et un seul la nuit (soit 4 par 24 heures).

Dans les formes légères, instituer la balnéation intermittente, c'est-à-dire ne donner des bains que lorsqu'il y a accès fébrile et que la température dépasse 39°.

Cesser les bains s'il y a frissons, apnée ou collapsus. Essayer alors les bains tièdes à 30° ou 32°.

Essayer également les bains progressivement refroidis en les donnant d'abord à 32° et refroidissant jusqu'à 20°.

Après le bain, envelopper l'enfant dans une couverture de laine et donner une boisson chaude.

Si les bains sont mal supportés, avoir recours soit :

1° Aux lotions vinaigrées tièdes (Un verre à Bordeaux de vinaigre arômatique par litre d'eau tiède). Envelopper l'enfant dans un peignoir et une couverture de laine.

2° Aux enveloppements froids. (Prendre un grand peignoir de tissu Kneipp, tremper dans l'eau à la température de la chambre, bien essorer, envelopper l'enfant dedans, puis dans une couverture de laine. Le mettre au lit).

Veiller aux fonctions intestinales. Purgatif au sulfate de soude dès le début ; puis, par la suite, lavements à l'eau bouillie froide additionnée ou non de glycérine ou d'huile, matin et soir. Si nécessaire, avoir recours au sulfate de soude ou au sulfate de magnésie en lavements.

Lors de la défervescence, avoir recours à l'huile de ricin comme purgatif et laxatif.

Si les selles sont très fétides, donner :

Benzo-Naphtol.....	1 gr.
Salicylate de Bismuth	0 gr. 25
Julep gommeux.....	90 cme.

Agiter. Une cuillerée à soupe toutes les 3 heures.

A titre de tonique, administrer tous les jours de la quinine :

Capsules de sulfate de quinine de 0,10 centigr.

Une toutes les 3 heures (5 à 6 par 24 heures).

On peut aussi, dans un peu d'eau additionnée de bicarbonate de soude, donner toutes les 3 heures X gouttes de la solution suivante :

Sulfate de quinine.....	4 gr.
Acide citrique.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères.	10 gr.
Eau.....	20 gr.

Ou bien formuler :

Saccharolé de quinium.

(Une cuillerée à café 5 à 6 fois par jour.)

Comme antiseptique général on peut, ou bien :

Faire 2 fois par semaine une piqûre d'électrargol ou d'électroplatinol.

Ou : Injecter quotidiennement une seringue de Pravaz d'iodipine à 10 p. 0/0.

Ou : Faire des frictions avec une pommade au collargol.

Collargol.....	4 gr.
Lanoline.....)	ââ 20 gr.
Axonge fraîche.....)	

Contre le délire :

Compresses d'eau froide sur la tête, lavements de chloral, potion avec :

Valérianate de quinine	2 gr.
Eau distillée.....	80 gr.
Teinture d'anis.....	1 gr.
Sirop tartrique.....	q.s. p. 120 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0,25 cgr. de valérianate).

Contre l'adynamie :

Alcool, vin chaud, teinture de cannelle, acétate d'ammoniaque, liqueur d'Hoffmann, éther, caféine, huile camphrée.

Contre les accidents cardiaques :

Avoir recours aux injections de caféine ou de sérum caféiné. (Marfan).

Citrate de caféine.....	0,75
Chlorure de sodium.....	2 gr. 10.
Eau distillée.....	300 cmc.

(Injecter 5 à 10 cmc.).

Ou aux injections de spartéine et de strychnine.

Sulfate de spartéine.....	0 gr. 02
Sulfate de strychnine.....	0 gr. 001
Eau distillée.....	q. s.

(par ampoule de 1 cmc.)

Si nécessaire, avoir recours à la digitale :

Solution alcoolique de digitaline cristallisée au millième.....	XXV gouttes.
Eau distillée.....	60 gr.
Sirop de sucre.....	q. s. p. 120 cmc.

Deux à 3 cuillerées à soupe par jour.

Contre la congestion pulmonaire :

Ventouses sèches. Enveloppements froids du thorax.

Contre les péritonites par perforation :

Laparotomie d'urgence.

Contre les escarres :

Propreté minutieuse. Saupoudrer avec de l'ectogan (peroxyde de zinc et oxyde de zinc mélangés), ou laver avec du formol dilué et saupoudrer avec de la poudre de quinquina.

Contre le laryngo-typhus :

Pulvérisations toutes les 2 heures avec une solution de :

Protargol.....	1 gr.
Glycérine.....	5 gr.
Eau distillée.....	95 gr.

Contre les hémorragies intestinales :

Injections d'ergotine, ou donner la potion suivante :

Teinture d'ergot de seigle au 1/5.	2 à 6 gr.
Teinture de digitale au 1/10.....	1 à 2 gr.
Sirop diacode.....	50 gr.
Sirop de ratanhia	30 gr.
Eau distillée.....	q. s. p. 120 cc.

2 à 3 cuillerées à soupe par jour selon la nécessité.

Si l'hémorragie a été abondante, injections de sérum de Hayem ou d'eau de mer.

Fissure anale

Essayer pendant quelque temps des applications d'onguent populeum, ou des suppositoires à l'anusol ou des suppositoires adrénostyptiques. Laxatifs divers.

En cas d'échec, dilatation du sphincter anal sous chloroforme. Après la dilatation, introduire pendant quelques jours, la pommade suivante :

Orthoforme	1 gr.
Dermatol.....	2 gr.
Vaseline ..... Lanoline	ââ 20 gr.

Fistule anale

Incision au thermo-cautère. Pansements.

Foie

(*Kystes hydatiques du Foie*).

Intervention chirurgicale. Ablation si possible, sinon capitonnage ou marsupialisation de la poche.

Furoncle

Au début, pansements humides permanents ou application toutes les heures de compresses d'eau bouillie très chaude.

Pulvérisations antiseptiques avec un pulvérisateur à vapeur, type Championnière.

Dès l'acumination avec petit point blanc, anesthésier localement par un peu de glace pilée mise dans un linge fin. Appliquer sur le furoncle, puis faire des ponctions au galvanocautère dans la partie bourbillonneuse. Pansements humides avec une solution de nitrate d'argent à 1 p. 10.000.

Dès l'élimination du bourbillon, panser avec un petit carré d'emplâtre au peroxyde de zinc.

Donner de la staphylase ou de la levure de bière.

Gale

Bains de propreté, frictions au savon noir.

Faire ensuite une friction avec la pommade suivante :

Fleur de soufre.....	ââ 20 gr.
Huile de hêtre.....	
Savon vert.....	ââ 80 gr.
Axonge.....	
Craie pulvérisée.....	5 gr.

On peut aussi appliquer plusieurs nuits de suite, la pommade suivante :

Baume du Pérou.....	30 gr.
Axonge benzoïnée.....	100 gr.

Gangrènes cutanées

Panser avec du salol, de l'aristol, ou de l'emplâtre au peroxyde de zinc.

Gastralgie

Essayer :

l'eau chloroformée.

(1 à 4 cuillerées à entremets par jour) ;

les alcalins, principalement le bicarbonate de soude. (Faire sucer des pastilles de Vichy) ;

l'eau mentholée :

Eau mentholée saturée..... 90 gr.
Eau d'anis.....q.s. pour 120 cmc.

(Une cuillerée à café toutes les demi-heures).

En cas d'insuccès, donner des pastilles de cocaïne.

Gastro-entérites

Contre les vomissements :

Lavages de l'estomac.

Diète aqueuse.

Eau chloroformée (3 à 4 cuillerées à entremets par 24 heures).

Contre le dessèchement général :

Injection d'eau de mer ou de sérum de Hayem (20 à 50 cc. par jour).

Contre la diarrhée :

Lavages intestinaux avec de l'eau bouillie ou de l'eau naphtolée, ou une solution de nitrate d'argent à 1 p. 12.000.

Désinfection intestinale :

Par le calomel.

Par le benzonaphtol et le salicylate de bismuth.

Glossite exfoliatrice marginée

Bains de bouche avec une décoction de guimauve additionnée de biborate de soude.

Badigeonnages d'eau oxygénée dédoublée.

Médication arsénicale.

Goître exophtalmique

Médication antianémique.

Sérothérapie antibasedowienne, par le sang d'animaux éthyroïdés (une à 3 cuillerées à café par jour d'hemato-éthyroïdine).

Goître simple, kystique

Introduire une aiguille vaselinée dans la masse du goître, laisser s'écouler le liquide s'il y en a. Injecter une demi-seringue de :

Teinture d'iode au 1/10e.....	10 gr.
Alcool à 95°.....	5 gr.

Répéter ces injections interstitielles tous les mois ou tous les 2 mois (6 à 7 piqûres peuvent suffire).

Donner à l'intérieur de l'iodothyrine.

Grenouillette

Excision et cautérisation du reste de la poche avec le crayon de nitrate d'argent.

Grippe

Comme antipyrétiques et analgésiques, employer : l'antipyrine, le pyramidon, la salipyrine, la phénacétine, le citrophène, le salophène.

Comme toniques utiliser : le quinquina, la quinine ou ses sels, l'aristochine, l'euquinine, le quinoforme (formiate basique de quinine).

On peut formuler :

Caféine.....	0 gr. 10
Chlorhydrate de quinine.....	0 gr. 20
Salipyrine.....	0 gr. 30

Benzoate de soude.....	1 gr.
Eau distillée.....	20 gr.
Sirop de mûres.....	q. s. p. 80 eme.

(Par cuillerées à soupe dans les 24 heures).

Contre le coryza, mettre dans le nez un peu de la pommade suivante :

Fleur de soufre.....	0 gr. 20
Chlorétone.....	0 gr. 50
Vaseline.....	30 gr.

Contre les phénomènes pulmonaires :

Cataplasmes sinapisés.

Potion avec :

Terpine.....	ââ 1 gr.
Benzoate de soude.....	
Extrait de quinquina.....	0,50
Sirop de Tolu.....	ââ 40 gr.
Sirop de coquelicot.....	
Eau de tilleul.....	q. s. p. 120 eme.

Agiter (Une cuillerée à soupe toutes les deux heures).

Contre l'anorexie consécutive, une cuillerée à soupe avant chaque repas, de :

Teinture de badiane.....	ââ 1 gr.
— colombo.....	
— noix vomique.....	0,25 egr.
Sirop de gentiane.....	100 gr.
Sirop de cerise.....	q. s. p. 150 eme.

Hanche

Luxation congénitale de la hanche :

Traitement orthopédique par la méthode de Lorenz, consistant en :

1° Réduction par flexion et abduction de la cuisse. Immobiliser pendant 3 mois dans cette position par un appareil plâtré. Contrôler par la radiographie.

2° Après trois mois, mettre le membre en rotation interne et en adduction avec extension (sous chloroforme). Nouveau plâtre pour 3 mois.

3° Quelquefois une troisième intervention est nécessaire pour finir de corriger l'abduction. (Radiographie)

Opérer entre 4 et 5 ans.

Opérer alternativement, si les 2 côtés sont atteints.

Hémiplégie spasmodique

Médication iodurée.

Une injection par mois d'huile à l'amalgame d'argent à 16 p. 0/0 (1/2 seringue de Barthélemy).

Orthopédie, massages, mécanothérapie.

Hémoglobinurie

Eviter l'humidité, les refroidissements, les fatigues.

En cas de crise, repos au lit, et donner, pendant cinq jours, la potion suivante :

Solution officinale d'adrenaline au millième.....	XV gouttes
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop de cerises.....q.s. pour	150 cmc.

(Deux cuillerées à soupe par jour).

Dans l'intervalle des crises, administrer de la poudre de foie, du glycogène ou une médication phosphatée.

Hémophilie

Injections 2 fois par mois de sérum animal frais (Weill).

Donner chaque jour 3 paquets de :

Sulfate de soude ..... Craie préparée	ââ 0 gr. 50

Par paquet.

Hémoptysie

Si l'hémoptysie est grave, faire une injection d'une demi-seringue à une seringue (selon l'âge) d'ergotine. Une demi-heure après, une piqûre de morphine. (D. S. A.)

Si l'hémoptysie est peu abondante, donner la potion suivante :

Ergotine	1 gr.
Sirop de ratanhia, Sirop de mûres	ââ 20 gr.
Eau de menthe	q.s. pour 90 cmc.

Une cuillerée à soupe toutes les heures jusqu'à cessation de l'hémoptysie.

Si l'hémoptysie est consécutive à la toux, donner d'heure en heure, une cuillerée à soupe de :

Sirop de morphine, Sirop de codéine, Sirop d'éther	ââ 40 gr.
Eau de tilleul	q.s. pour 160 cmc.

Si l'hémoptysie est à répétition, faire des injections de sérum gélatiné (20 cmc tous les deux jours).

Gélatine	0 gr. 70
Nael	1 gr.
Eau	100 gr.

(Stériliser et répartir en flacons stériles de 20 cmc.)

Dans les formes légères, donner, tous les jours, une à deux des pilules suivantes :

Ergotine.....	ââ 0 gr. 05
Sulfate de quinine.....	
Poudre de feuilles de Digitale...	0 gr. 02

Par pilule.

Dans tous les cas, régime lacté, boissons glacées, ligatures à la racine des membres, et immobilité absolue.

Hémorragies

Traitement local, si possible.

Donner :

Ergotine.....	0.05 à 0 g. 50
Sirop de ratanhia.....	ââ 10 gr.
Sirop thébaïque.....	
Eau de tilleul.....	q. s. p. 40 cmc.

Une cuillerée à café tous les quarts d'heure.

Ou :

Chlorure de calcium	0.10 à 3 gr.
Sirop de morphine.....	10 gr.
Eau de tilleul	q. s. p. 60 cmc.

Par cuillerées à soupe toutes les heures.

Ou :

Solution d'adrénaline au millième	X gouttes.
Eau distillée	100 gr.

Une cuillerée à café d'heure en heure.

Hernies

Ne pas opérer les hernies ombilicales qui guérissent d'ordinaire seules par le bandage.

Opérer vers 7 ou 8 ans s'il n'y a pas guérison.

Hernie inguinale :

Peut guérir par le port d'un bandage bien appliqué, mais souvent il n'y a que des guérisons factices.

Si, vers 5 à 6 ans, la guérison n'est pas obtenue, faire la cure radicale.

S'il y a en même temps ectopie testiculaire, faire la cure radicale précoce et ne pas mettre de bandage, ou faire très attention de ne pas prendre le testicule sous le bandage.

Si on est assuré de pouvoir faire opérer rapidement en cas d'étranglement, laisser la hernie se développer et le testicule migrer. Opérer vers 6 ou 7 ans.

Herpès

Poudrer avec :

Poudre d'oxyde de zinc.....
— d'amidon..... } aà 20 gr.

Ou mettre une pommade avec :

Oxyde de zinc.....	1 gr.
Vaseline.....	ââ 15 gr.
Lanoline	

Hydrocèle et Hydrocèle enkystée du cordon

Ponction avec une aiguille fine, suivie ou non d'injection avec :

Teinture d'iode au 1/10.....	ââ 20 gr.
Alcool à 95°.....	

Hydrocéphalie

Ponctions capillaires du ventricule.

Frictions mercurielles alternant avec des frictions au collargol.

Hyperhydrose

Contre l'Hyperhydrose généralisée :

Donner trois fois par jour dix gouttes de :

Teinture de sauge officinale.

Contre l'Hyperhydrose fétide des pieds :

Bain de pieds matin et soir.

Le soir, laver avec de l'eau additionnée de formol.

Dans la journée, saupoudrer de poudre de quinquina.

Hypertrophie du cœur

N'existe souvent que comme pseudo-hypertrophie cardiaque de croissance. Pas d'exercices violents. Développer le thorax par une gymnastique rationnelle, active et passive. Surveiller, avec beaucoup de soins, les fonctions digestives. Abstention de boissons excitantes (thé, café). Hydrothérapie. Frictions sèches. Contre l'éréthisme cardiaque, avoir recours aux bromures ou aux diverses préparations de valériane :

Bromure de sodium.....	ââ 4 gr.
Teinture de racines de valériane	
Sirop d'adonis vernalis.....	20 gr.
Sirop d'éther.....	40 gr.
Eau de menthe.....q.s. pour	90 cmc.

(Deux à trois cuillerées à soupe par jour).

Hystérie

Hydrothérapie. — Bromuration. — Education sévère.

Ictère

Boissons abondantes. Lait écrémé. Eau de Vichy, d'Evian. Tisanes diurétiques.

Lavements froids.

Bains tièdes prolongés.

A l'intérieur : Calomel.

Ichthyose

Bains chauds.

Savonnages avec du savon au goudron.

Onctions avec :

Acide tartrique.....	1 gr.
Glycérolé d'amidon à la glycérine neutre.....	40 gr.

Idiotie

Education, et tenter la médication thyroïdienne.

Extrait pulvérisé de thyroïde ... 0 gr. 10

Par cachet (1 à 2 par jour).

Ou :

Iodothyrine en comprimés..... de 0 gr. 10

1/2 à 2 comprimés par jour.

Impetigo

Traitement général par l'arsenic et l'huile de foie de morue.

Faire tomber les croûtes par des pansements humides boriqués.

Laver ensuite avec du coton hydrophile imbibé d'eau d'Alibour étendue au 1/3 :

Eau distillée camphrée saturée et filtrée	600 gr.
Sulfate de zinc	7 gr.
— cuivre	2 gr.

Appliquer ensuite la pommade suivante :

Huile de cade	5 gr.
Bioxyde jaune d'hydrargyre	0 gr. 25
Vaseline	20 gr.

Dans l'impetigo aigu très virulent et varioliforme, appliquer pendant 24 ou 48 heures un pansement humide avec une solution de nitrate d'argent à 1 pour 300. Ensuite, onctions au glycérolé d'amidon.

Contre la labialite impetigineuse, insuffler de la poudre d'iodoforme.

Incontinence d'urine

Circoncision, s'il y a phimosis.

Electrisation du sphincter. Hydrothérapie.

Réduction des liquides de boisson. Traitement moral et psychique.

Comme médicament, employer la belladone :

Extrait de belladone — noix vomique	ââ 0 gr. 02
Tartrate ferrico-potassique	0 gr. 05

(Par pilule) 1 à 2 par jour.

Ou bien le soir, une pilule de :

Extrait alcoolique de rhus aromatica.....	0 gr. 05
Extrait de belladone.....	0 gr. 005
Camphre.....	0 gr. 10

Par pilule.

Indigestion

Donner de l'eau bouillie.

Immédiatement, vomitif ou lavage de l'estomac.

Le lendemain, purgatif suivi d'antisepsie intestinale.

Insolation

Poudrer avec de la poudre d'amidon.

Lavement purgatif.

Sinapismes aux jambes.

Dans les formes graves, application permanente de compresses d'eau froide.

Parfois, l'administration de la caféine et les émissions sanguines sont nécessaires.

Insomnie

Dans les cas légers, donner un bain de tilleul tous les soirs. Eviter les excitations dans la journée.

Essayer, si nécessaire, les bromures, l'antipyrine, le chloral, le trional, le bromidia.

Invagination Intestinale

Opérer sans retard.

Laryngites simples

Applications chaudes au devant du larynx.

Potion avec :

Benzoate de soude.....	1 gr.
Teinture d'aconit.....	XXX gouttes.
Rhum.....	5 gr.
Sirop de codéine.....	30 gr.
— Tolu.....	q. s. p. 90 cmc.

(D. S. A.)

Pulvérisations dans la gorge.

Instiller dans le nez un peu de cocaïne

Eucalyptol.....	0 gr. 20
Chlorhydrate de cocaïne.....	0 gr. 10
Huile goménolée à 1/20.....	20 gr.

Laryngite striduleuse (Faux croup).

Pendant la crise, applications d'eau très chaude au devant du larynx.

Donner de suite la potion suivante :

Antipyrine..... Bromure de potassium.....	ââ 1 gr.
Sirop de Belladone.....	20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	40 gr.
Eau de tilleul.....	q.s. p. 90 cmc.

(Une cuillerée à soupe tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, jusqu'à diminution ou cessation de l'accès.)

Toute médication demeure inutile dès que le sommeil survient.

Si nécessaire, donner un lavement de chloral.

Si on n'a rien d'autre sous la main, faire une piqûre de morphine (1/2 cmc.).

En cas de dyspnée trop prolongée, pratiquer le tubage.

S'il y a œdème glottique accentué, rendant impossible le tubage, faire la trachéotomie.

Le lendemain, instituer le traitement de la laryngite simple.

Faire enlever ultérieurement les végétations adénoïdes.

Lentigo

Application de pommades soufrées.

Leucémie

Médication arsenicale et ferrugineuse.

Opothérapie par la moelle osseuse (de 1 à 5 gr. d'extrait de moelle osseuse en 2 ou 4 fois par jour).

Lombricoïdes (Ascaris)

Purger à l'huile de ricin. Diète lactée.

Donner ensuite le sirop vermifuge purgatif composé suivant :

Extrait fluide de semen contra...	2 gr.
Sirop de Séné	10 gr.
Sirop de mousse de Corse	20 gr.
Sirop de Rhubarbe.....	20 gr.
Teinture de Cannelle.....	5 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères.	q. s. p. 90 cmc.

(2 à 3 cuillerées à soupe le matin pendant 3 jours).

Lupus

On a le choix entre :

1° des applications de radium.

2° l'extirpation si possible.

3° les cautérisations ignées par le galvano-cautère.

4° le curetage avec la curette dermatologique suivi de pansements demi-secs avec une solution de nitrate d'argent à 1 p. 10.000.

5° les scarifications et cautérisations avec le chlorure de zinc au 1/10e, suivies de pansements à l'emplâtre rouge.

Mal de Pott

Décubitus dorsal avec immobilité sur un lit plat pendant 1 mois et ensuite :

Immobilisation dans un corset plâtré.

Traitement général : Extrait glycériné de foies frais de morue. Arsenic.

Ponction des abcès, suivie d'injection iodoformée.

Maladie d'Addison

Ferrugineux. Huile de foie de morue. Ovo-lécithine. Extrait de Surrénales.

Maladie de Barlow

Lait cru. Jus de citron. Jus de viande. Pommes de terre. Paquets avec :

Citrate de soude .....
Citrate de magnésie..... ..} ââ 1 gr.

(4 de ces paquets par jour).

Maladie de Friedreich

Douches. Gymnastique suédoise. Electrisation. Cures thermales aux eaux sulfureuses ou aux bains de boues.

Maladie de Hirschprung

Eviter la constipation. Massages de l'abdomen. Lavages de l'intestin à la sonde. Electrothérapie.

Maladie de Riga

Cautérisation au nitrate d'argent. Dans quelques cas, extirpation des bourgeons charnus suivie de cautérisation, ou cautérisation d'emblée au galvanocautère. Antisepsie buccale.

Mastoïdites

Intervenir d'urgence, s'il y a abcès rétro-auriculaire, ou s'il y a simplement œdème rouge et douloureux rétro-auriculaire.

Faire alors l'incision et la trépanation simple de la mastoïde.

Pansements minutieux, avec souvent curetages secondaires des bourgeons charnus.

Dans l'otorrhée avec mastoïdite chronique, faire le curetage de la caisse et l'évidement pétro-mastoïdier.

Melœna

Frictions chaudes, ou alcooliques.

Donner :

Ergotine.....	0 gr. 50
Sirop de mûres.....	ââ 20 gr.
Sirop de ratanhia.....	
Eau de tilleul.....q.s. pour	90 cmc.

Une cuillerée à soupe toutes les heures ou toutes les deux heures.

Méninges

Hémorragie méningée. Ponctions lombaires répétées.

Méningite cérébro-spinale épidémique

Faire une ponction lombaire et retirer de 25 à 30 cmc. de liquide.

Injecter alors 20 cmc. de sérum antiméningococcique.

En règle générale, n'injecter qu'une quantité de sérum antiméningococcique égale à la quantité du liquide céphalo-rachidien retirée.

Doses à moins de 2 ans.....	10 à 15 cmc.
— au-dessus de 2 ans.....	15 à 20 cmc.

Laisser l'enfant allongé, la tête basse, pendant 5 à 6 heures, et, si nécessaire, faire une piqûre de morphine.

Renouveler les injections pendant 3 à 4 jours consécutifs.

Comme adjuvants : Injections sous-cutanées d'iodipine, d'huile iodée, d'électrargol. Frictions au collargol. A l'intérieur, sirop phéniqué.

Calmants : Bromure, chloral, éther, valériane. Bains chauds.

Régime lacté ou bouillons.

Méningite tuberculeuse

Thérapeutique générale de la tuberculose.

Calmer les douleurs céphalalgiques par l'application d'une vessie de glace sur la tête, ou tout au moins de compresses très froides.

Frictions au niveau des mastoïdes avec la pommade suivante :

Iodure de potassium.....	1 gr.
Axonge benzoïnée.....	20 gr.

Faire une ponction lombaire et la répéter aussi souvent qu'il sera nécessaire, si elle soulage momentanément l'enfant ou si on retire beaucoup de liquide sous pression.

Frictions mercurielles quotidiennes, soit à l'onguent napolitain, soit à l'onguent à l'amalgame d'argent. Si les enfants ont plus de 3 ans, injecter tous les 3 jours une demi-seringue de Barthélemy d'huile à l'amalgame d'argent à 16 p. 100.

Météorisme

Donner du benzonaphtol, du salol, de la poudre de charbon de peuplier.

Massages abdominaux. Faire porter une ceinture de flanelle sur le ventre.

Bien surveiller si les évacuations se font normalement.

Migraine

Faire examiner les yeux. Rechercher la syphilis. Soigner les digestions et la constipation. Ablation des adénoïdes. Cures d'air. Isolement.

Donner au début de l'accès :

Antipyrine.....	0 gr. 25
Valérianate de quinine.....	0 gr. 10
Caféine.....	0 gr. 05
Benzoate de soude.....	0 gr. 10

Pour un paquet, à donner dans une limonade citrique.

Ou encore :

Pyramidon.....	0 gr. 30
Bromure de sodium.....	1 gr.

Eau distillée..... 10 gr.
Sirop de citron ..... q. s. p. 45 cmc.

Une cuillerée à soupe toutes les 5 minutes avec un peu d'eau de Vichy glacée.

Essayer la phénacétine.

Muguet

Irrigations fréquentes de la bouche avec de l'eau de Vichy ou de l'eau bicarbonatée.

Attouchements fréquents avec un collutoire alcalin :

Borate de soude.....
Bicarbonate de soude..... } ââ 5 gr.
Glycérine .....
Eau ..... } ââ 20 gr.

Ou, si la maladie est intense :

Teinture d'iode au 1/10e ..... 5 gr.
Glycérine..... 20 gr.

Faire de l'antiseptie intestinale :

Betol.....
Bicarbonate de soude..... } ââ 1 gr.
Eau..... 40 gr.
Sirop de gomme..... q. s. p. 80 cmc.

Myelite

Révulsion le long de la colonne vertébrale avec de l'onguent napolitain, des pointes de feu, du chlorure d'éthyle, de la glace.

Frictions avec l'onguent au collargol, ou avec la pommade à l'amalgame d'argent.

Calmer les douleurs par le chloral, l'antipyrine, le bromidia.

Myocardites

Elles sont justiciables surtout des stimulants diffusibles et des médicaments tonicardiaques. On peut recommander la potion de Todd, le sirop d'éther, la liqueur d'Hoffmann.

Les injections sous-cutanées sont indiquées et on emploiera :

Caféine.....	1 gr.
Benzoate de soude.....	1 gr. 20
Eau stérilisée.....q.s. pour	10 cmc.

(A diviser en 10 ampoules).

Ou :

Sulfate de strychnine.....	0 gr. 01
Eau de laurier cerise...q s. pour	10 cmc.

(A diviser en 10 ampoules).

Ou :

Camphre.....	1 gr.
Huile d'olives .....q.s. pour	20 cmc.

(A diviser en 20 ampoules).

Ou :

Sulfate de spartéine.....	0 gr. 10
Eau stérilisée.....q s. pour	10 cmc.

(A diviser en 10 ampoules).

L'adrenaline donne parfois de bons résultats.

Solution officinale d'adrenaline au millième.....	XX gouttes
Eau distillée	20 gr.
Sirop simple.....q s. pour	60 cmc.

(2 à 3 cuillerées à café par jour).

Myxœdème

Régime reconstituant, phosphates, huile de foie de morue, médication iodée et sirop iodotannique.

Médication thyroïdienne :

Extrait pulvérisé de corps thyroïde. 0 gr. 10

Par cachet (1 à 3 par jour).

Ou :

Iodothyrine en tablettes de 0,10 centigr.

1/2 à 3 tablettes par jour.

Ou :

Thyroïdine (extrait sec thyroïdien) en tablettes de 0 gr. 10.

1 à 3 par jour.

Surveiller la médication et la continuer longtemps par intermittences.

Nœvus

Extirpation si possible.

Sinon, traitement par l'électrolyse ou par les applications de radium.

Nephrites

Nephrites aiguës :

Ventouses sèches sur la région lombaire et quelquefois, ventouses scarifiées.

Régime lacté absolu (lait pur ou écrémé), et, s'il est pris en trop faible quantité, donner de l'eau d'Evian ou du bouillon de légumes, ou de la tisane de queues de cerises.

Donner deux lavements quotidiens froids et sans pression. Frictions sèches sur le corps.

Donner la théobromine, s'il y a oligurie :

Théobromine.....	0 gr. 20

Par cachet (de 1 à 3 par jour).

Ou de la théobromose (Théobrominate de Lithium) 0 gr. 25 par jour en potion.

Si le pouls est faible, administrer la caféine.

Si la théobromine n'agit pas, donner :

Nitrate de potasse.....	0,25 egr.
Acétate de potasse.....	0,50 egr.
Teinture de Scille.....	0,30 cgr.
Sirop des cinq racines	40 gr.
Infusion de chiendent.....	q. s. p. 120 cmc.

(D. S. A.)

Et donner à boire de l'eau lactosée (100 gr. par litre).

On peut aussi avoir recours à la potion suivante :

Extrait fluide d'aubépine.....	1 gr.
Extrait fluide de maté.....	2 gr.
Extrait aqueux de fleurs de muguet.....	2 gr.
Sirop des 5 racines.....	40 gr.
Infusion de chiendent.....	q. s. p. 120 cmc.

Deux à trois cuillerées à soupe par jour.

Nephrites chroniques :

Régime lacto-végétarien. Déchloruration. Viandes blanches bouillies et rôties en quantité modérée.

Régime lacté absolu intermittent : soit 1 jour par semaine ou 3 jours tous les 15 jours ou une semaine par mois.

Donner 3 fois par jour dix à quinze gouttes de :

Teinture de viscum album	30 gr.

Alterner avec :

Extrait de rein de porc	2 gr.

Par paquet (à donner avec du miel).

Ou encore :

Lactate de Strontium.....	1 gr.
Extrait de Stigmates de maïs....	0,25 cgr.
Décoction d'uva-ursi	100 gr.
Sirop iodotannique.....	q.s. p. 120 cmc.

S'il y a insuffisance rénale ou cardiaque, arriver à la digitale, à la théobromine, au strophantus, à la spartéïne.

Eviter la constipation, et, de temps en temps administrer un purgatif salin.

Névralgies

Révulsifs variés : cataplasmes sinapisés, chlorure d'éthyle, compresses chloroformées ou le liniment suivant :

Chloroforme	10 gr.
Laudanum	XX gouttes.
Baume Tranquille	40 gr.

S'il s'agit de névralgies rhumatismales, employer un liniment avec :

Ulmarène	2 gr.
Essence de verveine	V gouttes
Vaseline, Lanoline	ââ 20 gr.

A l'intérieur : antipyrine, phénacétine, salicylate de soude, aspirine, quinine, aconit, préparations opiacées.

Si nécessaire : massage, électricité.

Noma

Soutenir l'état général. Cautérisations locales. Lavages de la bouche avec une solution de permanganate à 1 pour 2000. Attouchements à l'eau oxygénée.

Obésité

Exercice, gymnastique, massage. Réglementation sévère de l'alimentation.

Médication iodée.

Donner :

Iodothyrine en tablettes de 0,10 cgr.

1/2 à 2 tablettes par jour pendant 15 jours et laisser 15 jours au repos.

Occlusion intestinale

Opérer rapidement par la laparotomie.

Si l'opération est trop tardive, se contenter d'un anus contre nature.

Œdème glottique

Applications de compresses très chaudes au-devant du larynx. Tubage ou trachéotomie en cas de nécessité.

Œsophage

Corps étrangers. — Extraction directe, si le corps étranger est visible ou peut être senti.

Dans les cas ordinaires, extraction par le panier de de Græfe ou le crochet de Kirmisson.

Si possible, extirpation par œsophagoscopie.

Si nécessaire, faire une trachéotomie, et souvent on sera obligé d'avoir recours au chloroforme.

Brûlures.

Traitement d'urgence variable selon l'agent caustique.

Pratiquer la dilatation le plus rapidement possible (8 à 10 jours après) avec des sondes œsophagiennes en gomme.

Prolonger la dilatation *progressive* plus ou moins longtemps, s'il y a rétrécissement ou tendance au rétrécissement.

Ombilic

(*Granulome de l'...*)

Saupoudrer d'un peu de stovaïne, grattage à la curette dermatologique et panser avec de la poudre d'aristol.

Onanisme

Surveillance sévère et psychothérapie.

Ongle incarné

Couper l'ongle en carré. Port de chaussures bien faites.

Introduire entre le bourrelet de chair et l'ongle de la poudre de quinquina.

S'il y a des ulcérations, opérer sous anesthésie au bromure ou chlorure d'éthyle et donner la préférence au procédé de Baudens-Anger.

Oreilles

Corps étrangers de l'oreille :

Extraction directe par une pince si cela paraît possible, puis faire des injections abondantes d'eau tiède.

Si on ne réussit pas, essayer d'une anse en fil d'argent passée derrière le corps étranger.

En cas de nécessité, incision derrière le pavillon de l'oreille et décollement du conduit.

Oreillons

Régime lacté ou lacto-végétarien pendant plusieurs jours.

Isolement de l'enfant.

Onctions avec la pommade suivante :

Iodure de potassium.....	2 gr.
Teinture de belladone.....	2 gr.
Vaseline..... / Axonge benzoïnée..... \	ââ 15 gr.

Recouvrir de ouate.

Gargarismes fréquents et lavages de la bouche avec de l'eau bouillie où on mettra par verre une vingtaine de gouttes, soit de phénosalyl, soit de glycothymoline.

S'il y a fièvre, donner de l'antipyrine, de la quinine ou de l'aspirine.

Au moment de la convalescence : sirop d'iodure de fer.

Orgelet

Application de compresses boriquées.

En cas d'acumination, ouverture avec la pointe fine d'un galvano-cautère.

Instiller dans l'œil le collyre suivant :

Argyrol	0 gr. 50
Eau distillée	40 gr.

Appliquer sur les paupières la pommade suivante :

Précipité jaune	0 gr. 20
Vaseline	10 gr.

Ostéomyélite

Ostéomyélite aiguë.

Incision et trépanation de l'os, dès le diagnostic établi.

Pansements humides avec une solution de nitrate d'argent à 1 p. 10.000.

Ostéomyélite chronique.

Faire des pansements demi-secs au nitrate d'argent dès que la suppuration aiguë a diminué, puis, en temps opportun, ablation des séquestres.

Ostéo-sarcomes

Essayer de l'atoxyl à l'intérieur.

Poudre d'atoxyl.....	0, 10 centigr.
Sucre de lait.....	1 gr.

Pour 10 paquets (un par jour pendant 10 jours).

Otites

Introduire 3 fois par jour dans le conduit auditif, de 5 à 10 gouttes de la solution suivante tiède :

Acide phénique.....	1 gr.
Glycérine.....	30 gr.

Vaporiser fréquemment dans chaque narine avec un pulvérisateur à vaseline, la solution suivante :

Chlorétone.....	0 gr. 50
Eucalyptol.....	0 gr. 25
Résorcine.....	1 gr.
Huile d'olive.....	30 gr.

Paracentèse du tympan, si nécessaire.

Otorrhée chronique.

Deux à trois fois par jour, pansement à la glycérine phéniquée.

Ablation des végétations adénoïdes, s'il y en a.

Avant le pansement, lavage du conduit à l'eau bouillie tiède avec une poire de caoutchouc.

Au bout de quelque temps, remplacer la glycérine phéniquée par la solution suivante :

Alcool à 70°.....	20 gr.
Acide borique.....	4 gr.

S'il y a des granulations, les cureter et panser quelques jours avec une solution de nitrate d'argent à 1/10000.

S'il y a des fongosités ou des granulations très développées, faire l'évidement petromastoïdien.

Ovarites

Contre la congestion ovarienne de la formation, cataplasmes chauds, lavements à l'antipyrine. Donner X à XX gouttes de la mixture :

Teinture de viburnum prunifolium	} ââ 20 gr.
Teinture de piscidia erythrina .	}

Ou encore :

Extrait fluide de seneçon	4 gr.
Elixir de Garus.....	q. s p. 120 cmc.

2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

Ou encore :

Extrait fluide d'anémone pulsatile.....	ââ 1 à 2 gr.
Extrait fluide de valériane	
Alcool.....	ââ 10 gr.
Glycérine	
Sirop d'écorces d'oranges amères.	q.s p. 120 cmc.

2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

Oxyures

Purgatif au calomel.

Le lendemain, lavement d'eau bouillie simple, suivi d'un second lavement avec une solution de nitrate d'argent à 1 pour 6000. Neutraliser au bout d'une 1/2 heure le nitrate par une irrigation à l'eau légèrement salée ; renouveler au besoin 2 à 3 jours de suite (d'ordinaire une seule fois suffit).

Administrer, si nécessaire, la santonine :

Santonine.....	0 gr. 01
Sucre blanc.....	0 gr. 50

Par cachet (3 le matin à une heure d'intervalle, pendant 3 jours).

Paludisme

Administrer les sels de quinine, et, dans les formes chroniques, donner de l'arsenic.

Pancréatites

Laparotomie en cas de suppuration.

Pansements

On emploie 3 sortes de pansements, les pansements humides, les pansements demi-secs, les pansements secs.

Pansements humides. — Nous conseillons de les faire avec la solution suivante :

Nitrate d'argent.....	0 gr. 10
Eau distillée.....	1 litre.

qui présente les avantages suivants :

1° D'être très fortement antiseptique et par conséquent de pouvoir faire les pansements sans gran-

des précautions. 2° De ne pas tacher les doigts à cette dose. 3° De pouvoir continuer longtemps les pansements humides sans qu'il y ait macération de la peau, irritation ou formation de petites vésico-pustules. 4° D'être exempte de toxicité. Le seul inconvénient est la coloration indélébile qu'elle donne au linge, mais cela est très facile à éviter.

Parmi les autres solutions antiseptiques utilisables, citons :

Le sublimé à 1 pour 2000.

L'oxycyanure d'hydrargyre à 1 pour 2000.

Le biiodure de mercure à 1 pour 2000.

L'acide borique à 30 pour 1000.

Le chloral à 5 pour 1000.

Le thymol à 1 pour 2000.

Le perborate de soude à 10 pour 1000.

L'eau oxygénée diluée dans 6 fois son poids d'eau.

Pansements demi-secs. — Se font avec des compresses de gaze hydrophile trempées dans une solution de nitrate d'argent à un pour dix mille. On ne met pas de taffetas chiffon, mais on recouvre directement de coton hydrophile, puis de coton ordinaire.

Pansements secs. — Se font soit avec de la gaze stérilisée, soit de la gaze au salol, à l'iodoforme, à l'ectogan, avec du lint boriqué.

Retenir que les pansements phéniqués sont dangereux chez les enfants.

Paralysie atrophique

Hydrothérapie, massages. Stimulants avec la noix vomique ou la strychnine.

Paralysie faciale

Surveiller l'état de l'oreille.
Electrisation du nerf.
En cas de spécificité, donner du mercure.

Paralysie infantile

Pendant la période fébrile, révulsion le long de la colonne vertébrale.

Injections sous-cutanées ou d'électrargol ou d'électroplatinol (5 cc.) ou d'huile iodée (1 cc.).

Donner la potion suivante :

Bromhydrate de quinine..... 1 gr.
Sirop de racines d'aconit..... 40 gr.
Eau de tilleul..... q. s. p 120 cmc.

(D. S. A.)

A la période paralytique : Electrisation, massage, frictions sèches ou alcooliques. Injecter :

Sulfate de strychnine..... 0 gr. 01
Eau..... 10 cc.

(Un centimètre cube par jour pendant 10 jours, puis repos de 20 jours).

Ou, donner la potion :

Teinture de noix vomique..... 2 gr.
Rhum..... } ââ 20 gr.
Glycérine..... }
Elixir de Garus..... q s. p. 120 cc.

(D. S. A.)

Contre les déformations, intervention chirurgicale.

Paralysie pseudo-hypertrophique

Electrisation, douches, bains salés, massages.

Donner de l'huile de foie de morue, de l'arsenic ou deux cachets de :

Extrait thymique de veau (à 20 gr. d'organe).

Pelade

Soigner les dents. Hydrothérapie.

Badigeonnages de teinture d'iode tous les 2 jours.

Lotions excitantes dans l'intervalle avec :

Acide acétique cristallisé.....	
Teinture d'iode.....	ââ 5 gr.
Teinture de cantharides.....	
Alcoolat de Fioravenli.....	
Chloroforme.....	15 gr.

Ou :

Ammoniaque.....	5 gr.
Alcool camphré.....	ââ 100 gr.
Alcoolat de Fioraventi.....	

Pemphigus

Lotions à l'eau boriquée.

Saupoudrer avec :

Talc.....	
Oxyde de zinc.....	ââ 10 gr.
Aristol.....	1 gr.

(Mêler finement).

Frictions mercurielles, soit avec l'onguent napolitain, soit avec l'onguent à l'amalgame d'argent, ou donner à l'intérieur du sublimé.

Péricardites

Se manifestent la plupart du temps sous forme de symphyses : Eviter toute fatigue, tous troubles digestifs. Alimentation substantielle et légère. De temps en temps, décongestionner le foie par des ventouses scarifiées. Ponctionner les épanchements des séreuses, s'il s'en produit.

Eviter la constipation, et, de temps en temps, administration de purgatifs drastiques.

Favoriser la diurèse :

Nitrate de potasse.....	ââ 2 gr.
Acétate de potasse.....	
Eau distillée.....	60 gr.
Sirop de cerises, q. s. pour.....	100 cmc.

(D.S.A.)

Ou administrer le théobromine.

Soutenir le cœur par la caféine, la strychnine, l'huile camphrée, la spartéine (v. myocardites) ou avoir recours aux préparations suivantes :

Extrait aqueux de muguet.....	1 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères	90 cmc.

(D.S.A.) en moyenne 2 cuillerées à soupe par jour.

Ou :

Teinture de strophantus.....	1 gr.
Glycérine.....	10 gr.
Sirop d'aubépine.....	40 gr.
Eau de fleurs d'oranger, q. s. p^r	120 cmc.

(D.S.A.) En moyenne, 2 cuillerées à soupe par jour.

Ou :

Poudre de scille.....
— digitale..... } ââ 0 gr. 05
— scammonée .....

Par pilule.

Une par jour pendant 4 jours.

Dans les péricardites avec épanchement suppuré ou non : ponction et, si nécessaire, paricardotomie.

Péritonite aiguë

Repos absolu au lit. Application de vessie de glace sur le ventre en saupoudrant fortement de poudre de talc et interposant de la flanelle.

Régime de l'eau ou du bouillon de légumes.

A l'intérieur :

Sirop thébaïque..... 40 gr.

(D. S. A.)

S'il y a épanchement purulent, pratiquer la laparotomie, suivie de lavage du péritoine à l'eau salée physiologique tiède ; drainage.

Péritonite par perforation. — Laparotomie immédiate. Suture de la perforation. Lavage et drainage du péritoine.

Péritonite tuberculeuse

Dans les formes ascitiques, laparotomie simple. S'il y a des phénomènes d'occlusion : intervention.

Dans les autres formes : Huile de foie de morue ou extrait concentré de foies frais de morue.

Sirop d'hypophosphite de soude.

2 cuillerées à café par jour.

Pendant 8 jours, injections sous-cutanées de 1 cmc de :

Gaïacol	ââ 1 gr.
Camphre	
Huile d'olive stérilisée	10 cmc.

et les 8 jours suivants, deux centim. cubes de :

Iodipine au 1/10.

Repos de 15 jours et recommencer.

Onctions sur l'abdomen avec :

Iodure de sodium	2 gr.
Extrait de belladone	1 gr.
Extrait de ciguë	1 gr.
Axonge Benzoïnée	30 gr.

Plus tard, bains salés et potions reconstituantes.

Arséniate de soude	0 gr. 05
Sirop de quinquina	200 cmc.

(Une cuillerée à café matin et soir).

Ou :

Arséniate de soude.....	0 gr. 05
Sirop de noyer.....	150 eme.

Perlèche

Badigeonnages de teinture d'iode ou cautérisations avec une solution de nitrate d'argent au 1/20e.

Quelquefois, recouvrir de stérésol.

Pharyngite. — P. granuleuse

Pulvérisations et inhalations avec de l'eau sulfureuse ou alcaline.

Gargarismes avec :

Benzoate de soude..... / Borate de soude	ââ 5 gr.
Infusion de feuilles de ronces...	250 gr.

Attouchements avec :

Teinture d'iode.....	2 gr.
Glycérine.....	20 gr.

Ou :

Tanin.....	2 gr.
Glycérine.....	20 gr.

Si nécessaire, attouchements avec une solution de nitrate d'argent au 1/50e ou avec le crayon. Dans les formes très graves, cautériser les granulations au galvanocautère après une pulvérisation de stovaïne.

Phimosis

Pratiquer la circoncision. V. Balanite et Circoncision.

Phlébite des Sinus

Faire la trépanation, si possible et le plus rapidement possible.

Phtiriase

Couper les cheveux.

Lavages avec du savon au bois de Panama.

Appliquer pendant une nuit de l'onguent napolitain, puis, après un lavage le lendemain, faire une onction avec :

Glycérolé d'amidon.....	50 gr.
Huile de cade.....	5 gr.
Extrait fluide de panama.....	5 gr.

Pied-bot

Redressement manuel et massage commencés de très bonne heure, répétés plusieurs fois par jour.

Si nécessaire, tenotomie du tendon d'Achille, et application d'appareils orthopédiques.

Dans les grandes déformations, opération de Phelps ou Tarsectomie cunéiforme.

Piqûres d'insectes

Moustiques. — Lotions à l'eau de Cologne ou au vinaigre de toilette, ou avec une solution d'eau formolée.

Guêpes. — Fomentations avec de l'eau où on mettra quelques gouttes d'ammoniaque. Maintenir un pansement humide, soit avec une solution très faible d'ammoniaque au 1/100e, soit avec une solution au 1/10e de chlorhydrate d'ammoniaque.

Au bout de quelque temps, recouvrir d'un morceau d'emplâtre à l'ectogan.

Rouget. Après un bon savonnage, faire une onction d'onguent mercuriel belladoné qu'on laissera enveloppé toute la nuit.

Pityriasis simplex

Lotion quotidienne avec :

Teinture d'iode fraîche.....	5 gr.
Alcoolat de lavande.....	20 gr.
Alcool à 60°.....	275 gr.

Si la peau est très sensible, lotions avec :

Sulfure de potasse.....	1 gr.
Teinture de benjoin.....	2 gr.
Eau distillée.....	300 gr.

Dans les formes squameuses, pommade avec :

Huile de cade.....	
Lainine.....	ââ 10 gr.
Vaseline.....	
Soufre précipité	
Cinabre.....	ââ 1 gr.
Résorcine.....	

Pityriasis versicolor

Badigeonnages répétés de teinture d'iode sur les plaques.

Bains sulfureux.

Si les placards sont très étendus, appliquer pendant une nuit de l'onguent napolitain en frictionnant légèrement.

Pleurésie

Pleurésie séro-fibrineuse. — Régime lacté. Eau de Vittel, d'Evian ou de Contrexéville.

Cataplasmes sinapisés. Ventouses sèches. Vésicatoires volants. Pointes de feu.

Donner :

Acétate de potasse.....	2 gr.
Infusion de chiendent.....	500 gr.

Thoracentèse, si l'épanchement augmente ou ne diminue pas.

Multiplier les thoracentèses, si nécessaire.

Ensuite, instituer le traitement général par le gaïacol, l'arsenic, l'huile de foie de morue ou les extraits de foie de morue.

Pleurésie purulente. — Dès le diagnostic formellement établi, faire la thoracotomie avec résection d'une côte suivie de drainage. Ne pas perdre son temps à ponctionner.

Pneumothorax

Ventouses sèches.

Injections de caféine et d'éther.

Ponction.

Pneumonie

Boissons abondantes : Lait, bouillon, bouillon de légumes, de poulet, de jarret de veau.

Cataplasmes simples ou sinapisés, ventouses sèches ou scarifiées.

Enveloppements froids du thorax. Bains tièdes.

Deux fois par jour, une cuillerée à soupe de la potion suivante :

Teinture de digitale.....	1 gr.
Antipyrine.....	ââ 2 gr.
Benzoate de soude.....	
Eau distillée.....	20 gr.
Sirop de sucre.....	q.s. p. 80 eme.

Varier les doses selon l'âge.

Soins de la bouche, du nez, du pharynx. Evacuer l'intestin.

Dans les formes légères, quatre fois par jour, faire une lotion tiède avec une grosse éponge imbibée d'eau bouillie tiède où on mettra par litre un verre de vinaigre aromatique du codex. Envelopper l'enfant dans un peignoir et le coucher.

Dans les formes hyperpyrétiques, maintenir l'enfant dans un enveloppement froid général. Laisser 1/2 heure à 1 heure et recommencer toutes les 3 heures.

Dans les formes très graves, bains froids toutes les 3 heures à 25°. Ne pas insister, si la réaction se fait mal.

S'il y a tendance au collapsus, injections de caféine ou potion de caféine.

S'il y a adynamie, potion alcoolique :

Extrait de quinquina.....	1 gr.
Cognac.....	20 gr.
Julep gommeux.....	q.s. p. 80 cmc.

(D. S. A.)

Contre l'excitation, l'agitation, l'insomnie :

Hydrate de chloral.....	ââ 0 gr. 50
Pyramidon.....	
Sirop d'écorces d'oranges	20 gr.
Eau distillée.....	q.s. p. 60 cmc.

(D. S. A.)

Si on redoute une issue fatale, frictions au collargol.

Polypes naso-pharyngiens

Tenter, si possible, l'ablation.

Polypes du rectum

Ablation après ligature du pédicule. Si possible écrasement du pédicule. Si, après ablation, il se produit une hémorragie, faire le tamponnement du rectum.

Polyurie

Réduction des liquides de l'alimention.

Hydrothérapie, massages, vie au grand air.

Donner du sirop de lactophosphate de chaux, et des préparations de valériane.

Poumon

Congestion pulmonaire. — Cataplasmes sinapisés. Pointes de feu.

Potion avec :

Teinture de digitale	1 gr.
Ergotine	2 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Sirop simple.....	q s. p. 100 cmc.

(D. S. A.)

Injections de sparteine.

Gangrène pulmonaire. — Potion de Todd.

Injections sous-cutanées de :

Gaïacol Camphre	ââ 1 gr.
Huile stérilisée	10 eme.

Potion avec :

Hyposulfite de soude Benzoate de soude	ââ 2 gr.
Eucalyptol	0,20 centigr.
Gomenol	0,40 centigr.
Sirop d'éther	60 gr.
Julep gommeux	q s. pour 120 eme.

(D. S. A.)

Prolapsus du rectum

Régularisation des selles, éviter la diarrhée et la constipation.

Réduction du prolapsus très rapide.

Suppositoires avec :

Tannin	0 gr. 25

Ou :

Extrait de ratanhia	0 gr. 20

Electrisation du sphincter.

Prurigo

Prurigo parasitaire :

Destruction des parasites. Bains sulfureux.

Prurigo simple ou Strophulus :

Hygiène, alimentation sévère et propreté minutieuse.

Onctions au glycérolé d'amidon.

Potion avec :

Acide lactique.....	1 gr.
Eau distillée.....	20 gr.
Sirop de mûres.....	q. s. p. 80 cc.

(D. S. A.)

Prurigo de Hebra :

Huile de foie de morue.

Cures arsenicales et sulfureuses.

Lotions avec :

Acide tartrique.....	1 gr.
Glycérolé d'amidon.....	40 gr.

Prurits localisés :

Pansements humides pendant 3 jours, avec une solution de nitrate d'argent à 1 p. 500. (Abstention sur la face). Ensuite, onctions au glycérolé d'amidon.

Emplâtre à l'oxyde de zinc.

Pseudo-paralysie syphilitique de Parrot

Frictions mercurielles ou administration de mercure sous une forme quelconque.

Psoriasis

Décaper avec des cataplasmes de fécule froids.

Badigeonner matin et soir avec :

Huile de cade.....	2 gr.
Acide salicylique.....	1 gr.
Collodion.....	40 gr.

Ou appliquer des emplâtres cadiques. Eviter l'huile de cade pure.

Médication arsenicale.

Purpura

Lait glacé. Limonade tartrique. Lavements froids. Repos au lit.

Potion avec :

Ergotine.....	0 gr. 50
Sirop de ratanhia.....	30 gr.
Eau de menthe.....	q. s. p. 100 cc.

(D. S. A.)

Ou :

Solution officinale d'adrénaline au millième	XX gouttes.
Eau distillée	40 gr.
Sirop simple	q. s. p. 100 cc.

(D. S. A.)

Ou :

Chlorure de calcium	2 gr.
Eau	60 gr.
Sirop de menthe	q. s. p. 100 cc.

(D. S. A.)

Faire prendre chaque jour 30 grammes de moelle osseuse de veau crue.

S'il y a des douleurs, administrer le salicylate de soude.

Rachitisme

Si on soupçonne la syphilis, avoir recours aux frictions mercurielles ou au sublimé à l'intérieur.

Réglementation absolue de l'alimentation.

Médication par les phosphates de chaux.

Donner 4 cuillerées à café par jour (Marfan) de :

Huile de foie de morue	500 gr.
Sirop de lactophosphate de chaux	350 gr.
Solution de lactophosphate de chaux	150 gr.
Alcoolature de zestes de citron	20 gr.
Gomme adragante	5 gr.

Ou : Pendant 8 jours, une cuillerée à café de :

Huile phosphorée à un pour dix mille.

Repos de 8 jours et recommencer.

Bains salés, hydrothérapie, aérothérapie, massages.

Rage

Conduire l'enfant le plus rapidement possible à l'Institut Pasteur, avec un rapport du vétérinaire qui a examiné l'animal mordeur. On injecte une émulsion fine de moelle de lapin préparée. La durée du traitement est de 15 à 21 jours.

Rate (Maladies de la R...)

Prescrire l'arsenic, et, si la syphilis est soupçonnée, le mercure. Dans quelques cas, le sulfate de quinine est indiqué.

Rhumatisme

Régime lacté. Tisanes de chiendent ou de queues de cerises.

Donner :

Salicylate de soude.....	2 gr.
Sirop de groseilles.....	90 cmc.

Diminuer progressivement les doses.

Onctions sur les articulations malades avec une des pommades suivantes :

Ulmarène.....	2 gr.
Essence de lavande.....	V gouttes
Vaseline..... / Lanoline.....	ââ 20 gr.

Ou :

Salicylate de Méthyle.....	2 gr.
Essence de Verveine.....	V gouttes
Axonge benzoïnée.....	30 gr.

Ne pas essuyer et recouvrir de ouate.

Si l'odeur de ces préparations est désagréable, onctions avec :

Laudanum.....	XX gouttes.
Huile de Jusquiame..... / Huile de camomille camphrée .	ââ 15 gr.

Si le salicylate de soude est mal supporté donner :

Aspirine..... 0 gr. 25

Par cachet.

(D. S. A.)

Ou l'antipyrine.

Rhumatisme chronique

Donner 3 cachets par jour de :

Salophène..... 0 gr. 10

Par cachet.

Ou 2 cachets de :

Salol..... 0 gr. 20

Par cachet.

Essayer le pyramidon.

Médication thyroïdienne ou iodée.

Rougeole

Laisser l'enfant au lit et ne pas le trop couvrir.

Mettre au régime lacté absolu. Tisane de Bourrache.

Toutes les trois heures, faire une lotion vinaigrée

tiède, et, si la température est élevée ou l'agitation excessive, donner un ou deux bains tièdes par jour.

Mettre dans chaque narine trois fois par jour, un peu de la pommade suivante :

Eucalyptol	0 gr. 25
Chloretone	0 gr. 25
Résorcine	1 gr.
Vaseline	30 gr.

Désinfection de la bouche par des gargarismes et des rinçages toutes les 4 ou 5 heures avec de l'eau bouillie où on mettra par verre vingt gouttes de phénosalyl.

Mettre deux fois par jour dans le conduit auditif, quelques gouttes de :

Acide phénique	1 gr.
Huile d'olive	30 gr.

Donner la potion suivante dans la journée :

Terpine Benzoate de soude	âà 0,25 cgr.
Antipyrine	0,50 cgr.
Julep gommeux	60 gr
Sirop d'écorces d'oranges amères.	q. s p. 120 cmc.

Agiter.

(D. S. A)

Le soir donner un lavement avec :

Hydrate de chloral	0 gr. 50 à 1 gr.
Jaune d'œuf	N° 1.
Eau	q. s.

Si nécessaire, suppositoires avec 0,10 cg. de quinine.

Contre la laryngite, inhalations de vapeurs tièdes et application de compresses chaudes au-devant du cou.

Contre les vomissements, faire sucer quelques pastilles de cocaïne (5 ou 6 par jour) ou donner la potion de Rivière.

Dans les formes graves, enveloppements par le drap mouillé.

Contre le catarrhe trop intense, donner une potion avec :

Teinture de racines d'aconit au 1/10e. } Teinture de Belladone au 1/10..... }	ââ L gouttes.
Eau de laurier-cerise.....	10 gr.
Sirop diacode.....	20 gr.
Sirop de Tolu.....	q.s.p 120 cc.

(D. S. A.)

Rubeole

Laisser l'enfant à la chambre.

Donner 2 capsules de quinine de 0 gr. 10.

Balnéation.

Onctions sur les ganglions avec :

Iodure de sodium	1 gr.
Axonge benzoïnée	20 gr.

Sarcomes

Ablation si possible.

Donner chaque jour, pendant 15 jours par mois :

Atoxyl.....	0,01 cgr.
Sucre de lait.....	0,20 cgr.

(Par paquet).

Scarlatine

Séjour au lit dans une chambre bien aérée.

Régime lacté absolu pendant la période fébrile. Régime lacté mitigé par des potages au lait, des purées de légumes, du bouillon de légumes, pendant la période intercalaire qui va jusqu'à la desquamation, puis reprise absolue du régime lacté pendant la desquamation.

Examen des urines deux fois par semaine, et reprise immédiate du régime lacté absolu, s'il y a de l'albumine.

Pendant la période fébrile, gargarismes fréquents et rinçage de la bouche avec de l'eau bouillie où on mettra par verre 20 à 30 gouttes de phénosalyl.

Attouchements des amygdales avec des tampons imbibés d'eau oxygénée chirurgicale dédoublée.

Vaseline boriquée dans le nez.

Bains tièdes à 38° et, s'il y a hyperthermie, enveloppements dans le drap mouillé ou bains froids à condition que la réaction se fasse bien.

Donner trois cuillerées à entremets par jour de :

Caféine	1 gr.
Benzoate de soude	1 gr. 50
Eau distillée	60 gr.
Sirop d'écorces d'oranges. q.s. p.	100 cc.

Et 2 à 3 capsules de sulfate de quinine de 0 gr. 10.

Si les urines tendent à diminuer, donner :

Théobromine Phosphate neutre de soude	ââ 0 gr. 30

Par cachet (1 ou 2 par jour).

S'il y a de l'albumine, donner 20 gouttes, 2 fois par jour de :

Teinture de viscum album	5 gr.

Si l'angine prend un caractère ulcéro-membraneux ou sphacélique, attouchements fréquents avec :

Bleu de méthylène	1 gr.
Alcool, q. s. pour dissoudre...	
Eau distillée	100 gr.

S'il y a du rhumatisme scarlatin : donner du salicylate de soude.

Si on observe une arthrite purulente : arthrotomie.

Si l'infection est très intense, faire des injections quotidiennes d'huile iodée.

Lors de la desquamation, faire tous les jours deux lotions vinaigrées tièdes, et enduire le corps avec de la crème de sapolan blanc, ou de la vaseline boriquée.

Deux fois la semaine, grand bain tiède après une onction avec du savon fluide au bois de panama.

Traitement symptomatique des complications ou des accidents.

Sclérose cérébrale

Donner de l'iodure de potassium, du bromure. Massages et Hydrothérapie.

Scoliose

Surveillance constante de la tenue des enfants.

Massage et électrisation des muscles de la région dorso-lombaire.

Gymnastique appropriée.

Si nécessaire, corset rigide et très bien ajusté.

Bains salés.

Médication par le phosphate de chaux.

Scorbut Infantile

Supprimer les aliments de conserve ou le lait stérilisé ; donner du lait frais, du jus de citron, d'oranges, de la purée de pommes de terre. Bains salés. Cures d'air. Repos.

Scrofule

Hygiène alimentaire, hydrothérapie. Bains salés. Séjour au bord de la mer.

Médications diverses :

Arsenicale. — Liqueur de Fowler ou arséniate de vanadium.

Huile de foie de morue, extraits glycérinés concentrés de foies frais de morue (Sanas), ou de cabillaud (Cabilline), XX gouttes le matin.

M... Iodée et iodurée :

Iode sublimé	1 gr. 50
Iodure de sodium	2 gr.
Tannin pur	3 gr.
Eau distillée	20 gr.
Sirop simple	60 gr.
Vin de Banyuls	q. s. p. 1 litre.

(D. S. A.)

Ou :

Iode	2 gr.
Alcool à 90°	28 gr.
Sirop de quinquina à l'eau	970 gr.

(D. S. A.)

Ou :

Iode	2 gr.
Alcool à 90°	30 gr.
Extrait de feuilles de noyer	25 gr.
Sirop simple	945 gr.

(D. S. A.)

M... Phosphorée ou phosphatée :

Phosphate de soude	5 à 10 gr.
— potasse	5 à 10 gr.
Sirop de quinquina	200 gr.
Vin de Lunel	q. s. p. 1 litre.

Ou encore :

Bromure de sodium	5 gr.
Chlorure de sodium	10 gr.
Iodure du sodium	1 gr.
Eau distillée	100 gr.

(Ce que Potain appelait l'huile de foie de morue d'été).

Séborrhée

Faire des lotions avec le lait de soufre suivant :

Soufre précipité Alcool à 90°	ââ 10 gr.

Eau distillée.....
Eau de roses..... } ââ 50 gr.

Applications de la pommade suivante :

Huile de cade.....
Beurre de cacao..... } ââ 15 gr.
Axonge benzoïnée..... 10 gr.
Bioxyde jaune..... 1 gr.

Spasme glottique

Donner du bromure, du chloral, de l'antipyrine.

Inhalations d'éther. Compresses chaudes et bien essorées au-devant du cou.

Tubage si nécessaire. Trachéotomie en dernier ressort.

Spasmes du Pylore

Observation rigoureuse des principes de l'alimentation.

Donner de 3 à 6 paquets par jour de :

Citrate de soude..... 0 gr. 10

par paquet.

Ou encore :

Bicarbonate de soude.....	
Magnésie anglaise.....	ââ 0 gr. 10
Craie préparée.....	

par paquet.

Si nécessaire, petits lavages de l'estomac.

Spina ventosa

Séjour au bord de la mer. Médication arsenicale, phosphorée. Huile de foie de morue.

En cas de ramollissement, incision, grattage, cautérisation au chlorure de zinc. Pansements et immobilisation.

Stomatites

Stomatite catarrhale. — Rinçage fréquent de la bouche avec de l'eau bouillie où on mettra du phénosalyl ou de la glycothymoline.

Badigeonnages de la muqueuse avec :

Acide borique.....	
Chlorate de potasse.....	ââ 1 gr.
Glycérine.....	10 gr.
Jus de citron.....	15 gr.

Sur le liseré gingival, badigeonnages avec :

Teinture d'iode	1 gr.
Glycérine	10 cmc.

Stomatite impétigineuse. — Souffler de la poudre d'iodoforme sur la labialite externe. Contre la labialite interne et la stomatite même traitement que la stomatite catarrhale, mais, en plus, recouvrir les enduits diphtéroïdes d'un peu de stérésol.

Stomatite ulcéro-membraneuse. — Lavages de la bouche avec :

Eau oxygénée	1 partie.
Eau	10 parties.

Ou :

Permanganate de potasse	0 gr. 25
Eau	1 litre.

Attouchements fréquents de :

Bleu de méthylène	1 gr.
Alcool	q.s. p. dissoudre
Eau	60 à 100 gr.

Donner à l'intérieur :

Chlorate de potasse	2 gr.
Julep gommeux	100 gr.

(D. S. A.)

Stomatite aphteuse et herpétique. — Lavages et rinçages de la bouche à l'eau boriquée.

Cautériser 2 à 3 fois les ulcérations avec le crayon de nitrate d'argent ou avec le badigeonnage suivant :

Salicylate de soude.....	4 gr.
Eau distillée.....	20 gr.

Sucer des pastilles de cocaïne.

Strabisme

Traitement optique d'abord et, si nécessaire, traitement chirurgical.

Sudamina

Saupoudrer avec de la poudre de talc, de lycopode, ou une poudre composée.

Dermatol.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	ââ 10 gr.
Amidon.....	

Sueurs fétides des pieds

Laver le soir les pieds avec la solution suivante :

Formol du commerce.... 1/2 verre à 1 verre.
Eau..... ... 2 litres.

Saupoudrer ensuite avec de la poudre de quinquina maintenue par une chaussette.

Syphilis

Si la mère est contaminée, elle doit donner le sein à son enfant. La mère suivra alors un traitement antisyphilitique soit par les piqûres de sels solubles (cyanure d'hydrargyre, benzoate, biiodure), soit par les sels insolubles (huile grise, huile à l'amalgame d'argent).

On pourra, si on le juge nécessaire, faire quelques frictions mercurielles au nourrisson, mais l'élimination mercurielle par le lait est d'ordinaire suffisante.

Chez l'enfant, jusqu'à trois ans, la médication mercurielle doit se faire soit par les frictions, soit par les sels mercuriels ingérés.

Frictions avec :

Onguent napolitain..... } ââ 20 gr.
Axonge benzoïnée..... }

Ou avec :

Onguent à l'amalgame d'argent.

A l'intérieur, on a le choix pour les préparations à employer entre les formules suivantes :

Biiodure d'hydrargyre..... 0 gr. 15
Iodure de potassium..... 20 gr.
Eau..... 150 gr.
Sirop de suere, q s. pour..... 250 cmc.

(Une à 2 cuillerées à soupe par jour).

Ou :

Liqueur de Van Swieten.

(1 à 2 gr. par année d'âge) dans du lait.

Ou :

Solution au millième de Lactate de mercure.

(1 à 3 cuillerées à café par jour).

A partir de trois ans, on aura recours aux injections profondes de sels insolubles. Nous préférons l'huile à l'amalgame d'argent à 16 pour 100.

(Une demi-seringue ou une seringue de Barthélemy par semaine, soit 0 gr. 02 ou 0 gr. 04 de Hg. métallique Faire d'abord quatre à six piqûres et espacer les quatre dernières, tous les quinze jours).

L'huile grise bien administrée donne de très bons résultats. On formule :

Mercure purifié	2 gr.
Graisse de laine stérilisée.....	1 gr. 30
Huile de vaseline médicale stérilisée, q. s. pour.....	5 cmc.

(Une demi-seringue de Barthélemy contient 0 gr. 06 de Hg. métallique. Faire un quart de seringue à une demi-seringue par semaine ou tous les quinze jours).

Dans certaines formes graves, les injections de sels solubles sont préférables. On aura le choix entre :

Biiodure de mercure.....	0 gr. 10
Huile d'olive stérilisée.....	25 cmc.

Ou :

Benzoate de mercure..... Benzoate d'ammoniaque .....)	ää 0 gr. 15
Eau distillée bouillie.....	15 cmc.

Ou :

Biiodure d'hydrargyre.....	0 gr. 047
Cacodylate de soude.....	0 gr. 40
Iodure de sodium.....	0 gr. 20
Eau distillée, q. s. pour.....	10 gr.

Ou :

Solution d'électr-Hg à 1/2 milligr. par centimètre cube, en ampoules de 3 cmc.

Les doses à injecter de tous ces sels et la durée du traitement sont variables selon l'âge, l'intensité de la maladie, la tolérance plus ou moins grande de l'enfant. Le médecin appréciera ce qui convient e mieux à tel cas déterminé.

Tabes dorsal spasmodique

Gymnastique, hydrothérapie, électrisation.
Préparations de bromure ou de valériane.

Tarsalgie

S'il y a douleur, maintenir l'enfant allongé.
Faire porter des chaussures surélevant la plante des pieds.
Massages et électrisation des peroniers latéraux.
Bains salés.
En cas de déformations, intervention chirurgicale.

Teigne

Séances de dépilation par les rayons X.

Terreurs nocturnes

Rechercher la cause et la traiter. Bains calmants, le soir. Médication bromurée. Bien surveiller le fonctionnement du tube digestif.

Testicules

Ectopie testiculaire. — Massages descendants le long du canal inguinal.

Ne pas mettre de bandage.

Opérer vers 8 ans.

Tétanie

Donner des antinervins (chloral, bromure, antipyrine).

Surveiller le tube digestif. Régime sévère. Lavages de l'estomac, si nécessaire. Donner :

Eau chloroformée..... 50 gr.

(2 à 3 cuillerées à café par jour).

Potion à l'acide lactique :

Acide lactique.....	1 gr.
Eau distillée.....	60 gr.
Sirop de mûres.....	q. s. p. 100 cc.

(D. S. A.)

Tétanos

Injecter d'abord 20 cc. de sérum antitétanique, puis 10 cc. les jours suivants.

Isolement, obscurité, alimentation par la sonde.

Lavements avec :

Hydrate de chloral.....	0 gr. 40
Jaune d'œuf.....	n° 1
Eau, q. s. pour 1 lavement.	

(A renouveler souvent).

Thymus

Hypertrophie du Thymus. — Faire des frictions à l'onguent napolitain.

Trachéotomie en cas d'asphyxie.

Tœnia

Purgatif au calomel (0 gr. 05 par année d'âge) et régime lacté absolu pendant 24 heures.

Le lendemain matin, après administration d'un lavement ordinaire, donner toutes les dix minutes un des bols suivants :

Extrait éthéré de fougère mâle..	8 gr.
Poudre de fougère mâle.....	6 gr.
Calomel à la vapeur.....	1 gr.

(A diviser en 20 bols).

(On donne selon l âge de 4 à 6 bols et même 10) ; après le dernier bol pris, on laisse l'enfant au repos pendant 1 heure et on lui donne un purgatif à l'huile de ricin (D.S.A.).

Faire aller l'enfant à la garde-robe sur un vase plein d'eau tiède. Vérifier si la tête du tœnia est expulsée.On peut donner l'extrait éthéré en potion :

Extrait éthéré de fougère mâle...	5 gr.
Sirop d'éther.....	10 gr.
Gomme pulvérisée.....	1 gr.
Looch blanc, q. s. pour.....	100 eme.

(Une cuillerée à entremets représente 0 gr. 50 d'extrait).

Torticolis

S'il s'agit de rhumatisme cervico-occipital, donner :

Salicylate de soude.....	2 gr.
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	q. s. p. 60 eme.

par cuillerées à soupe.

S'il s'agit d'un torticolis symptômatique d'un mal de Pott sous-occipital, redressement et application d'une minerve.

Contre les rétractions du sternomastoïdien : ténotomie.

Tricocéphale

Lavages de l'intestin à l'eau naphtolée (0 gr. 25 par litre.)

Administrer la santonine.

Pastilles de chocolat à la santonine de 0 gr. 05 (D. S. A.)

Ou :

Thymol.....	1 gr.
Huile d'olive.....	4 gr.
Gomme arabique.....	2 gr.

Sirop d'écorces d'oranges ..... 20 gr.
Eau distillée.....q.s. pour 60 cmc.

Une cuillerée à soupe chaque matin, et le soir un laxatif à la poudre de réglisse composée.

Tuberculose

Insister sur une alimentation substantielle et abondante.

Donner de la viande crue, maigre, hâchée finement, soit sous forme de boulettes, soit mélangée avec du bouillon froid. Varier en donnant du suc de viande crue ainsi préparé : Prendre 300 gr. de viande de cheval ou de bœuf bien maigre et hachée menue ; saupoudrer d'un peu de sel et d'eau : laisser en contact 1/2 heure ; puis exprimer fortement avec un presse-viande. Le jus extrait est absorbé à froid tel qu'on l'obtient.

Si on est dans l'impossibilité d'avoir recours à la viande ou au suc de viande (zômothérapie) on peut employer les extraits ou sucs de viande préparés industriellement et livrés au commerce. Parmi les plus connus, nous citerons :

la musculosine Byla,

la succomusculine Chaix,

la carnine Lefranc,
la Valentin's Meat-Juice,
les poudres de viande diverses
la somatose, en poudre ou liquide.

Administrer l'huile de foie de morue simple ou en émulsion :

Huile de foie de morue.....	140 gr.
Sirop simple.....	60 gr.
Eau distillée de fleurs d'oranger.	40 gr.
Carragaheen.....	5 gr.
Eau distillée	q.s.
Essence d'amandes amères.....	IV gouttes

(Cette émulsion renferme environ 1/3 de son poids d'huile de foie de morue).

On peut remplacer l'huile de foie de morue par les extraits glycérinés concentrés de foies frais de morue (Sanas) ou de cabillaud (Cabilline) aux doses de quinze à vingt gouttes chaque matin.

L'huile de foie de morue peut être additionnée de médicaments réputés bacillicides comme la créosote, le gaïacol, l'iodoforme, l'acide phénique. Voici diverses formules :

Gaïacol cristallisé.....	10 gr.
Huile de foie de morue blonde..	990 gr.

(D. S A.)

Ou :

Créosote officinale.....	10 gr.
Huile de foie de morue.....	990 gr.

(D. S. A.)

Ou :

Acide phénique chimiquement pur.....	3 gr. 50
Huile de foie de morue	996 gr. 50

(Une cuillerée à soupe renferme sensiblement 0 gr. 05 d'acide phénique pur)

L'huile de foie de morue peut être également associée au Phosphore :

Huile phosphorée au centième..	2 gr. 50
Huile de foie de morue.....	497 gr. 50

(D. S. A.)

La médication phosphorée donne dans nombre de cas de très bons résultats. On peut donner trois fois par jour un des paquets suivants :

Phosphate de chaux..... / Phosphate de soude ..... \	ââ 0 gr. 10
Craie préparée.....	0 gr. 05

On peut avoir recours au Glycérophosphate de chaux granulé (1 à 3 cuillerées à entremets selon l'âge), aux Hypophosphites (Voir formulaire), aux lactophosphates, ou à l'acide phosphorique ou à un combiné de ces diverses médications. On peut prescrire 2 à 3 cuillerées à café de granulés contenant par cuillerée à café :

Phosphate de chaux...	0 gr. 25
Hypophosphite de soude.....	0 gr. 05
Acide phosphorique.....	0 gr. 01

Le sirop de chlorhydrophosphate de chaux peut se formuler ainsi :

Phosphate bicalcique.....	12 gr.
Acide chlorhydrique officinal....	8 gr.
Alcoolature de citrons.....	10 gr.
Sirop de sucre..... .q.s. pour	1 litre

(Une à deux cuillerées à soupe par jour selon l'âge).

Parmi les préparations réputées bacillicides, on peut employer la créosote, le gaïacol, l'iodoforme. Voici quelques formules :

Gaïacol cristallisé.....	7 gr. 50
Glycérine pure.....	92 gr. 50
Sirop simple.....	900 gr.

(Une cuillerée à soupe renferme 0 gr. 15 de gaïacol).

Ou :

Créosote.....	2 gr.
Sirop de Lactophosphate de chaux	80 gr.
Sirop de codéine.....q.s pour	120 cme.

(Une cuillerée à soupe par jour).

La médication arsenicale est d'un usage courant, on peut avoir recours à la liqueur de Fowler, à la vanadarsine, etc. (Voir formulaire).

Quand il n'y a pas fièvre, et au moment de la convalescence, donner des préparations iodées, du sirop de quinquina iodé ou phosphaté, du sirop de noyer iodé ou non :

Iode.....	2 gr.
Alcool à 90°.....	30 gr.

Extrait de feuilles de noyer..... 25 gr.
Sirop simple..... 975 gr.

La *licithine* a ses partisans. Elle s'administre en dragées de 0 gr. 05 (2 à 4 par jour) ou en granulé contenant 0 gr. 10 par cuillerée à café (1 à 2 par jour).

Récemment, on a préconisé certains produits organiques provenant du foie ou de la bile, nous pouvons citer :

Le lipochol ou *cholesterine* (en pilules de 0 gr. 20, 2 à 4 par jour ; ou en émulsion de 0 gr. 30 par cuillerée à soupe (2 à 4 cuillerées à café par jour).

La paratoxine en pilules ou en injections sous-cutanées.

Il est bien entendu que l'hygiène générale sera rigoureusement suivie : Frictions sèches ou alcooliques sur le corps, lotions froides rapides. Séjour dans une chambre vaste, bien aérée, exposée au midi. La nuit, laisser la fenêtre entr'ouverte. Cures d'air sur une chaise longue pendant la journée. Vivre le plus possible à la campagne, en plein air.

Révulsions locales avec des pointes de feu, de la teinture d'iode, des frictions térébenthinées avec :

Essence de térébenthine.....
Baume de Fioraventi..... } aâ 40 gr.

Les symptômes marquants seront l'objet de soins spéciaux et nécessitent une thérapeutique spéciale.

Le médecin agira à sa convenance et variera les médications en se reportant aux nombreux médicaments signalés dans la partie : Formulaire.

Urticaire

Bains d'amidon.

Lotions vinaigrées froides, en mettant un verre du vinaigre suivant dans 1 litre d'eau.

Acide salicylique.....	10 gr.
Acide acétique cristallisé.....	100 gr.
Essence d'eucalyptus.....	5 gr.
Eau de Cologne.....	885 gr.

Poudrer avec de la poudre d'amidon, ou onctions avec du glycérolé d'amidon.

Purgatif au calomel et régime lacté.

Donner :

Eau chloroformée saturée.
(3 cuillerées à café par jour).

Pendant 7 à 8 jours, donner, à midi et le soir, dix gouttes de la solution suivante :

Permanganate de potasse.....	5 gr.
Arséniate de soude.....	0 gr. 10
Eau distillée.....	95 gr.

Vaccination

Employer les tubes de vaccin de l'institut vaccinal (de Paris), ou du docteur Chaumier (de Tours).

Ne pas vacciner un enfant en poussée d'eczéma.

Vacciner avec une lancette à cataracte dont l'extrémité a été trempée dans l'eau bouillante.

Recouvrir de coton hydrophile stérilisé, et laisser bander pendant 4 jours ; au bout de ce temps, pansement quotidien à la vaseline stérilisée.

Si la rougeur diffuse trop autour des pustules, appliquer pendant 24 heures un pansement humide à l'eau boriquée.

Varicelle

Régime lacté ou lacto-végétarien pas trop sévère. Purgatif au calomel.

Donner la potion suivante :

Sulfate de spartéine.....	0 gr. 02
Extrait fluide de stigmates de maïs.....	1 gr.
Sirop des cinq racines.....	50 gr.
Infusion de chiendent.....	q. s p. 150 cc.

(Cinq cuillerées à soupe par jour).

S'il y a fièvre, suppositoire avec 0 gr. 10 de quinine.

Recouvrir les principales vésico-pustules de stérésol (2 fois par jour).

Cautérisation au nitrate d'argent des vésicules ulcérées de la bouche.

Instiller 2 fois par jour dans les conjonctives, le collyre suivant :

Argyrol	1 gr.
Eau distillée.....	30 gr.

Variole

Régime lacté. Boissons abondantes. Large aération.

Contre les papulo-vésicules de la figure, pansements humides pendant 2 à 3 jours avec une solution de nitrate d'argent à 1 pour 300 (mettre des gants. La coloration noire disparaît en une dizaine de jours).

Ou application précoce de :

Bichlorure d'Hydrargyre.....	0 gr. 50
Traumaticine.....	50 gr.

A rejeter, lorsque les vésicopustules sont nettement formées.

Ou pansement humide au sublimé, en solution au millième.

Irrigations de la bouche à l'eau boriquée.

Au début, bains froids; plus tard, bains tièdes, et, si nécessaire, bains au sublimé.

Pulvérisations au sublimé sur les pustules.

Verrues

Les brûler au thermo ou au galvano-cautère.

Panser avec de l'emplâtre à l'ectogan.

Vessie (Cystites)

Instillation de quelques gouttes de solution de nitrate d'argent au centième.

Ou instillation d'huile gomenolée au 1/20.

A l'intérieur :

Salol ..... 0 gr. 20

Par cachet.

(2 à 3 par jour.)

Boissons alcalines.

Voile du Palais

Perforation et division congénitales. — Faire l'urano-staphylorraphie vers l'âge de 6 ans.

Vomissements

Eau de Vichy ou de Vals. Boissons glacées.

Chez les nourrissons : donner à chaque tetée une cuillerée à café de :

Citrate de soude.....	5 gr.
Eau distillée.....	300 gr.

Chez les enfants plus âgés, donner 3 à 4 cuillerées à café de :

Eau chloroformée saturée.

Ou 20 à 40 gouttes de :

Teinture de lichen d'Islande.

Contre les vomissements cycliques, M. Marfan prescrit, au début de chaque mois, un verre à madère avant chacun des deux principaux repas de :

Eau distillée.....	1 litre.
Sulfate de soude.....	10 gr.

Phosphate de soude .....
Bicarbonate de soude..... ââ 5 gr.
Bromure de sodium.....

Traiter surtout la cause.

Vulvo-vaginite

Lavages de la vulve avec des tampons imbibés de la solution suivante :

Permanganate de potasse.....	0 gr. 25
Eau distillée	1 litre

Si le vagin est infecté, laver avec la même solution à l'aide d'une petite sonde.

Saupouder ensuite la vulve avec la poudre suivante :

Talc.....	20 gr.
Acide borique pulverisé.....	10 gr.
Aristol.....	2 gr.

(Mêler finement).

Maintenir les lèvres isolées par un tampon de ouate.

Zona

Donner à l'intérieur des cachets de :

Pyramidon .....
Sulfate de quinine..... } ââ 0 gr. 10

Si les douleurs sont trop vives, injecter au niveau du point dorsal soit de la morphine, soit de la cocaïne, soit de l'antipyrine.

Saupoudrer les vésicules, ulcérées ou non, avec :

Salicylate de Bismuth.....
Sous-nitrate de Bismuth ..... } ââ 10 gr.
Poudre d'amidon.....
Poudre de lycopode..... } ââ 40 gr.

TROISIÈME PARTIE

LES MÉDICAMENTS

Acétate d'Ammoniaque

Aspect : Liquide incolore.

Solubilité : Dans l'eau et l'alcool.

Saveur : Amère. Odeur urineuse.

Incompatibilités : Acides, soude, carbonate de potasse, de soude ; sulfates métalliques, tannin.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 50	à 1 gr.
De 15 mois à 3 ans...	1 gr.	à 3 gr.
De 3 à 5 ans.....	3 gr.	à 5 gr.
De 5 à 10 ans.....	5 gr.	à 8 gr.

Exemple de formule :

Acétate d'ammoniaque.....
Teinture de cannelle..... } ââ 5 gr.

Extrait de quinquina..... 1 gr.
Eau de mélisse.....
Eau de tilleul.....) âà 50 gr.
Sirop de menthe, q. s. pour..... 150 eme.

(Une cuillerée à soupe représente 0 gr. 50).

Acétate de potasse

Aspect : Sel incolore déliquescent.

Saveur : Amère et piquante.

Solubilité : Dans l'eau.

Incompatibilités : Théobromine.

Doses :

De 3 à 5 ans..... 0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans..... 1 gr. à 2 gr. 50

Exemple de formule :

Entre dans la composition du *Vin diurétique de l'Hôtel-Dieu.*

Feuilles de digitale..... 5 gr.
Squames de seille..... 7 gr. 50
Baies de genièvre..... 75 gr.
Acétate de potasse sec..... 50 gr.
Vin blanc..... 900 gr.
Alcool à 90°..... 100 gr.

(Une cuillerée à soupe pèse 16 gr. et renferme 0 gr. 80 d'acétate de potasse, les principes solubles de 0 gr. 08 de feuilles de Digitale et 0 gr. 12 de squames de scille).

Acétopyrine (Acétylsalicylate d'antipyrine)

Aspect : Poudre cristalline blanche.
Solubilité : Dans l'alcool.
Saveur : Légèrement styptique.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 25 à	0 gr. 50
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 50 à	1 gr.

Exemple de formule :

Acétopyrine.....	1 gr.
Alcool à 90°.....	5 gr.
Julep gommeux..... q. s. pour	60 cmc.

Ache

S'emploie sous forme d'extrait aqueux ou de sirop des cinq racines.

Extrait aqueux

Aspect : Mou brunâtre.
Solubilité : Dans l'eau, le sirop, la glycérine.
Saveur : Douceâtre et amère.

Doses :

0 gr. 10 par année d'âge.

Exemple de formule :

Extrait d'ache.....	2 gr.
Oxymel scillitique.....	40 gr.
Sirop d'écorees d'oranges, q. s. p.	90 eme.

Sirop des cinq racines

(Contient de l'ache, de l'asperge, du fenouil, du petit-houx, du persil).

Doses :

5 gr. par année d'âge.

Acide carbonique

S'emploie sous forme d'eau de Seltz ou sous forme de potion de Rivière.

(V. bicarbonate de soude).

Acide chlorhydrique

On emploie la solution aqueuse au 1/10.

Saveur : Acide.

Incompatibilités : Alcalis et carbonates alcalins, sels métalliques. Lait.

Equivalence : 1 gr. = 20 gouttes.

Doses (de la solution au 1/10e) :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans..	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15
De 5 à 12 ans	0 gr. 15 à 0 gr. 25

Exemple de formule :

Acide chlorhydrique officinal....	0 gr. 50
Sirop de limons.....	50 gr.
Potion gommeuse.... q. s. pour	100 cmc.

(Une cuillerée à entremets contient 0 gr. 05).

Acide phénique

S'emploie sous forme de sirop phéniqué.

Acide phénique pur.....	aâ 0 gr. 50
Alcool à 90°	
Sirop simple.....	99 gr.

(Une cuillerée à soupe représente 0 gr. 10 d'acide phénique).

Doses :

De 5 à 10 ans.....	1 à 3 cuill. à café.

Ou sous forme de glycophénique injectable :

Acide phénique neigeux..... 1 gr.
Glycérine neutre à 30°..... 10 gr.
Eau distillée..... q s. pour 100 cmc.

(Une 1/2 seringue à 1 seringue de Pravaz au-dessus de 6 ans, dans les états infectueux graves).

Acide tartrique

Aspect : Cristaux incolores.

Saveur : Acide et agréable.

Solubilité : Dans l'eau et l'alcool.

Incompatibilités : Alcalis, carbonates, sels de plomb, de calcium, d'ammonium, de strontium, de potasse, l'eau commune.

Doses : (Laxatif).

De 3 à 12 ans..... 0 gr. 25 à 0 gr. 50

Exemple de formule :

I.

Limonade tartrique ..... au millième.

II.

Sirop tartrique dosé à 0 gr. 20 par cuillerée à soupe.

Tartrate de soude et de potasse (sel de Seignette)

Aspect : Cristaux incolores.

Solubilité : Dans l'eau.

Saveur : Amère et salée.

Incompatibilités : Sels de chaux, de plomb, acides, sels acides.

Doses : (comme purgatif).

De 0 à 15 mois.....	5 gr. à	10 gr.
De 15 mois à 3 ans....	10 gr. à	15 gr.
De 3 à 5 ans.....	15 gr. à	20 gr.
De 5 à 12 ans.....	20 gr. à	40 gr.

Exemple de formule :

Sel de Seignette.....	20 gr.
Eau distillée.....	25 gr.
Sirop de sucre..... q. s. pour	60 cmc.

Tartrate acide de potasse (crème de tartre)

Aspect : Cristaux blancs.

Solubilité : Peu soluble dans l'eau.

Saveur : Aigrelette.

Incompatibilités : Acides, sels de chaux, de plomb, d'antimoine, de strontiane.

Doses : (Laxative).

De 5 à 12 ans.....	0 gr. 25 à 1 gr.

Exemple de formule :

Magnésie.....
Fleur de soufre..... } ââ 0 gr. 10
Crème de tartre.....

Par paquet.

Aconit

Employer soit la teinture de racines au 1/10e, l'alcoolature de feuilles à parties égales, l'extrait hydro-alcoolique de racine à 1 pour 100, le sirop de racines d'aconit.

Alcoolature de feuilles à parties égales

Aspect : Liquide brun verdâtre, se trouble par addition d'eau.

Solubilité : Dans le sirop et la glycérine.

Saveur : Un peu âcre avec sensation de sécheresse à la gorge.

Incompatibilités : Acides, alcalis, tanins, charbon, solutions iodées ou iodurées. Substances dégageant du chlore.

Equivalence : 1 gr. = 55 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	de 15 à 30 gouttes.
De 3 ans à 5 ans.....	de 30 à 50 gouttes.
De 5 ans à 10 ans.....	de 1 à 2 gr.

Exemple de formule :

Alcoolature de feuilles d'aconit .	1 gr.
Sirop de Drosera.....	60 cmc.

(Par cuillerées à café.)

Teinture de racines d'aconit au 1/10e

Aspect : Liquide jaune brunâtre.

Solubilité : Trouble léger par addition d'eau.

Saveur : Sensation persistante de fourmillement sur la langue.

Incompatibilités : Comme l'alcoolature

Equivalence : 1 gr. = 57 gouttes.

Doses :

En moyenne de 3 à 4 gouttes par année révolue.

De 0 à 15 mois.....	2 à 4 gouttes.
De 15 mois à 3 ans.....	4 à 10 gouttes.
De 3 ans à 5 ans	10 à 16 gouttes.
De 5 ans à 10 ans.....	16 à 30 gouttes.

Exemple de formule :

Teinture de racines d'aconit au 1/10e.....	VIII gouttes.
Eau distillée.....	80 gr.
Sirop de menthe.....	q.s. p. 120 eme.

(1 goutte par cuillerée à soupe).

Extrait hydro-alcoolique de racines au 1/100e

Aspect : Extrait brun.

Solubilité : Se trouble avec l'eau.

Saveur : Légèrement amère.

Doses :

De 0 à 15 mois...	Abstention.
De 15 mois à 3 ans	Abstention.
De 3 ans à 5 ans.	de 0 gr. 005 à 0 gr. 015
De 5 ans à 10 ans.	de 0 gr. 015 à 0 gr. 04

Exemple de formule :

Extrait hydroalcoolique de racines d'aconit.....	0 gr. 001
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 05

Par pilule.

Ou :

Extrait hydroalcoolique de racines d'aconit.....	0 gr. 012
Alcool..... / Glycérine.....	âà 5 gr.
Eau de tilleul.....	20 gr.
Sirop de capillaire, q. s. pour...	60 cmc.

(1 cuillerée à café contient un milligramme).

Sirop de racines d'aconit

Equivalence : Une cuillerée à soupe renferme 0 gr. 50 de teinture de racine au 1/10e.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	2 gr. à 5 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	5 gr. à 8 gr.
De 3 à 5 ans.....	8 gr. à 10 gr.
De 5 à 10 ans.....	10 gr. à 15 gr.

Exemple de formule :

Sirop de racines d'aconit.....	20 gr.
Sirop de Tolu.....	40 gr.
Eau de tilleul, q. s. pour.....	90 cmc.

Aconitine

Ne jamais le prescrire chez les enfants.

Adonis Vernalis

On utilise les extraits aqueux ou fluides, la teinture, le sirop.

Les extraits aqueux ou fluides sont solubles dans l'eau, le sirop, la glycérine ; la teinture est miscible seulement au sirop et à la glycérine.

Doses :

Extrait aqueux.	0 gr. 02	par année d'âge
Extrait fluide..	0 gr. 10	par année d'âge
Teinture.....	0 gr. 20	par année d'âge
Sirop.....	5 gr.	par année d'âge

Equivalences :

Extrait fluide.....	1 gr.	=	38 gouttes
Teinture.....	1 gr.	=	54 gouttes

Exemple de formule :

Extrait fluide d'adonis vernalis..	2 gr.
Sirop d'écorce d'oranges amères.	60 cmc.

Adrénaline

S'emploie sous forme de solution acide au millième.

Aspect : Solution incolore, mais qui devient dorée en vieillissant par oxydation.

Saveur : Légèrement amère. Inodore.

Equivalence : 1 gr. = 20 gouttes

Doses :

Jusqu'à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	de I à III gouttes.
De 6 à 12 ans.....	de III à VI gouttes.

Exemple de formule :

Solution officinale d'adrénaline au millième.....	XX gouttes.
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop de sucre, q. s. pour.....	60 cme.

On l'emploie pour l'usage externe, associée à la cocaïne ou à la stovaïne, comme anesthésique et hémostatique local :

Ampoules de 1/4 mmg. d'adrénaline et 0 gr. 005 de cocaïne

Ou :

Ampoules de 1/10 mmg. d'adrénaline et 0 gr. 015 de stovaïne

Aethone (ou Triœthol)

Aspect : Liquide incolore.

Solubilité : Dans l'eau, le sirop.

Saveur : Désagréable, odeur spéciale.

Incompatibilités : Acides dilués, contact prolongé de l'eau.

Doses :

de 3 à 6 ans.....	50 à 100 gouttes
de 6 à 12 ans.....	100 à 150 gouttes

Exemple de formule :

Æthone.....	XV gouttes
Sirop de Tolu.....	20 gr.
Eau distillée.....q.s. pour	50 eme.

(A préparer au moment du besoin et à renouveler 4 fois par jour).

Agaric blanc

On emploie la poudre.

Saveur : Amère, odeur nauséabonde.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
de 15 mois à 3 ans....	0 gr. 02 à 0 gr. 05
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15

Exemple de formule :

Poudre d'agaric blanc.....	0 gr. 02
Extrait de belladone.....	0 gr. 001

Par pilule.

Albumine

Employer l'eau albumineuse (2 blanes d'œufs par 1/2 litre d'eau).

Incompatibilités : Acides, Alcool.

Alcool

Doses :

de 0 à 15 mois.....	5 à 10 gr.
de 15 mois à 3 ans	10 à 15 gr.
de 3 à 5 ans	15 à 20 gr.
de 5 à 10 ans	20 à 30 gr.

Employer la potion de Todd :

Teinture de cannelle.....	5 gr.
Sirop simple	30 gr.
Alcool à 60°.....	40 gr.
Eau distillée .....q.s. pour	150 cmc.

Dans laquelle on peut remplacer l'alcool à 60° par de l'eau-de-vie vieille, du rhum ou du cognac.

Alkekenge

On emploie l'extrait aqueux, soluble dans l'eau, le sirop, la glycérine.

Doses :

0 gr. 20 par année d'âge.

Aloès

S'utilise sous forme de :

Teinture au 1/5.
D'Elixir de longue vie.
D'Elixir de Garus.

Teinture au 1/5e

Aspect : Liquide brun très amer.

Solubilité : Précipite par l'eau. Soluble dans le sirop et la glycérine.

Saveur : Amère et odeur forte.

Incompatibilités : Acides minéraux, salicylique, tannique ; iode, menthol, phénol, thymol.

Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

Abstention jusqu'à 10 ans.
Au-delà, dose maxima..... 0 gr. 50

Exemple de formule :

Teinture d'aloès..... ..... 3 gr.
Sirop d'écorees d'oranges amères. 120 cme.

(1 cuillerée à entremets contient 0 gr. 25).

Elixir de longue vie

Aspect : Liquide brun (contient de la rhubarbe, de l'agaric, de la gentiane).

Saveur : Amère. Très arômatique.

Abstention jusqu'à 5 ans.
Au-delà de 5 ans : dose maxima. 5 gr.

Elixir de Garus

(Contient de l'aloès, de la myrrhe, du safran, de la cannelle, de la girofle, de la noix muscade, etc.)

Aspect : Jaune clair.

Saveur : Arômatique, liquoreuse, rappelant la cannelle et la muscade.

Doses :

Jusqu'à 15 mois..... 2 à 5 gr.
De 15 mois à 3 ans..... 5 à 10 gr.
De 3 à 5 ans..... 15 à 20 gr.
5 à 10 ans..... 20 à 30 gr.

Exemple de formule :

Elixir de Garus.....	60 gr.
Sirop d'éther.....	40 gr.
Eau distillée..... q. s pour	120 cmc.

Alun

Employé exclusivement pour l'usage externe en gargarismes.

Saveur : Très astringent.

Doses :

De 3 à 5 ans	0,50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans.....	1 gr. à 5 gr.

Pour 250 gr. d'eau.

Exemple de gargarisme :

Alun.....	5 gr.
Miel rosat.....	30 gr.
Roses rouges.....	10 gr.
Eau bouillante.....	250 cmc.

Ammoniaque

On emploie la solution aqueuse au 1/10e.

Aspect : Liquide incolore.

Saveur : Caustique et alcaline. Odeur forte et suffocante.

Incompatibilités : Iode, sels des métaux, chlorure de mercure, sels d'argent, acides, alun.

Equivalence : 1 gr. = 22 gouttes.

Doses :

de 3 à 5 ans.....	III à V gouttes
de 5 à 12 ans.....	V à XII gouttes

Exemples de formules :

Ammoniaque officinale.....	XX gouttes
Eau.....	40 gr.
Sirop de sucre.....q. s. pour	120 cmc.

Entre dans la composition de nombreux liniments.

I

Ammoniaque liquide.....	10 gr.
Huile d'olives.....	90 gr.

II

Ammoniaque liquide.....	10 gr.
Huile camphrée.....	90 gr.

et du *baume Opodeldoch* :

Savon animal.....	95 gr.
Camphre pulvérisé.....	75 gr.
Ammoniaque.....	30 gr.
Essence de romarin.....	20 gr.
— thym.....	5 gr.
Alcool à 90°.....	775 gr.

Anémone pulsatile

Employer l'extrait hydro-alcoolique ou l'alcoolature, solubles tous deux dans l'alcool, le sirop, la glycérine, insolubles dans l'eau. On peut utiliser le sirop.

Doses :

Pour l'extrait : 0 005 mmg. par année d'âge.
Pour l'alcoolature (1 gr. = 54 gout.) V gouttes par année d'âge.
Pour le sirop. 5 gr. par année d'âge (au grand maximum).

Exemple de formule :

Alcoolature d anémone pulsatile.	XXX gouttes.
Bromure de sodium.....	5 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères q. s. pr 150 cmc.	

Anis vert

Employer la teinture au 1/5, soluble dans la glycérine.

Equivalence : 1 gr. = 60 gouttes

Doses :

X gouttes par année d'âge.

Exemple de formule :

Teinture d'anis au 1/5.....	5 gr.
Glycérine.....	10 gr.
Sirop de sucre.....	100 gr.
Elixir de Garus..... q. s. pour	150 cmc.

Antimoine

On emploie l'oxyde blanc, le kermès, l'émétique.

Oxyde blanc

Aspect : Corps amorphe, blanc.

Solubilité : Insoluble dans l'eau ou les acides.

Saveur : Nulle.

Incompatibilités : Acides gallique et tannique, liquides astringents, sels acides, sulfates alcalins, sels de plomb, liquides albumineux, savon.

Doses :

Jusqu'à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	de 0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 5 à 10 ans.....	de 0 gr. 20 à 0 gr. 30

Exemple de formule :

Oxyde blanc d'antimoine.....	0 gr. 20
Gomme adragante.....	0 gr. 04
Sucre.....	1 gr.

Eau distillée..... 10 gr.
Sirop de fleur d'oranger, q. s. p. 60 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 05 d'oxyde blanc.)

Kermès

Aspect : Poudre, rouge brun, velouté.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

Saveur : Inodore, insipide.

Incompatibilités : Mêmes que pour l'oxyde blanc.

Doses :

Jusqu'à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 03 à 0 gr. 05
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15

Exemple de formule :

Kermès ..... 0 gr. 30
Benzoate de soude..... 0 gr. 50
Eau de laurier cerise..... 4 gr.
Julep gommeux..... q. s. pour 90 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 05 de kermès)

Emétique

Aspect : Cristaux blanchâtres.

Solubilité : Dans 14 parties d'eau froide ; précipite de ses solutions.

Saveur : Acre et désagréable. Inodore.

Incompatibilités : Mêmes que les autres sels d'antimoine.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 005 à 0 gr. 01
De 5 à 10 ans	0 gr. 01 à 0 gr. 02

Exemple de formule :

Emétique	0 gr. 06
Sirop de Desessartz.....	20 gr.
Infusé de Polygala, q. s. pour.	90 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 01 d'émétique).

Antipyrine

Aspect : Poudre cristallisée blanche.

Solubilité : Très soluble dans l'eau, l'alcool.

Saveur : Amère.

Incompatibilités : Chloral, phénol, résorcine, salicylate de soude, sublimé, tannin, teinture de cannelle, extrait de quinquina.

Doses :

De 0 à 6 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 6 mois à 1 an.....	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 1 an à 2 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 40
De 2 ans à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Antipyrine.....	1 gr.
Caféïne.....	0 gr. 10
Eau de tilleul.....	50 gr.
Sirop de sucre ..... q. s. pour	100 cmc.

(Une cuillerée à entremets contient 0 gr. 10 d'antipyrine).

Apocynum cannabinum

Employer l'extrait fluide à parties égales ou la teinture au 1/10.

Tous deux sont solubles dans le sirop et la glycérine ; la seconde seule dans l'eau.

Equivalences :

Extrait fluide.....	1 gr.	=	57 gouttes
Teinture	1 gr.	=	56 gouttes

Doses :

Extrait fluide.	I goutte par année d'âge
Teinture.....	III gouttes par année d'âge

Exemple de formule :

Teinture d'apocynum au 1/10....	XXXX gouttes
— chanvre indien.....	X gouttes
Sirop des cinq racines	40 gr.
Sirop simple ..... q.s. pour	100 cmc.

(1 cuillerée à café contient II gouttes).

Argent

Nitrate d'argent

Aspect : Cristaux blancs.

Solubilité : Très soluble dans l'eau distillée.

Saveur : Amère, salée.

Incompatibilités : Alcalins, carbonates alcalins, acides et sels minéraux, chlorures, iodures, sulfures, savon, eau de chaux, tannin, astringents.

Doses :

de 0 à 6 mois	0 gr. 001
de 6 mois à 1 an	0 gr. 002
de 1 à 3 ans	0 gr. 005
de 3 à 5 ans	0.01 à 0 g. 02
de 5 à 10 ans	0.02 à 0 g. 05

Exemple de formule :

Nitrate d'argent cristallisé	0 gr. 01
Eau distillée	60 gr.
Sirop simple.....q s. pour	90 cmc.

Argyrol

Aspect : Masse brune déliquescente, très hygrométrique.

Solubilité : Dans l'eau.

S'emploie pour l'usage externe.

Exemple de formule :

Argyrol	0 gr. 50
Eau distillée	1 gr.

Pour un collyre.

Aristol

Aspect : Poudre volumineuse de couleur rouge brique.

Odeur : Nulle.

Solubilité : Dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et les huiles grasses.

S'emploie seulement pour l'usage externe.

Exemple de formule :

Aristol	1 gr.
Huile d'olive	3 gr.
Vaseline	16 gr.

Ou en poudre mélangée.

Arsenic

On emploie l'acide arsénieux, l'arséniate de soude, l'arsénite de potasse, l'arséniate de vanadium, l'arséniate de fer, le cacodylate, le méthylarsinate.

Acide arsénieux

S'emploie sous forme de liqueur de Boudin qui est une solution au millième dans l'eau distillée.

Aspect : Solution incolore.

Saveur : Un peu acidule.

Incompatibilités : Eau de chaux, sels de magnésie, de fer, kermès, astringents.

Doses :

au-dessous de 3 ans.....	Abstention.
de 3 à 5 ans.....	1 à 2 gr.
de 5 à 10 ans.....	2 à 5 gr.

Exemple de formule :

Liqueur de Boudin.....	10 gr.
Eau de tilleul.	60 gr.
Sirop de suere ..... q. s. pour	100 eme.

Arséniate de soude

Aspect : Cristaux blancs.

Solubilité : Soluble dans l'eau et la glycérine.

Saveur : Nulle.

Incompatibilités : Mêmes que l'acide arsénieux.

Doses :

de 2 à 3 ans..	1/3 à 1/2 millig.	par jour
de 3 à 5 ans..	1/2 à 1 millig.	
de 5 à 10 ans..	1 à 1 millig. 1/2	

Exemple de formule :

Eau distillée.....	300 gr.
Arséniate de soude.....	0 gr. 03

(Une cuillerée à café renferme un 1/2 millig.).

Ou :

Arséniate de soude.....	0 gr. 05
Gouttes amères de Baumé.....	10 gr.

(Deux gouttes dans un peu d'eau)

Arsénite de Potasse

Se donne sous forme de *Liqueur de Fowler.*

Anhydrique arsénieux..... } Carbonate neutre de potasse... }	ââ 1 gr.
Alcool à 90°.....	12 gr.
Alcoolat de mélisse composé....	3 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	100 gr.

Aspect : Liquide clair.

Saveur : Un peu acide.

Equivalence : 1 gr. = 34 gouttes.

Doses .

Au-dessous de 1 an.....	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	1 à 4 gouttes.
De 2 à 5 ans	4 à 8 gouttes.
De 5 à 10 ans	8 à 15 gouttes.

Exemple de formule :

Liqueur de Fowler.....
Tartrate ferrico-potassique .... } ââ 5 gr.

En gouttes.

(D. S. A)

Ou :

Liqueur de Fowler..... 1 gr.
Eau distillée..... 60 gr.
Sirop de fleurs d'oranger q. s. pour 120 cmc.

(Une cuillère à soupe contient environ 4 gouttes).

Arséniate de vanadium ou *Vanadarsine*

Aspect : Poudre cristalline jaune citron.

Saveur : Un peu amère.

Solubilité : Très soluble dans l'eau distillée.

Equivalence : 22 gouttes de soluté au 1/100 pèsent 1 gr.

Doses :

Jusqu'à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	1 à 5 gouttes.
De 2 à 5 ans.....	5 à 10 gouttes.
De 5 à 10 ans.	10 à 15 gouttes.

Exemple de formule :

Solution titrée de vanadarsine au centième, 10 gr.

(Par gouttes.)

Ou :

Vanadarsine..... 0 gr. 15
Sirop de menthe..... 30 gr.
Eau distillée..... q. s pour 130 cmc.

Arséniate de fer

Aspect : Poudre blanche amorphe.

Solubilité : Dans les citrates alcalins et les pyrophosphates. Insoluble dans l'eau.

Doses : Les mêmes que l'arséniate de soude.

Exemple de formule :

Arséniate de soude cristallisé...	0 gr. 32
Sulfate ferreux pur.....	0 gr. 28
Acide citrique.....	0 gr. 40
Eau distillée.....	10 gr.
Sirop de sucre	990 gr.

(Une cuillerée à café contient 1 milligr. dissous).

Cacodylate de soude

Aspect : Cristaux blancs.

Solubilité : Très soluble dans l'eau et l'alcool.

Doses : Comme le méthylarsinate.

Exemple de formule :

Cacodylate de soude.....	0 gr. 25
Rhum..... } Sirop de sucre..... }	ââ 30 gr.
Essence de menthe.....	0 gr. 10
Eau distillée.....	q. s. pour 90 cmc.

(Une cuillerée à entremets renferme 0 gr. 025).

Méthylarsinate de soude

Aspect : Aiguilles incolores, très fines.

Solubilité : Très soluble dans l'eau, précipité par l'alcool.

Doses :

Jusqu'à 2 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 03

Exemple de formule :

Méthylarsinate disodique.....	4 gr.
Eau distillée.....	100 gr.

(V gouttes représentent 1 centigramme.)

Asa-fœtida

S'emploie en poudre ou en teinture au 1/5e.

Poudre

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 20
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50
De 5 ans à 12 ans....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Pilules d'asa-fœtida de.....	0 gr. 05

Teinture d'asa-fœtida au 1/5e

Aspect : Liquide jaune rougeâtre.

Solubilité : Incomplète dans le sirop, précipite par l'eau.

Equivalence : 1gr. = 58 gouttes.

Doses :

Comme la poudre.

Exemple de formule :

Teinture d'asa-fœtida au 1/5....		2 gr.
Alcool.....	ââ	10 gr.
Glycérine.....		
Julep gommeux.....		40 gr.
Sirop d'éther.....	q. s. pour	90 cmc.

Asaprol

Aspect : Poudre blanc-rosé.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Saveur : Amère.

Incompatibilités : Antipyrine. Sulfate de quinine.

Doses :

De 1 à 10 ans : dose variable de 0.25 à 3 gr.

Exemple de formule :

Asaprol		4 gr.
Eau distillée.....		60 gr.
Sirop de groseilles...	q. s. pour	120 cmc.

Aspirine

Aspect : Aiguilles cristallines blanches.
Solubilité : Dans l'eau au 1/100e
Saveur : Légèrement acide.
Incompatibilités : Alcalins, bicarbonate de soude.

Doses :

De 2 à 6 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Aspirine ..... 0 gr. 25
Par cachet.

Aubépine (Cratœgus oxycantha)

Employer l'extrait fluide à parties égales, soluble dans le sirop, l'eau, la glycérine, l'alcool.
Equivalence : 1 gr. = 39 gouttes.

Doses :

II gouttes par année d'âge.

Aunée

Utiliser la poudre ou l'extrait aqueux.

Poudre

Doses :

de 0 à 15 mois	Abstention.
de 15 mois à 3 ans....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50
de 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Formuler des pilules de 0 gr. 05.

Extrait aqueux

Soluble dans l'eau, le sirop, la glycérine.
(Mêmes doses.)

Badiane

Utiliser la teinture de badiane au 1/5.
Aspect : Liquide jaune, odeur aromatique.
Equivalence : 1 gr. = 59 gouttes.
Solubilité : Seulement dans l'alcool, la glycérine.

Doses :

de 15 mois à 3 ans..	X à XXV gouttes
de 3 à 5 ans.....	XXV à XXXX gouttes
de 5 à 10 ans.....	XXXX gouttes à 1 gramme

Exemple de formule :

Teinture de badiane..... 1 gr.
— de Colombo ..... 1 gr.
— de noix vomique..... XX gouttes.
Alcool..... } âà 15 gr.
Glycérine ....}
Sirop simple.....q.s. pour 150 cmc.

Baume du Pérou

Aspect : Brun-foncé, arômatique, très âcre.
Solubilité : Dans l'alcool fort et le chloroforme.

Doses :

de 6 à 12 ans..... 0,20 à 0,40 cgr.

Exemple de formule :

Baume du Pérou..... 1 gr.
Mucilage de gomme.. (q.s. pour tenir en suspension).
Eau de cannelle ..... 60 gr.
Sirop de fleurs d'oranger, q. s. pr 120 cmc.

Ou :

Baume du Pérou..... 4 gr.
Vaseline..... } âà 20 gr.
Lanoline.....}

(En pommade, pour un usage externe)

Baume de Tolu

Employer la teinture de Tolu ou le sirop de Tolu.

Teinture de Tolu

Aspect : Liquide brun foncé.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, le sirop, la glycérine.

Saveur : Brûlante.

Equivalence : 1 gr.= 60 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	V à XV gouttes.
De 15 mois à 3 ans.....	XV à XXX gouttes.
De 3 à 6 ans.....	XXX gouttes à 1 gr.
De 6 à 12 ans.....	1 gr. à 1 gr. 50

Exemple de formule :

Teinture de Tolu.....	2 gr.
Eau-de-vie.....	10 gr.
Sirop de Coquelicot.....	60 gr.
Eau distillée ..... q. s. pour	120 cme.

Sirop de Tolu

Doses :

De 0 à 15 mois.....	5 à 15 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	15 à 30 gr.
De 3 à 6 ans.....	30 à 50 gr.
De 6 à 12 ans.....	50 à 80 gr.

Belladone

On emploie l'extrait alcoolique de feuilles, la teinture de feuilles au 1/10e, le sirop de belladone, l'atropine.

Extrait alcoolique de Belladone

Aspect : Extrait brun, à odeur vireuse.

Saveur : Vireuse.

Solubilité : Soluble dans l'alcool à 70°, incomplètement soluble dans le sirop, donne un soluté trouble avec l'eau.

Incompatibilités : Tannin et celles des alcaloïdes.

Equivalence : Environ 40 fois plus actif que la Teinture, à poids égal.

Doses :

Jusqu'à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 005 à 0 gr. 02
De 5 à 10 ans.....	0 02 à 0 gr. 05

Exemple de formule :

Extrait alcoolique de feuilles de Belladone.....	0 gr. 10
Glycérine.....	10 gr.
Sirop de Tolu.....	60 gr.
Sirop de fleurs d'oranger q. s. pr	100 cmc.

Teinture de feuilles de Belladone au 1/10.

Aspect : Liquide vert brunâtre.

Solubilité : Se trouble dans l'eau distillée.

Equivalence : 1 gr. = 56 gouttes.

Doses : de III à VI gouttes par année révolue.

De 0 à 15 mois.....	de 1 à 5 gouttes.
De 15 mois à 3 ans	de 5 à 10 gouttes.
De 3 à 5 ans.....	de 10 à 20 gouttes.
De 5 à 10 ans.....	de 20 à 30 gouttes.

Exemple de formule :

Teinture de feuilles de Belladone au 1/10.....	5 gr.
Eau de menthe	30 gr.
Sirop simple ..... q. s. pour	90 cmc.

Sirop de Belladone

Représente 1 gramme de teinture de feuilles au 1/10e dissous dans du sirop.

Doses : Un gramme par année d'âge :

De 0 à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	1 à 2 gr.
De 3 à 5 ans.....	3 à 7 gr.
De 5 à 10 ans.....	7 à 15 gr.

Exemple de formule :

Sirop de belladone.....
Sirop d'éther..... } ââ 20 gr.
Sirop de Tolu.....

Atropine

On emploie le sulfate neutre.

Aspect : Poudre amorphe blanche.

Solubilité : Très soluble dans l'eau et l'alcool à 90°.

Doses :

de 0 à 3 ans	Abstention.
de 3 à 5 ans.....	1/4 à 1/2 milligr.
de 5 à 10 ans.....	1/4 à 1 milligr.

Exemple de formule :

Sulfate neutre d'atropine.....	0 gr. 005
Eau distillée	60 gr.
Eau de laurier-cerise.....	5 gr.
Sirop de groseille.... q. s. pour	60 cme.

Benzoïque (Acide)

Aspect : Cristaux blanchâtres, brillants.

Solubilité : Peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et la glycérine.

Saveur : Brûlante.

Incompatibilités : les Benzoates, les sels de fer, de cuivre, d'argent.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	0 gr. 015 à 0 gr. 02
de 15 mois à 3 ans...	0 gr. 02 à 0 gr. 05
de 3 à 5 ans	0 gr. 05 à 0 gr. 10
de 5 à 10 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20

Exemple de formule :

Acide benzoïque		2 gr.
Alcool		10 gr.
Glycérine		20 gr.
Sirop de menthe	q. s. pour	90 cmc.

Benzoate de lithine

Aspect : Poudre blanche.

Saveur : Douceâtre, un peu sucrée.

Solubilité : Très soluble dans l'eau et l'alcool.

Doses :

de 3 à 5 ans	0 gr. 05 à 0 gr. 10
de 5 à 12 ans	0 gr. 10 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Benzoate de lithine Urotropine		ââ 0 gr. 20

Par cachet.

Ou :

Benzoate de lithine		1 gr.
Eau distillée		50 gr.
Sirop des cinq racines	q. s. pour	90 cmc.

Ou :

Granulé effervescent à 5 p. 100.

Benzoate de soude

Aspect : Poudre grenue, efflorescente.
Solubilité : Très soluble dans l'eau et l'alcool à 90°.
Saveur : Douceâtre, un peu sucrée.
Incompatibilités : Calomel.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
de 15 mois à 3 ans....	0 gr. 50 à 2 gr.
de 3 à 5 ans.....	2 gr. à 4 gr.
de 5 à 10 ans.....	4 gr. à 6 gr.

Exemple de formule :

Benzoate de soude	10 gr.
Eau distillée.....	60 gr.
Sirop de bourgeons de sapin q.s. p^r	120 cmc.

Ou :

Saccharolé à 5 p. 0/0.

(Une forte cuillerée à café contenant 0 gr. 20).

Benzo-naphtol

Aspect : Poudre blanche cristalline.
Solubilité : Nulle pratiquement.

Saveur : Nulle, pas d'odeur.

Incompatibilités : Acides.

Doses :

de 0 à 15 mois..... ..	0 gr. 05 à 0 gr. 50
de 15 mois à 3 ans...	0 gr. 50 à 1 gr.
de 3 à 5 ans.....	1 gr. à 1 gr. 50
de 5 à 10.....	1 gr. 50 à 3 gr.

Exemple de formule :

Benzo-naphtol..... ...	2 gr.
Benzoate de bismuth.....	1 à 3 gr.
Julep gommeux	100 cmc.

Betol

Aspect : Poudre cristalline blanche.

Solubilité : Nulle pratiquement.

Saveur : Nulle.

Incompatibilités : Acides.

Doses :

De 10 à 15 mois	0 gr. 05 à 0 gr. 25
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Betol.....	4 gr.
Julep gommeux.....	60 cmc.

(Agiter.)

Bismuth

On emploie le sous-nitrate et le salicylate.

Sous-nitrate de bismuth

Aspect : Poudre blanc nacré.

Solubilité : Nulle, mais dissocié par l'eau.

Saveur : Nulle.

Incompatibilités : Alcalis, iodures, tanins, borax, eau de chaux, gomme arabique, nitrate d'argent, sucre de lait, kermès, tartrates.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 20 à 1 gr.
De 15 mois à 2 ans...	1 gr. à 3 gr.
De 2 à 5 ans.....	3 gr. à 4 gr.
De 5 à 10 ans.....	4 gr. à 5 gr.

Exemple de formule :

Sous-nitrate de Bismuth..	2 à 6 gr.
Elixir parégorique	II à XXX gouttes
Sirop de ratanhia.....	5 à 20 gr.
Eau distillée.. q. s. pour	90 cmc.

Salicylate de bismuth

Aspect : Poudre blanche grisâtre.

Solubilité : Complètement insoluble, non dissocié par l'eau.

Saveur : Nulle.

Incompatibilités : Alcool, carbonate de chaux, glycérine, sirop (comme le sous-nitrate.)

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 50
De 15 mois à 2 ans...	0 gr. 50 à 1 gr.
De 2 à 5 ans.....	1 gr. à 2 gr.
De 5 à 10 ans.....	2 gr. à 3 gr.

Exemple de formule :

Salicylate de bismuth.....	4 gr.
Julep gommeux.....	q. s. pour 120 cmc.

Bistorte

Employer l'extrait aqueux ou le sirop.

Extrait aqueux

Aspect : Masse sèche, rouge brun.

Solubilité : Dans l'eau.

Saveur : Astringente, pas d'odeur.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
De 15 mois à 3 ans ..	0 gr. 15 à 0 gr. 30
De 3 à 6 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Extrait aqueux de Bistorte.....	2 gr.
Sirop simple.....	60 cmc.

Bleu de méthylène

Aspect : Poudre bleue.
Solubilité : Dans l'eau, l'alcool.
S'emploie pour usage externe.

Exemple de formule :

Bleu de méthylène.....	1 gr.
Alcool à 90°	10 gr.
Eau distillée.....	100 gr.

(Pour attouchements.)

Boldo

Employer la teinture au 1/5e ou le sirop.

Teinture au 1/5e

Aspect : Liquide jaune.
Saveur : Amère, odeur aromatique.

Solubilité : Dans alcool et glycérine.

Equivalence : 1 gr. = 58 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois....	V	à	XX gouttes.
De 15 mois à 3 ans	XX	à	XXXX gouttes.
De 3 à 6 ans.....	XXXX g.	à	1 gr.
De 6 à 12 ans.....	1	à	2 gr.

Exemple de formule :

Teinture de Boldo	4 gr.
Alcool	ââ 10 gr.
Glycérine.....	
Sirop de chiendent.....	40 gr.
Eau de tilleul. ..... q. s. pour	120 cmc.

Borate de soude

Aspect : Cristaux durs et incolores.

Solubilité : Dans l'eau et la glycérine.

Incompatibilités : Sels de magnésie, chaux, cuivre, mercure, alun, cocaïne, bicarbonate de soude, acide salicylique, chloral.

Saveur : Alcaline, désagréable.

Doses :

0 gr. 50 par année d'âge.

Exemple de formule :

Pastilles dosées à ..... 0 gr. 10

(S'emploie pour l'usage externe.)

Bouillons Lactiques

On emploie 2 sortes de bouillons lactiques :

I. L'un fait avec le bacille paralactique.

II. L'autre avec le bacille paralactique associé au bacille bifidus.

Ont l'aspect de bouillons de culture et le goût désagréable de viande pas fraîche.

Doses : de 1 cuillerée à soupe à un verre à Bordeaux après chacun des deux principaux repas.

Bouleau

Employer l'extrait fluide à parties égales soluble dans l'eau et le sirop.

Doses :

De 1 à 4 ans.....	1 gr. à 2 gr.
De 4 à 8 ans.....	2 gr. à 3 gr.
De 8 à 12 ans.....	3 gr. à 5 gr.

Exemple de formule :

Extrait fluide de bouleau.....		5 gr.
Sirop de bourgeons de sapin....		25 gr.
Eau de tilleul	q. s. pour	60 cmc.

Bourdaine

Employer l'extrait fluide.

Aspect : Liquide noir.

Solubilité : Dans le sirop.

Saveur : Amère, astringente.

Equivalence : 1 gr. = 38 gouttes.

Doses :

XX gouttes par année d'âge.

Exemple de formule :

Extrait fluide de Bourdaine.....		2 gr.
Sirop de séné.....		20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges	q. s. pour	60 cmc.

Bourrache

Employer l'extrait aqueux ou le sirop.

Doses :

0 gr. 20 d'extrait aqueux par année d'âge.

Exemple de formule :

Extrait aqueux de bourrache....	4 gr.
Sirop de Tolu.....	40 gr.
Infusion d'eucalyptus. q.s.pour	120 cmc.

Bromoforme

Aspect : Liquide incolore.

Solubilité : Dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, peu soluble dans l'eau au 1/250.

Saveur : Douce et âcre.

Incompatibilités : Alcalis.

Equivalence : 1 gr. = 37 gouttes.

Doses : La dose initiale doit être autant de fois IV gouttes que l'enfant a d'années.

Jusqu'à 3 mois.....	I goutte
de 3 à 6 mois.....	II gouttes
de 6 à 9 mois.....	III gouttes
de 9 à 12 mois.....	IV gouttes

Augmenter progressivement en surveillant sérieusement de 10 gouttes à 1 gr.

Exemple de formules :

Soluté officinal au 1/10e renfermant 60 gouttes au gramme (soit 6 gouttes de bromoforme) :

Bromoforme	5 gr.
Glycérine	15 gr.
Alcool à 90°	30 gr.

Ou :

Soluté de Bromoforme	5 gr.
Sirop de coquelicots	50 gr.
Sirop de fleurs d'oranger q. s. pour	100 cmc.

On peut utiliser l'eau Bromoformée au 1/250.

Bromure de Potassium

Aspect : Cristaux incolores.

Solubilité : Dans l'eau, la glycérine.

Saveur : Sucrée et piquante.

Incompatibilités : Sels de plomb, mercure, argent, acides, sels acides, bromures métalliques, morphine.

Doses :

de 0 à 3 mois	0 gr. 05 à 0 gr. 10
de 3 à 6 mois	0 gr. 10 à 0 gr. 20
de 6 mois à 3 ans	0 gr. 30 à 0 gr. 40
de 3 à 5 ans	0 gr. 40 à 2 gr.
de 5 à 10 ans	1 gr. à 4 gr.

Exemple de formule :

Bromure de potassium	10 gr.
Glycérine	20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges q s.pour	100 cmc.

Bromure de sodium, d'ammonium, de strontium

Comme pour le bromure de potassium. Souvent réunis dans un élixir polybromuré :

Bromure de potassium.	80 gr.
— sodium.....	40 gr.
— ammonium.....	20 gr.
Alcool à 90°.....	140 gr.
Teinture de gentiane.....	5 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères	200 gr.
Infusion de follicules de Séné...	q. s. p. 1 litre.

(Une cuillerée à soupe contient 2 gr.)

Bromure de fer

S'emploie à l'état de solution qui fait un liquide vert. On le met en pilules de 0 gr. 05 (3 à 4 par jour).

Bromure de camphre

Aspect : Cristaux incolores.

Solubilité : Soluble dans l'alcool, insoluble dans l'eau.

Saveur : De l'essence de térébenthine.

Doses :

de 0 à 15 mois.	Abstention
de 15 mois à 3 ans...	0 gr. 15 à 0 gr. 30
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50
de 5 à 10 ans	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Bromure de camphre, 0 gr. 05

(Par pilule).

Bromidia

Aspect : Solution noire.

Saveur : Amère.

Doses : De 5 à 12 ans, de XV gouttes à 1 cuillerée à café au maximum.

Composition :

Bromure de potassium.....	10 gr.
Hydrate de chloral.....	10 gr.
Extrait de chanvre indien.....	0 gr. 10

Glycyrrhizinc		0 gr. 50
Extrait de jusquiame.		0 gr. 10
Alcool à 60°.		2 gr.
Eau distillée	q. s pour	50 cmc.

(Une cuillerée à café contient environ 1 gr. de chloral et de bromure, 0,01 cgr. d'extrait de jusquiame et de chanvre indien).

Cachou

Utiliser la poudre, la teinture au 1/5.

Poudre :

Saveur : Astringente.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 05 à 0 gr. 10
De 15 mois à 3 ans.....	0 10 à 0 gr. 15
De 3 ans à 5 ans.....	0 15 à 0 gr. 20
De 5 ans à 12 ans.....	0 20 à 0 gr. 50

Formuler en pastilles de 0 gr. 10.

Teinture au 1/5e

Aspect : Liquide brun rouge foncé.
Saveur : Astringente. Pas d'odeur.
Solubilité : Dans l'eau et les sirops.
Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses : Comme la poudre.

Exemple de formule :

Teinture de cachou — Colombo	ââ 5 gr.
Sous-nitrate de bismuth Benzonaphtol	ââ 1 gr.
Sirop de coings	40 gr.
Julep gommeux q. s. pour	90 cmc.

Cactus grandiflora

Employer la teinture au 1/5, soluble dans le sirop.

Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses : X gouttes par année d'âge.

Exemple de formule :

Teinture de cactus au 1/5	2 gr.
Sirop d'écorces d'oranges	60 cmc.

Caféine

Aspect : Aiguilles soyeuses.

Solubilité : Peu soluble dans l'eau et l'alcool.

Saveur : Amère.

Incompatibilités : Iode, borax. Sirop d'iodure de fer. Tanin.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 15 à 0 gr. 20
De 3 ans à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 5 ans à 10 ans... .	0 gr. 30 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Caféine.....	2 gr.
Benzoate de soude.....	3 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	20 cmc.

Ou :

Caféine.....	4 gr.
Salicylate de soude.....	3 gr.
Eau distillée et stérilisée.....	20 cmc.

En injections hypodermiques.

Ou :

Caféine..... Benzoate de soude	ââ 0 gr. 50
Eau	60 gr.
Sirop de fleurs d'oranger q s. p^{r}	120 cmc.

Citrate de caféine

Aspect : Sel blanc peu stable.

Doses :

De 1 à 4 ans	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 4 à 12 ans	0 gr. 10 à 0 gr. 25

Exemple de formules :

Citrate de caféine.....	1 gr.
Rhum	10 gr.
Eau distillée.....	30 gr.
Sirop simple..... q. s. pour	120 cmc.

Ou :

Citrate de caféine.....	0 gr. 75
Chlorure de sodium.....	2 gr. 10
Eau stérilisée	300 gr.

Pour injections hypodermiques de 20 cmc. (Marfan).

Calomel

Aspect : Poudre blanche.

Solubilité : Insoluble dans l'eau et l'alcool.

Saveur : Insipide et inodore.

Incompatibilités : Alcalis, iodures, eau de laurier-cerise, iodure de potassium, bromure de potassium, les chlorures, les alcalis.

Doses : Comme purgatif :

De 0 à 6 mois.....	Abstention.
De 6 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50

Comme antiseptique intestinal :

De 0 à 6 mois.....	Abstention.	
De 6 à 15 mois.....	0 gr. 005.	(de 3 à 5 fois.)
De 15 mois à 3 ans.	0 gr. 01..	(de 4 à 5 fois.)
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 02..	
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 03...	(de 5 à 6 fois.)

Exemple de formules :

Calomel.....	0 gr. 05
Suere de lait.....	0 gr. 50

Par paquet.

Ou :

Calomel.....	0 gr. 10
Looch huileux.....	60 gr.

Camphre

Aspect : Corps solide cristallisé.

Solubilité : Huile, alcool, éther.

Saveur : Un peu brûlante, odeur forte.

Incompatibilités : Musc, gommes, résines, salol, chloral, naphtol.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 005 à 0 gr. 01
De 15 mois à 3 ans..	0 gr. 01 à 0 gr. 05
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15

Exemple de formules :

Camphre..... 1 gr.
Huile d'olives stérilisée..... 10 gr.

Pour injections hypodermiques.

Ou :

Acide benzoïque.....
Camphre pulvérisé..... } ââ 0 gr. 10
Poudre de sucre ..... 1 gr.

A diviser en 10 paquets (Marfan).

Calamus

Employer le sirop ou la teinture au 1/5, qui est soluble dans les sirops.

Doses :

0 gr. 20 par année d'âge.

Camomille

Employer le sirop ou l'extrait aqueux miscible à l'eau, au sirop, à l'alcool, à la glycérine.

Doses :

0 gr. 20 par année d'âge.

Cannelle

Employer la teinture au 1/5e ou l'eau de Cannelle.

Teinture de cannelle

Aspect : Liquide brun rouge.
Saveur : Arômatique et brûlante.
Equivalence : 1 gr. = 57 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 50	à 1 gr.
De 15 mois à 3 ans...	1 gr.	à 2 gr.
De 3 à 5 ans.....	2 gr.	à 4 gr.
De 5 à 12 ans.....	4 gr.	à 5 gr.

Exemple de formule :

Teinture de cannelle.....	5 gr.
Extrait de quinquina.....	2 gr.
Alcool..... }	
Glycérine..... }	aâ 10 gr.
Sirop de gomme.... q. s. pour	90 cmc.

Eau de cannelle

Aspect : Liquide opalescent qui devient ensuite limpide. Titrée au 1/10e.
Dose : Ad libitum.

Capillaire

On emploie le sirop (5 gr. par année d'âge).

Sirop de capillaire.....
Sirop de Tolu..... } ââ 40 gr.
Sirop de Desessartz.....

(D. S. A.)

Cardamome

Employer la teinture au 1/5e, soluble dans le sirop ou l'eau.

Dose :

0 gr. 50 par année d'âge.

Cascara sagrada

Utiliser la poudre, l'extrait hydro-alcoolique, la teinture, le sirop.

Poudre

Doses :

De 0 à 15 mois..... Abstention.

De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 3 à 5 ans	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50

En pilules de 0 gr. 05 ou en cachets.

Extrait hydro-alcoolique

Aspect : Masse noire.

Solubilité : Dans l'eau et le sirop.

Doses :

De 2 à 10 ans ..... de 0 gr. 02 à 0 gr. 05

Exemple de formule :

Extrait de cascara.....	2 gr.
Glycérine.....	5 gr.
Alcoolat d'oranges.....	20 gr.
Sirop de sucre.....	40 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	100 cmc.

Teinture d'écorce au 1/5e

Aspect : Liquide brunâtre.

Saveur : Amère.

Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

de 2 à 10 ans..... V à XXV gouttes.

Exemple de formule :

Teinture de cascara	ââ 15 gr.
— rhubarbe	
Teinture de badiane.....	5 gr.

(En gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau)
(D. S. A.)

Sirop de cascara

Dosé à 0 gr. 25 de Teinture par cuillerée à café.

Cascarille

Utiliser le sirop ou la Teinture au 1/5e
Soluble dans le sirop.
Equivalence : 1 gr. = 59 gouttes.

Dose :

0 gr. 20 par année d'âge, soit XII gouttes.

Casse (Pulpe de)

Dose :

5 gr. par année d'âge.

L'additionner de sucre et de gelée de pommes.

Cassis

Employer l'energetène de cassis.

Doses :

de 3 à 6 ans..... 1 cuillerée à café
de 6 à 12 ans..... 1 à 2 cuillerées à café.

(à prendre avec de l'eau sucrée).

Centaurée

Employer le sirop de petite centaurée, ou la teinture au 1/5e soluble dans le sirop.

Teinture de petite centaurée au 1/5 5 gr.
Sirop de coquelicot..... 60 cmc.

Chanvre indien

Utiliser la teinture alcoolique au 1/5e
Solubilité : Dans le sirop, insoluble dans l'eau.
Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

de 0 à 3 ans.....	Abstention
de 3 à 5 ans.....	X à XV gouttes
de 5 à 10 ans	XV à XXXX gouttes

Exemple de formule :

Teinture de cannabis indica au 1/5		1 gr.
Alcool.....	âà	10 gr.
Glycérine.....		
Sirop de sucre.....		40 gr.
Eau de tilleul.....q.s. pour		90 cmc.

Charbon de peuplier

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 25 à 1 gr.
De 15 mois à 3 ans...	1 gr. à 2 gr.
De 3 à 5 ans.....	2 gr. à 3 gr.
De 5 à 12 ans.....	3 gr. à 5 gr.

A donner en pastilles de 0 gr. 10 associées ou non au benzo-naphtol.

Chardon-bénit

Utiliser le sirop ou l'extrait aqueux soluble dans l'eau et le sirop.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge.

Chaux

Les préparations employées sont l'eau de chaux et le chlorure de chaux.

Eau de chaux

Incompatibilités : Tous les acides et la plupart des sels.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	5 gr. à 15 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	15 gr. à 25 gr.
De 3 à 5 ans.....	25 gr. à 30 gr.
De 5 à 10 ans.....	30 gr. à 60 gr.

Exemple de formule :

Eau de chaux.....	60 gr.
Elixir parégorique	V gouttes.
Sirop de ratanhia.....	30 gr.
Sirop de fleurs d'oranger q. s. p^r	120 cmc.

Chlorure de calcium

Aspect : Cristaux déliquescents.

Solubilité : Dans l'eau et l'alcool.

Saveur : Chaude, salée.

Incompatibilités : Acides borique, sulfurique, oxalique, sulfates, alcalis, carbonates alcalins.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 20
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 20 à 0 gr. 40
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 80
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 80 à 1 gr. 50

Exemple de formule :

Chlorure de calcium.....	2 gr.
Eau de tilleul	60 gr.
Sirop d'écorces d'oranges q s. p^{r}	120 cmc.

Chicorée sauvage

Employer l'extrait aqueux, soluble dans le sirop, à la dose de 0 gr. 10 à 0 gr. 20 par année d'âge ; ou le sirop de chicorée composé (codex) à la dose de 8 à 40 gr. (de 2 à 10 ans).

Chiendent

Employer le sirop (5 gr. par année d'âge).

Sirop de chiendent..... }	ââ 20 gr.
Sirop des cinq racines..... }	
Nitrate de potasse.....	2 gr.
Eau de cannelle, q. s. pour.....	90 cmc.

Chloral (Hydrate de)

Aspect : Cristaux ressemblant à du sucre.

Solubilité : Dans l'eau, l'alcool, les huiles.

Saveur : Amère et brûlante.

Incompatibilités : Alcalis, antipyrine, glucose, matières albuminoïdes, carbonates alcalins.

Doses :

De 0 à 6 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 20
De 6 mois à 1 an.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 1 à 2 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 60
De 2 à 6 ans.....	0 gr. 60 à 1 gr.
De 6 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemples de formules :

Sirop de chloral au 1/20 (Codex) (la cuillerée à dessert contient 0 gr. 50, à café 0 gr. 33, à soupe 1 gr.)

Ou :

Hydrate de chloral.....	0 gr. 50
Eau de tilleul.....	80 gr.
Sirop de fleurs d'oranger q. s. p^r	120 cmc.

Ou en lavement :

Chloral.....	5 gr.
Eau	50 gr.

Mettre q. s. (suivant la dose) dans un verre de lait additionné d'un jaune d'œuf.

Chlorate de potasse

Aspect : Cristaux incolores, lamelleux.

Saveur : Fraîche et styptique.

Solubilité : Dans l'eau au 1/20 et la glycérine.

Incompatibilités : Acide phénique, salicylique, salol, thymol, benzoate de soude, sucres, amidons, soufre, charbon, hypophosphite de chaux, sels ferreux, nitrates, substances organiques, crême de tartre, magnésie.

Parmi ces incompatibilités, il en est quelques-unes (charbon, sucre, amidon, matières organiques) qui ne sont pas absolues. Le mélange de sucre et de chlorate peut se faire en évitant les chocs trop brusques au mortier, et on peut opérer avec le chlorate de potasse tout pulvérisé.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 25
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Chlorate de potasse.....	2 gr.
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop de mûres.....	q. s. pour 120 cmc.

Ou :

Chlorate de potasse.....		2 gr.
Sirop de framboises.....	ââ	40 gr.
Julep gommeux.....		
Eau distillée.....	q. s pour	120 cmc.

Chlorethone

Aspect : Poudre blanche, cristalline.

Solubilité. Alcool, éther, faible dans la glycérine ou les huiles (au 1/10.)

Doses :

de 5 à 12 ans..... 0 gr. 10 à 0 gr. 20

En capsules ou en cachets.

Exemple de formule : (pour usage externe)

Chlorethone.....	0 gr. 50
Camphre.....	1 gr. 25
Menthol.....	1 gr. 25
Essence de cannelle.....	0 gr. 25
Paraffine liquide.....q.s. pour	50 cmc.

(En vaporisations nasales).

Chloroforme

Aspect : Liquide mobile.

Solubilité : Très soluble dans l'huile, l'alcool, l'éther, insoluble dans la glycérine. Il dissout le soufre, le phosphore, l'iode, les résines, les corps gras, les alcaloïdes.

Saveur : Brûlante et sucrée, odeur éthérée.

Incompatibilités : Alcalis.

Equivalence : 56 gouttes pèsent 1 gr.

Eau chloroformée

Elle existe à saturation environ 9 pour 1000. Le Codex inscrit l'eau chloroformée à 5 pour 1000.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	1 à 3 gr.
de 15 mois à 3 ans.....	3 à 5 gr.
de 3 à 5 ans.....	5 à 20 gr.
de 5 à 10 ans.....	20 à 40 gr.

Exemples de formules :

Eau chloroformée.....	60 gr.
Eau de menthe	5 gr.
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop simple..... q. s pour	120 cmc.

Ou :

Eau chloroformée saturée..... }	aâ 40 gr.
Eau bromoformée saturée ..... }	

Sirop de Desessartz .....
Sirop de Tolu ..... } ââ 50 gr.
Sirop de codéïne .... q. s. pour 200 cmc.

Chlorure de zinc

Aspect : Masse blanche.

Solubilité : Deliquescent, très soluble dans l'eau acidulée et l'alcool

S'emploie seulement pour usage externe comme caustique ou en injections sclerogènes.

Exemple de formule :

Chlorure de zinc..... 1 gr.
Eau distillée ..... 20 gr.

(Injecter II ou III gouttes dans les tissus fongueux.)

Citrophène

Aspect : Poudre blanche cristallisée.

Saveur : Acide.

Solubilité : Faible dans l'alcool, la glycérine.

Doses :

0 gr. 10 par année d'âge à partir de 3 ans.

Coca

Utiliser l'extrait fluide à parties égales et la teinture au 1/5.

Extrait fluide à parties égales

Aspect : Liquide vert.

Solubilité : Précipite avec l'eau et le sirop.

Incompatibilités : Tannin, eau de chaux, iode, carbonates alcalins.

Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

0 gr. 10 à 0 gr. 20 par année d'âge.

Exemple de formule :

Extrait de coca		5 gr.
Alcool.....		30 gr.
Malaga blanc..... ...		40 gr.
Sirop de sucre	q. s. pour	100 cmc.

Teinture de feuilles de coca

Aspect : Liquide vert foncé.

Solubilité : Dans le sirop.

Saveur : Amère, odeur aromatique.

Equivalence : 1 gr. = 55 gouttes.

Doses :

De 3 à 6 mois..	V	à	XXX gouttes.
De 6 à 15 mois.	XXX gout.	à	1 gr.
De 15 m. à 3 ans	1 gr.	à	1 gr. 50
De 3 à 5 ans....	1 gr. 50	à	2 gr.
De 5 à 12 ans...	2 gr.	à	5 gr.

Exemple de formule :

Teinture de coca.....
— vanille ..... } ââ 4 gr.
— cascarille.....
Sirop de gomme..... 90 cmc.

Cocaïne

On emploie le *chlorhydrate de cocaïne.*

Aspect : Paillettes blanches et brillantes.

Solubilité : Très soluble dans l'eau (soluté incolore) moins dans l'alcool.

Saveur : Piquante. Inodore.

Incompatibilités : Ammoniaque, alcalis, chlorure d'or, calomel, nitrate d'argent, borax, permanganate de potasse.

Doses : Abstention le plus possible.

de 0,001 mgr. à 0,002 mgr. par année d'âge.

Exemple de formules :

Chlorhydrate de cocaïne.....	0,10 cgr.
Eau distillée bouillie et refroidie	10 cmc.

(Pour injections hypodermiques).

Ou :

Chlorhydrate de cocaïne	0,10 cgr.
Sucre blanc pulvérisé.....	98 gr. 9
Mucilage de gomme adragante..	10 gr.
Vanilline.....	0,025

(Pour faire des tablettes de 1 gr. contenant 1 mgr. de cocaïne).

Entre dans la composition d'une poudre contre le coryza inscrite au Codex.

Cochléaria

Utiliser l'alcoolat composé, 0 gr. 10 par année d'âge.

Alcoolat de cochléaria.....	5 gr.
Sirop simple.....	10 gr.
Eau aromatique..... q. s pour	40 cmc.

Coings

Employer le sirop.

Sirop de coings.....	30 gr.
Extrait de kola.....	1 gr.
Infusion de sauge... q. s. pour	90 cmc.

(A prendre dans la journée).

Colchique

Utiliser la teinture de semences au 1/10 ou l'energetène.

Aspect : Liquide jaune, amer.

Solubilité : Précipite par addition d'eau.

Equivalence : 1 gr. = 57 gouttes.

Doses :

de 0 à 5 ans..	Abstention.
de 5 à 12 ans.....	X à XXV gouttes

Exemple de formule :

Teinture de semences de colchique au 1/10.....	1 gr.
Oxymel scillitique.....	60 cmc.

(L'energetène se donne à doses moindres que la Teinture).

Collargol

Aspect : Grains noirs à reflets métalliques.

Solubilité : Dans l'eau froide.

Saveur : Métallique. Inodore.

Incompatibilités : Les acides, les sels, les substances tanniques, la chaleur.

Doses :

De 0.05 à 0.20 cgr.

Exemple de formules :

I.

Collargol.....	15 gr.
Lanoline.....	35 gr.
Axonge benzoïnée.....	50 gr.

(Pour frictions, gros comme une noisette.)

La lanoline est favorable à la trituration du collargol parce qu'il faut délayer d'abord celui-ci dans un peu d'eau et que la lanoline absorbe l'eau beaucoup mieux que la vaseline ou l'axonge.

II

Collargol.....	0 gr. 50
Eau distillée stérilisée.....	50 cmc.

(Pour injections intra-veineuses ou sous-cutanées.)

III

Collargol.....	0.01 cgr.
Sucre de lait.....	0.05 cgr.
Glycérine et eau.....	q. s.

(Par pilules 2 à 4 par jour.)

Colombo

Utiliser l'extrait fluide à parties égales ou la teinture au 1/5.

Extrait fluide à parties égales

A donner avec du sirop à la dose de 0 gr. 02 à 0 gr. 40.

Teinture de Colombo

Aspect : Liquide brun verdâtre.
Solubilité : Dans l'eau et le sirop.
Saveur : Très amère.
Equivalence : 1 gr. = 52 gouttes.

Doses :

de 2 à 5 ans ...	XX à XXXX gouttes.
de 5 à 12 ans...	XXXX gouttes à 2 gr.

Exemple de formule :

Teinture de Colombo.....	ââ 5 gr.
Citrate de fer ammoniacal	
Sirop d'écorces d'oranges amères	00 emc.

Condurango

Utiliser l'extrait fluide.

Aspect : Liquide brun.

Solubilité : Dans la glycérine.

Saveur : Très amer.

Equivalence : 1 gr. = 55 gouttes.

Incompatibilités : Tannin, Alcalis, Eau de chaux, Antipyrine, Pepsine.

Doses :

V gouttes par année d'âge.

Exemple de formule :

Extrait fluide de Condurango....	1 gr.
Glycérine.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères	20 gr.
Eau distillée.....q.s. pour	100 cmc.

Grande Consoude

Utiliser le sirop (10 gr. par année d'âge).

Coquelicot

Utiliser le sirop.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	5 gr.
de 15 mois à 3 ans.....	10 gr.
de 3 à 5 ans.....	20 gr.
de 5 à 12 ans	30 gr.

Exemple de formule :

Sirop de coquelicot.....
Sirop de grande consoude..... } aâ 40 gr.
Infusion de capillaire..q.s. pour 120 cmc.

Coriandre

Employer la teinture au 1/5, soluble dans le sirop.

Doses :

De 0 à 15 mois....	V à X gouttes.
De 15 m. à 3 ans..	X à XX gouttes.
De 3 à 5 ans	XX à XXX gouttes.
De 5 à 12 ans.....	XXX à XL gouttes.

Créosote

Aspect : Liquide oléagineux, incolore.

Solubilité : Dans l'alcool.

Saveur : Caustique.

Incompatibilités : Eau albumineuse.

Equivalence : XLIII gouttes = 1 gr.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 15 à 0 gr. 25
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

I

Huile de foie morue eréosotée au 1/100e.

II

Créosote pure de hêtre. ..... 5 gr.
Glycérine pure..... 80 gr.
Extrait fluide de gentiane.....
Extrait fluide de café..... } aâ 40 gr.
Sirop simple..... 835 gr.

(Une cuillerée à soupe contient environ 0,10 de créosote.)

III

Créosote pure de hêtre..... 1 gr. 80
Codeïne..... 0 gr. 09
Teinture de racines d'aconit..... XXXV gouttes.
Sirop de lactophosphate de chaux
q. s. pour 90 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0.30 de créosote, VI d'aconit. 0 gr. 015 de codéïne.)

Carbonate de créosote (Créosotal)

Aspect : Substance mielleuse.

Solubilité : Dans l'huile ou l'alcool, non soluble dans l'eau et la glycérine.

Saveur : Pas de saveur caustique.

Doses : Doubles de celles de la créosote.

Exemple de formule :

Carbonate de créosote.....	5 gr.
Looch huileux du codex.....	400 gr.

Phosphite de créosote (Phosphotal)

Aspect : Liquide épais, jaune rougeâtre.

Solubilité : Dans l'alcool, le chloroforme, les huiles, très peu dans l'eau.

Saveur : Chaude.

Doses : Comme la créosote.

Exemple de formule :

Phosphite de créosote.....	2 gr.
Looch huileux.....	200 gr.

Tannate de créosote (Créosal)

Aspect : Poudre brune, amorphe.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, l'alcool, la glycérine.

Saveur : Astringente comme du goudron.
Incompatibilités : Alcalis.
Doses : Double de la créosote.

Exemple de formule :

Créosal.....		10 gr.
Eau de tilleul.....		20 gr.
Sirop de Tolu.....	q. s. pour	120 cmc.

Cresson

Utiliser le sirop (10 gr. par année d'âge).

Cryogenine

Aspect : Poudre cristalline blanche.
Solubilité : Dans l'alcool ou la glycérine.
Saveur : Nulle, odeur nulle.

Doses :

de 15 mois à 3 ans...	0 gr. 15 à 0 gr. 25
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 40
de 5 à 15 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 75

Exemple de formule :

Cryogénine.....	2 gr.
Elixir de Garus	40 gr.
Julep gommeux.....q.s. pour	120 cmc.

Dermatol (Sous gallate de Bismuth)

Aspect : Poudre jaune verdâtre.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, l'alcool, les acides dilués.

Saveur : Nulle, odeur nulle.

Doses :

de 3 à 6 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
de 6 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Dermatol.....	2 gr.
Julep gommeux.....	90 cmc.

Le dermatol s'emploie pour l'usage externe en poudre ou en pommades.

Digitale

On emploie :

La macération ou l'infusion de poudre de feuilles.

L'extrait alcoolique de Digitale.
La teinture de Digitale.
La digitaline cristallisée.
L'Energetène de Digitale.

Poudre de feuilles de Digitale

S'emploie en macération ou en infusion.

Incompatibilités : Astringents, sels métalliques, tannin, quinquina, ratanhia, iodure de potassium.

Doses :

de 6 à 15 mois.....	0 gr. 01 à 0 gr. 05
de 15 mois à 3 ans....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
de 5 à 10 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30

Extrait alcoolique (Codex)

Aspect : Extrait de couleur brun verdâtre.
Solubilité : Dans l'alcool à 70°, la glycérine, insoluble dans le sirop.
Saveur : Très amer, odeur forte.
Incompatibilités : (Comme la poudre).

Doses :

au-dessous de 3 ans...	0 gr. 01 à 0 gr. 02
jusqu'à 5 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 05
jusqu'à 8 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 08

Exemple de formule :

Extrait alcoolique de digitale....		0 gr. 05
Glycérine.....		10 gr.
Julep gommeux.....	q. s. pour	60 cmc.

Teinture de Digitale au 1/10

Aspect : Liquide couleur jaune verdâtre.
Solubilité : Se trouble par addition d'eau distillée.
Saveur : Très amère.
Equivalence : 1 gr. = 58 gouttes.

Doses :

de 6 à 15 mois.. ..	II à VI gouttes.
de 15 mois à 3 ans.	VI à XX gouttes
de 3 à 5 ans.....	XX à XXX gouttes
de 5 à 10 ans.....	XXX à XXXX gouttes

Exemple de formule :

Teinture de Digitale.....	2 gr.
Sirop simple.....	120 cmc.

Energetène de Digitale

Doses : Comme la Teinture ou un peu moins.
(A donner dans de l'eau sucrée.)

Digitaline cristallisée (au millième)

Aspect : Existe en solution.
Solubilité : Alcool, chloroforme.

Equivalence : 1 milligramme = L gouttes.

Doses :

Jusqu'à 1 an	1 goutte.
De 1 à 3 ans.....	II à V gouttes.
De 3 à 5 ans.....	V à VIII gouttes.
De 5 à 10 ans.....	VIII à XII gouttes

(2 ou 3 jours de suite seulement).

Exemple de formule :

Solution alcoolique de digitaline cristallisée au millième	XX gouttes.
Eau distillée.....	30 gr.
Sirop simple ..... q. s. pour	60 cmc.

Douce-amère

Utiliser l'extrait.

Aspect : Masse brun-rouge.

Solubilité : Dans l'eau.

Saveur : Douce-amère.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 20 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Drosera rotundifolia

Employer la teinture de plantes sèches au 1/5, ou la téinture de plante fraîche (Lesure).

Teinture de plantes sèches

Aspect : Liquide jaune verdâtre.
Solubilité : Dans le sirop, insoluble dans l'eau.
Equivalence : 1 gr. = 58 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.	XX gout. à XXXX gouttes.
De 3 à 5 ans.....	XXXX gout. à 1 gr.
De 5 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Teinture de Drosera au 1/5.....	1 gr.
Teinture de Belladone au 1/10...	1 gr.
Sirop d'éther.....	20 gr.
Sirop de coquelicot.....	40 gr.
Eau de laitue.....	q. s. pour 120 cme.

Teinture de plantes fraîches

Beaucoup plus active.(XX gouttes pour un enfant de 1 an en 3 fois par jour, après les repas, dans un peu d'eau sucrée. Augmenter la dose quotidienne de V gouttes par année de l'enfant.)

Eau oxygénée

On emploie la solution à 12 volumes pour usage externe seulement. La diluer dans 5 ou 6 parties d'eau.

Emplâtres

Sont inscrits au Codex, les emplâtres suivants :

Emplâtre brun à base de litharge (onguent de la mère Thècle).
Emplâtre de cantharide.
Emplâtre caoutchouté simple.
Emplâtre diachylom.
Emplâtre d'extrait de Belladone.
Emplâtre d'extrait de ciguë.
Emplâtre d'extrait d'opium.
Emplâtre Mercuriel (de Vigo).
Emplâtre de poix de Bourgogne.
Emplâtre simple (à base de litharge).
Emplâtre vésicatoire.

Les emplâtres caoutchoutés se font commercialement à tous médicaments. Les plus connus sont ceux de Rogé-Cavailhes et de Vigier.

On les fait à :

L'acide salicylique,
L'aristol,
L'huile de cède,
L'ichthyol,
L'oxyde de zinc,
Au minium et cinabre (emplâtre rouge de Vidal),
A la resorcine,
A l'acide borique, etc.

Entérokinase (ou Eukinase)

Ce ferment intestinal s'emploie en capsules, en granulés, en comprimés, en cachets.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge.

Ergot de seigle

On emploie :

La poudre d'ergot de seigle, l'extrait fluide, l'extrait aqueux ou ergotine.

Poudre d'ergot de seigle

Incompatibilités : Tannin, rhubarbe.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 20
de 15 mois à 3 ans...	0 gr. 20 à 0 gr. 40
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 80
de 5 à 10 ans.....	0 gr. 80 à 1 gr. 50

Exemple de formule :

Poudre d'ergot de seigle ..... 0 gr. 05

Par pilule.

Extrait aqueux d'ergot de seigle ou Ergotine

Aspect : Brun rouge.
Solubilité : Dans l'eau, l'alcool à 60°, le sirop.
Saveur : Amère, odeur de viande rôtie.
Incompatibilités : Comme la poudre.

Doses :

de 0 à 15 mois	0 gr. 03 à 0 gr. 10
de 15 mois à 3 ans...	0 gr. 10 à 0 gr. 50
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
de 5 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemples de formules :

Ergotine.....	2 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Sirop simple..... q. s. pour	80 cmc.

Ou :

Ergotine		0 gr. 50
Sirop de ratanhia	ââ	20 gr.
Glycérine	ââ	20 gr.
Eau de mélisse	q. s. pour	80 cmc.

Extrait fluide

(Titre son poids d'ergot).

Aspect : Liquide brun rougeâtre.

Solubilité : Miscible à l'eau.

Saveur : Acre, odeur d'eau de laurier-cerise.

Doses :

De 1/4 à 1 ou 2 eme selon l'âge (en injections) ou à l'intérieur mêmes doses que l'extrait aqueux.

Exemple de formule :

S'emploie en injections sous-cutanées, soit pur, soit mélangé à l'eau distillée.

Extrait fluide d'ergot de seigle ..	2 cmc.
Eau distillée	4 cmc.

(Pour injections hypodermiques.)

L'ergotine Yvon est de l'extrait fluide.

Eserine

On emploie le sulfate d'eserine, sel très déliquescent, en collyre, au-dessus de 6 ans seulement :

Sulfate d'eserine.....	0 gr. 10
Eau distillée.....	20 gr.

(Très toxique.)

Espèces pectorales

Employer le sirop pectoral dont 20 gr. contiennent 0 gr. 002 d'extrait d'opium.

Ether sulfurique

Aspect : Liquide incolore.

Solubilité : Dans l'eau (au 1/10e) l'alcool.

Saveur : Brûlante, odeur suave et pénétrante. (Dissout le camphre, le S., Ph , I., l'iodoforme, les huiles, le sublimé, la cire, les alcaloïdes.)

Incompatibilités : Pas d'incompatibilités remar-

quables, mais maintenir loin de toute flamme et dans des flacons bouchés au liège.

Equivalence : XC gouttes pèsent 1 gr.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	I à III gouttes.
De 15 mois à 3 ans.....	III à X gouttes.
De 3 à 5 ans.....	X à XV gouttes
De 5 à 10 ans.....	XV à XX gouttes.

Exemples de formules :

Ether sulfurique.....	2 gr.
Eau de tilleul.....	40 gr.
Sirop de fleurs d'oranger q. s. pr	60 cme.

Ou sous forme de liqueur d'Hoffmann qui représente parties égales d'alcool et d'éther, et dont LXXII gouttes pèsent 1 gr. (Se donne à la dose de 0 gr. 50 à 1 gr. par année d'âge.)

Liqueur d'Hoffmann.....	4 gr.
Eau de mélisse.....	40 gr.
Sirop de menthe..... q. s. pour	60 cme.

Le sirop d'éther renferme 2 0/0 d'éther soit 0 gr. 40 par cuillerée à soupe, se donne aux doses suivantes :

De 0 à 15 mois	5 gr. à 10 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	10 gr. à 15 gr.
De 3 à 5 ans.....	15 gr. à 20 gr.
De 5 à 10 ans.....	20 gr. à 30 gr.

Exemple de formule :

Acétate d'ammoniaque ..... } ââ 10 gr.
Teinture de cannelle..... }
Sirop d'éther..... ..... } ââ 40 gr.
Cognac..... }
Eau de mélisse..... q. s. pour 120 cmc.

Ou :

Sirop d'éther..... 20 gr.
Sirop de fleurs d'oranger..... 40 gr.
Eau de mélisse, q s. pour..... 90 cmc.

Eucalyptus

On emploie l'infusion de feuilles, la teinture.

Infusion de feuilles

De 0 gr. 50 à 3 gr. selon l'âge.

Teinture d'eucalyptus

Aspect : Teinture brun verdâtre.

Solubilité : Insoluble dans le sirop, soluble dans la glycérine.

Saveur : Amère, odeur prononcée.

Equivalence : 58 gouttes = 1 gr.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 25
De 15 mois à 3 ans ...	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Teinture d'eucalyptus.....	2 gr.
Térébenthine.....	20 gr.
Eau distillée.....	50 gr.
Julep gommeux.....	q. s. pour 100 cme.

Eucalyptol

Aspect : Liquide incolore.

Solubilité : Dans l'alcool, l'éther, les huiles, insoluble dans l'eau.

Saveur : De camphre et de menthe.

Doses :

de 0 gr 25 à 0 gr. 50 (selon l'âge).

Exemples de formules :

Eucalyptol.....	2 gr.
Huile d'olive stérilisée.....	20 gr.

(Pour injections hypodermiques.)

Ou :

Eucalyptol.....	10 gr.
Thymol..... }	ââ 5 gr.
Menthol..... }	
Alcool à 90°.....	100 gr.

(Une cuillerée à café dans un litre d'eau pour vaporisations.)

Ou :

Eucalyptol	2 gr.
Looch huileux	100 gr.

Pour usage interne.

Evonymus

Utiliser l'évonymine.

Aspect : Extrait en poudre brun clair.

Solubilité : Dans l'eau, l'alcool dilué, le sirop.

Saveur : Amère.

Doses :

de 2 à 5 centigr. en pilules le soir, chez les enfants de 5 à 12 ans.

Fer

On utilise :

Le fer réduit par l'hydrogène, l'arséniate de fer, le carbonate de fer, le protochlorure de fer, le perchlorure de fer, l'iodure de fer, le sous-carbonate de fer, le citrate de fer, le lactate de fer, le protoxalate de fer, le peptonate de fer, le tartrate ferrico-

potassique, le phosphate de fer, les préparations d'hémoglobine.

Fer réduit par l'Hydrogène

Aspect : Poudre impalpable de couleur grise.

Solubilité : Se dissout dans le suc gastrique.

Saveur : Styptique, métallique.

Incompatibilités : Tannin, écorce de chêne, cannelle, quinquina, cachou, alcalis, carbonates alcalins, acide phosphorique, arséniate de soude, albumine, phénol, chlorate de potasse.

Doses :

Jusqu'à 2 ans.....	Abstention
de 2 à 3 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 05
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10

Exemple de formule :

Fer réduit par l'hydrogène.....	0 gr. 02
Manne	0 gr. 05

Par pilule.

Carbonate de fer

Aspect : Masse amorphe, blanche, instable.

Solubilité : Se dissout facilement dans le suc gastrique, insoluble dans l'eau.

Saveur : Styptique.

Incompatibilités : Ne pas mettre en solution, très altérable à l'air. Ne se prescrit qu'en pilules.

Doses :

Jusqu'à 2 ans.....	Abstention
de 2 à 3 ans.....	0 gr. 05
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 30

Exemple de formule :

Protocarbonate de fer.....	0 gr. 025
Extrait de belladone.....	0 gr. 005

Par pilule.

Les pilules *de Vallet* (Codex) en contiennent 0 gr. 03.

Les pilules *de Blaud* (Codex) en contiennent également 0 gr. 03.

Sous-carbonate de fer (Safran de mer apéritif.)

Aspect : Poudre rouge brun amorphe, instable.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

Saveur : Un peu ferrugineuse, métallique.

Incompatibilités : Mêmes que le carbonate.

Doses :

Mêmes doses que le carbonate.

Exemple de formule :

Sous carbonate de fer.....	5 gr.
Poudre de gentiane	3 gr.
Magnésie calcinée	2 gr.

A diviser en 25 ou 50 cachets.

Protochlorure de fer

Aspect : Sel blanc solide.

Solubilité : Dans l'eau et l'alcool.

Saveur : Styptique.

Incompatibilités : Comme le carbonate, s'oxyde facilement.

Doses :

Première année.....	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 10
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30

Exemple de formule :

Protochlorure de fer en dragées de 0 gr. 025.

Ou :

Solution de protochlorure de fer au 1/3.	15 gr.
Acide citrique.....	2 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	250 gr.
Sirop de sucre.....	733 gr.

(Une cuillerée à soupe renferme environ 0 gr. 30 de protochlorure).

Perchlorure de fer

Aspect : Lames violacées déliquescentes, (aussi n'existe que sous forme de solution officinale).

Solubilité : Dans l'eau, l'alcool, l'éther.

Saveur : Styptique.

Equivalence : XX gouttes = 1 gr.

Incompatibilités : Comme le fer. Avec l'iodure de potassium, les gommes, le cyanure, l'eau de laurier cerise.

Doses :

Jusqu'à 1 an	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	V à X gouttes.
De 2 à 5 ans.....	X à XV gouttes.
De 5 à 12.....	XV à XXX gouttes.

Exemple de formule :

Perchlorure de fer.....	XX gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 gr.
Eau distillée ..... q. s pour	90 cmc.

Iodure de fer

Ne se conserve pas, se prescrit sous forme de sirop ou de pilules.

Sirop d'Iodure de fer

Aspect : Légèrement verdâtre.

Saveur : Astringente et styptique.

Equivalence : Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 10 d'iodure de fer.

Doses :

De 0 à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	5 gr. à 15 gr.
De 2 à 5 ans.....	15 gr. à 40 gr.
De 5 à 12 ans.....	40 gr. à 60 gr.

Exemple de formule :

Sirop d'iodure de fer.....	40 gr.
Sirop de raifort composé.....	60 gr.

Pilules d'iodure de fer

Les pilules sont dosées à 0 gr. 05.

Doses :

Jusqu'à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 2 ans	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 2 à 5 ans	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 5 à 12 ans	0 gr. 20 à 0 gr. 50

Citrate de fer

Aspect : Ecailles rouges foncées.

Solubilité : Déliquescent, insoluble dans l'alcool et l'éther.

Saveur : Presque nulle.

Incompatibilités : Arséniate de soude, vin de Bordeaux.

Doses :

Jusqu'à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50
De 5 à 12 ans	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Citrate de fer..... }	
Glycérine..... }	âà 5 gr.
Sirop d écorces d'oranges amères	150 cmc.

Ou :

Citrate de fer.....	5 gr.
Glycérine.....	75 gr.
Elixir de Garus.....	250 gr.
Sirop..... q. s. pour	500 cmc.

Lactate de fer

Aspect : Aiguilles verdâtres.

Solubilité : Dans la glycérine, peu dans l'eau.

Saveur : Peu prononcée.

Doses :

de 0 à 1 an.....	Abstention
de 1 à 2 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
de 2 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Lactate de fer..... }	
Poudre de calamus..... }	ââ 1 gr.
Poudre de sucre.....	30 gr.

A diviser en 10 doses.

Ou :

Lactate de fer.....	2 gr.
Sirop de gentiane.....	200 gr.

Protoxalate de fer

Aspect : Poudre jaune.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

Saveur : Peu accentuée.

Incompatibilités : Celles du fer en général, et surtout les acides

Doses :

de 0 à 1 an.....	Abstention
de 1 à 2 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 05
de 2 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
de 5 à 12 ans	0 gr. 15 à 0 gr. 25

Exemple de formule :

Protoxalate de fer..... .. 1 gr.
Poudre de gentiane..... } ââ 5 gr.
Poudre de sucre.... ..... }

A diviser en 20 paquets.

Tartrate ferrico-potassique

Aspect : Ecailles rouges, amorphe.

Solubilité : Déliquescent, insoluble dans l'alcool.

Saveur : Faible.

Incompatibilités : Substances tanniques, ammoniaque. Le tartrate impur qui est ammoniacal se trouble avec l'eau.

Doses :

de 0 à 1 an.....	Abstention
de 1 à 2 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
de 2 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50
de 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Tartrate ferrico-potassique..... } ââ 25 gr.
Eau distillée..... }
Sirop de sucre..... 950 gr.

Ou :

Liqueur de Fowler.....
Tartrate ferrico-potassique..... } ââ 10 gr.

En gouttes.

Peptonate de fer

Aspect : Existe en solution dont 10 cmc. contiennent 25 milligr. de fer.

Doses :

de 2 à 3 ans.....	5 à 10 gr.
de 3 à 5 ans.....	10 à 20 gr.
de 5 à 12 ans.....	20 à 50 gr.

Exemple de formule :

Solution de peptonate de fer à 2.50 pour 1000.....	165 gr.
Eau de fleurs d'oranger.....	ââ 15 gr.
Alcoolat de mélisse.....	
Elixir de Garus.....	375 gr.
Sirop de sucre	450 gr.

(Une cuillerée à soupe de cet élixir renferme un peu moins de 0 gr. 01 de peptonate de fer.)

Arséniate de fer

Aspect : Poudre amorphe verte.
Solubilité : Insoluble dans l'eau.
Incompatibilités : Citrate de soude.

Doses :

de 8 à 10 ans..... 1 à 2 milligrammes

Exemple de formule :

Arséniate de soude cristallisé...	0 gr. 32
Sulfate ferreux pur.....	0 gr. 28
Acide citrique.....	0 gr. 40
Eau distillée.....	10 gr.
Sirop de sucre.....	990 gr.

(Une cuillerée à café contient 1 milligr. d'arséniate de fer).

Ou en pilules de 0 gr 001.

Phosphate de fer

Aspect : Gélatineux blanc.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

Doses : A peu près comme l'oxalate.

Exemple de formule :

Phosphate de soude cristallisé..	12 gr.
Sulfate de fer pur.....	9 gr. 25
Acide citrique.....	3 gr. 75
Eau distillée.....	40 gr.
Sirop de sucre.....	935 gr.

(Une cuillerée à soupe représente 0 gr. 10 de phosphate de fer).

Hémoglobine

Aspect : En paillettes ou liquide brun.

Solubilité : Dans l'eau, la glycérine.

Incompatibilités : Kola, coca, quinquina, sirop d'écorces d'oranges.

Doses d'hémoglobine soluble :

De 1 à 2 ans	0 gr. 20 à 0 gr. 50
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Hémoglobine soluble.....	10 gr.
Glycérine neutre.....	10 gr.
Sirop de vanille.....	80 gr.

(Une cuillerée à café contient 0 gr. 55 d'Hémoglobine.)

Ou en élixir :

Hémoglobine.....	10 gr.
Sirop simple ..... / Glycérine neutre.....	àà 20 gr.
Alcoolat de cacao vanillé.....	15 gr.
Eau distillée.....	35 gr.

(Une cuillerée à café contient 0 gr. 55 d'Hémoglobine.)

Ferments lactiques

Cultures de Bacille lactique ou Paralactique destinées à transformer la flore microbienne intestinale. N'existent actuellement qu'en spécialités :

La Paralactine.

Le Lactifère.

Les meilleures marques sont celles de Carrion et de Byla.

La plupart des ferments se délivrent sous forme de comprimés, mais il en existe sous forme de bouillons (Voir ce mot).

Fève de Saint-Ignace

S'emploie sous forme de gouttes amères de Baumé.

Aspect : Liquide brun noirâtre.

Solubilité : Ne se trouble pas par addition d'eau.

Saveur : Très amère.

Equivalence : 1 gr. = 57 gouttes.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	II à VIII gouttes.
De 5 à 7 ans.....	VIII à XII gouttes.

Exemple de formule :

Gouttes amères de Baumé.....	1 gr.
Bicarbonate de soude.....	5 gr.
Elixir de pepsine.....	60 gr.
Eau de tilleul..... q. s. pour	140 cmc.

(1 cuillerée à café contient II gouttes).

Formiates alcalins

On utilise le formiate de soude et le formiate de chaux.

Formiate de soude

Aspect : Cristaux blancs déliquescents.
Solubilité : Dans l'eau, le sirop.
Saveur : Légèrement salée.

Doses :

De 1 à 3 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 30
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Formiate de soude.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges	80 gr.
Infusion à 2 0/0 d'adonis, q. s. pr	200 cmc.

Formiate de chaux

Comme le Formiate de soude.

Formol

La soluté officinal renferme 35 0/0 d'aldehyde formique.

Aspect : Soluté limpide, incolore, miscible à l'eau. Odeur piquante.

S'emploie seulement pour l'usage externe en solution de 1/4000e pour pansements, ou en solution plus concentrée pour badigeonnages :

Formol.....	0 gr. 10
Glycérine.....	20 gr.

On a essayé de le désodoriser :

Solution de formol à 40 0/0.....	925 gr.
Saponine pure.....	10 gr.
Alcoolat de lavande.....	75 gr.

(Une cuillerée à soupe par 2 litres d'eau tiède.

On l'a spécialisé sous le nom d'*Aniodol*. Voici une formule analogue :

Solution de Formol à 40 0/0.....	25 gr.
Sulfure d'allyle.....	III gouttes.
Eau distillée..... q s. pour	1 litre.

(Deux cuillerées à soupe par litre d'eau.)

Ou sous le nom de *Lusoforme*. Voici une formule analogue :

Oxymethyallylsulfocarbimide pur.	10 gr.
Solution de Formol à 40 0/0.....	500 gr.

Alcool methylique.....	ââ 200 gr.
Savon noir.....	
Glycérine neutre à 30°.....	200 gr.
Eau distillée	250 gr.
Teinture de Safran.....	2 gr.

(Une à deux cuillerées à soupe par litre d'eau).

Fougère mâle

On emploie l'extrait éthéré.

Aspect : Brun verdâtre.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

Saveur : Acre, odeur nauséeuse.

Incompatibilités : Huiles, graisses, éther.

Doses :

De 1 à 2 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 2 à 5 ans.....	1 gr. à 3 gr.
De 5 à 10 ans.....	3 gr. à 5 gr.

Exemples de formules :

Extrait éthéré de fougère mâle.....	0 gr. 50 à 5 gr.
Gomme pulvérisée....	1 gr.
Looch blanc.....	60 cmc.

Ou :

Extrait éthéré	4 gr.
Calomel	0 gr. 40

Sucre pulvérisé..... 8 gr.
Gélatine..... q. s.

(Pour une gelée (D. S. A.)

Ou :

Extrait éthéré de fougère mâle. 0 gr. 50
Calomel ..... 0 gr. 05

(Par capsule).

Fucus vésiculosus

Utiliser l'extrait aqueux à donner en pilules.
Aspect : Pulpe brun rougeâtre.
Solubilité : Incomplètement soluble dans l'eau.
Saveur : Douceâtre.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge.

Fumeterre

Utiliser le sirop.

5 gr. par année d'âge.

Gaïacol synthétique cristallisé

Aspect : Cristaux incolores.

Solubilité : Dans la glycérine, l'alcool, les huiles, le salicylate de méthyle, l'éther.

Saveur : Sucrée et brûlante, odeur persistante.

Incompatibilités : Camphre, substances alcalines, perchlorure de fer.

Doses :

de 0 à 1 an.....	Abstention
de 1 à 2 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
de 2 à 5 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 40
de 5 à 10 ans	0 gr. 40 à 0 gr. 75

Exemples de formules :

Gaïacol synthétique cristallisé...	1 gr. 50
Glycérine pure.....	18 gr. 50
Sirop simple.....	189 gr.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol).

Ou :

Gaïacol synthétique.....	1 gr. 65
Glycérine pure à 30°	16 gr. 50
Phosphate de chaux pur.....	8 gr. 25
Acide chlorhydrique	5 gr.
Eau distillée.....q s. pour	250 gr.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 10 de gaïacol et 0 gr. 50 de chlorhydro-phosphate de chaux).

Ou :

Gaïacol cristallisé.....	10 gr.
Huile de foie de morue..... ..	1 litre

Ou :

Gaïacol cristallisé.....	0 gr. 05
Huile d'olive stérilisée.....	1 cmc.

Par ampoule, (pour injections hypodermiques).

Carbonate de gaïacol (Duotal)

Aspect : Poudre inodore.
Saveur : Nulle.
Solubilité : Nulle.

Doses :

de 5 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

En paquets.

Phosphate de Gaïacol

Aspect : Poudre blanche.
Saveur : Nulle, pas d'odeur.
Solubilité : Nulle.

Doses :

De 5 à 12 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20

En cachets.

Gallique (Acide)

Aspect : Cristaux soyeux.
Solubilité : Dans l'alcool.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge.

Exemple de formule :

Acide gallique.....	1 gr.
Sirop de ratanhia	20 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	40 gr.
Eau distillée.....q s. pour	120 cmc.

Gélatine

Employer une solution purifiée et stérilisée de gélatine au 1/10 à incorporer dans une prise de lait.

Doses :

de 0 à 15 mois..... 5 à 25 gr.

En plusieurs fois.

Gelsemium

Utiliser la teinture de racines au 1/5e. Soluble dans le sirop.

Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	V à X gouttes.
De 5 à 12 ans.....	X à XX gouttes.

Genêts

On emploie l'infusion de fleurs, les extraits de fleurs sèches, ou les extraits de fleurs fraîches (énergetène) ou la spartéine.

Infusion de fleurs sèches

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	5 à 10 gr.
De 3 à 5 ans.....	10 à 15 gr.
De 5 à 12 ans.....	15 à 20 gr.

(L'infusion se fait à 2 ou 3 0/0).

Extrait aqueux de fleurs sèches

Aspect : Extrait mou élastique, jaune brun.
Solubilité : Dans l'eau.
Saveur : Acre et amère.
Doses : Moitié moindre que l'extrait fluide.

Exemple de formule :

Extrait aqueux de genêts.....	0 gr. 10
Extrait de scille.....	0 gr. 15

Par pilule.

Extrait fluide de fleurs sèches

Aspect : Liquide rouge brun.
Solubilité : Miscible à l'eau et au sirop.
Saveur : Amère.
Equivalence : 1 gr. = 38 gouttes.

Doses :

De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 3 ans à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Extrait fluide de genêts..... ...	2 gr.
Sirop simple.....	80 cmc.

Extrait de fleurs fraiches (energetène)

Equivalence : 1 gr. = 50 gouttes.

Doses :

de 3 à 5 ans.....	3 à 4 gouttes.
de 5 à 12 ans.....	4 gouttes à 2 gr.

Exemple de formule :

Energetène de fleurs fraîches...	10 gr.
Extrait de genièvre.....	1 gr.
Sirop des cinq-racines.....	40 gr.
Eau bouillante..... q.s. pour	500 cmc.

Spartéine (Sulfate de)

Aspect : Cristaux incolores.

Solubilité : Très soluble dans l'eau, l'alcool.

Doses :

De 0 à 3 ans..... ..	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 05
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10

Exemples de formules :

Sulfate de spartéine	0 gr. 10
Sirop d'éther.....	20 gr.
Eau de tilleul..... q.s. pour	60 cmc.

Ou :

Sulfate de spartéine.....	0 gr. 05
Eau distillée.....	1 cmc.

En ampoules pour injections hypodermiques.

Gentiane

Utiliser l'extrait aqueux, le sirop ou le vin de gentiane.

Extrait aqueux

Aspect : Masse brun rougeâtre.
Solubilité : Dans l'eau.
Saveur : Très amère.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge, à partir de 3 ans.
En pilules.

Sirop ou Vin de gentiane

Doses :

de 0 à 15 mois.....	Abstention
de 15 mois à 3 ans.....	5 à 10 gr.
de 3 à 5 ans	10 à 20 gr.
de 5 à 12 ans.....	20 à 50 gr.

Germandrée

Utiliser le sirop ou l'extrait aqueux à la dose de 0 gr. 10 par année d'âge.

Gingembre

Employer la teinture au 1/5. Soluble dans l'alcool, la glycérine, le sirop.

Doses :

0 gr. 10 par année d'âge à partir de 3 ans.

Exemple de Formule :

Teinture de gingembre.....		1 gr.
Alcool.....	âà	10 gr.
Glycérine.....		
Sirop simple.....		40 gr.
Eau.....q. s. pour		90 cmc.

Glycérine

Aspect : Liquide sirupeux, incolore.

Saveur : Sucrée.

Equivalence : 1 gr. = 25 gouttes.

Solubilité : Dans l'eau et l'alcool.

Incompatibilités : Permanganate de potasse, goudron, corps gras, éther, borate et carbonate de soude.

Doses :

2 gr. par année d'âge.

Exemple de formule :

Glycérine	20 gr.
Eau de menthe..... q. s. pour	90 cmc.

On emploie couramment aussi les suppositoires à la glycérine solidifiée.

Glycogène

Doses :

de 0 gr. 20 à 0 gr 50 selon l'âge à partir 5 ans.

Exemple de formule :

Glycogène.....	0 gr. 20
Glycérine pure.....	5 gr.
Eau distillée.....	30 cmc.

A prendre dans la journée.

Ou :

Pilules glutineuses à	0 gr. 20

Glycyrrhizine

Principe actif de la réglisse.

Aspect : Extrait brun.

Saveur : Sucrée.

Solubilité : Se trouble avec l'eau.

Doses : 5 à 20 gr. (selon l'âge).

Gomenol

Aspect : Liquide huileux.

Solubilité : Dans l'huile, dans l'eau pour plus de 2 1000 en émulsionnant avec du Panama.

Saveur : Arômatique, odeur balsamique.

Dose :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

I

Capsules de gomenol à 0 gr. 25.

II

Gomenol.....	4 gr.
Sirop de Tolu..... }	àà 40 gr.
Sirop de coquelicot..... }	
Hydrolat de cannelle q. s. pour	120 cmc.

III

Gomenol.....	10 à 20 gr.
Huile d'olive.....	100 gr.

(Pour injections intra-vésicales ou intra-trachéales).

IV.

Goménol..... }	àà 50 gr.
Lanoline..... }	

(En pommade).

V

Gomenol	2 gr.
Huile d'olive.....	10 cmc.

(Pour injections hypodermiques).

VI

Gomenol	2 gr.
Décoction faible de Bois de Panama	1 litre.

(Pour injections, lavages).

Goudron

Employer le sirop de goudron.

Doses :

de 3 à 5 ans	5 à 10 gr.
de 5 à 12 ans.....	10 à 20 gr.

Grenadier

On emploie l'écorce ou l'alcaloïde, la pelletiérine.

Ecorce de Grenadier

Saveur légèrement amère. Colore la salive en

jaune. Se colore en bleu noirâtre par les sels de fer.

Doses :

De 15 mois à 3 ans.....	5 gr. à 10 gr.
De 3 à 5 ans.....	10 gr. à 30 gr.
De 5 à 10 ans.....	30 gr. à 40 gr.

Exemple de formule :

Décoction (au 1/5 ou au 1/10e) dans 200 gr. d'eau.

Pelletiérine (sulfate de)

Aspect : Liquide oléagineux, altérable à l'eau.

Solubilité : Dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, peu dans l'eau au 1/20.

Doses :

Au-dessous de 5 ans..	Abstention.
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30

Exemple de formule :

Sulfate de Pelletiérine.....	0 gr. 25
Extrait de eachou.....	1 gr.
Eau distillée.....	15 gr.
Sirop d'écorces d'oranges q. s. pr	40 cme.

Tannate de Pelletiérine

Employé de préférence au sulfate et obtenu en décomposant les sulfates par le tannin.

Saveur : Astringent.

Dose : Comme le sulfate.

Exemple de formule :

Sulfate de Pelletiérine..... .	0 gr. 30
Tannin.....	0 gr. 40
Sirop simple.....	25 gr

(Codex).

Grindelia robusta

Employer l'extrait fluide à poids égal ou la teinture de feuilles au 1/5.

Extrait fluide à poids égal

Aspect : Liquide brun verdâtre résineux.

Solubilité : Insoluble dans le sirop, se trouble par l'eau.

Saveur : Amère, odeur aromatique.

Equivalence : 1 gr. = 56 gouttes.

Doses :

De 2 à 4 ans.....	X à XV gouttes.
De 4 à 6 ans.....	XV à XX gouttes.
De 6 à 12 ans	XX à XXX gouttes.

Exemple de formule :

Extrait fluide de grindelia.....		
Teinture de lobelie au 1/5.....	ââ	1 gr.
Alcoolat d'anémone pulsatile ...		2 gr.
Eau de tilleul.....		60 gr.
Sirop de fleurs d'oranger, q. s. p.		100 cmc.

Teinture au 1/5e

Solubilité : Précipite dans l'eau, le sirop, la glycérine.

Equivalence : 1 gr. = 55 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	I	à	V gouttes.
De 15 mois à 3 ans.....	V	à	X gouttes.
De 3 à 5 ans.....	X	à	XV gouttes.
De 5 à 12 ans.....	XV	à	XX gouttes.

Exemple de formule :

Teinture de Drosera au 1/5e.....		
Teinture de feuilles de belladone au 1/10e	ââ	10 gr.
Teinture de racines d'aconit au 1/10e		

(X gouttes 2 à 3 fois par jour).

Gui

Employer la teinture au 1/5, ou l'energétène.

Doses :

De 3 à 5 ans..... XX gout. à XXX gouttes.
De 5 à 12 ans.... XXX gout. à 1 gr.

L'energétène se donne à la dose de 3 à 4 gouttes dans de l'eau sucrée.

Guimauve

Utiliser le sirop, incompatible avec l'opium.

Hamamelis virginica

On emploie la teinture et l'extrait fluide.

Teinture d'Hamamelis (de feuilles au 1/5)

Aspect : Liquide brun verdâtre.
Solubilité : Miscible à l'eau.

Saveur : Astringente prononcée, odeur aromatique

Incompatibilité : Antipyrine.

Equivalence : 1 gr. = 53 gouttes.

Doses :

De 1 à 3 ans.....	XX à L gouttes.
De 3 à 5 ans.....	1 à 4 gr.
De 5 à 10 ans.....	4 à 7 gr.

Exemple de formule :

Teinture d'Hamamelis.....	5 gr.
Eau.....	50 gr.
Sirop de framboises q. s. pour	120 cmc.

On associe souvent les Teintures d'Hamamelis et d'Hydrastis, mais le mélange est trouble. Il faut ajouter IIcl, 2 ou 3 gouttes pour 10 gr. environ de substances, afin de clarifier le mélange.

Extrait fluide d'Hamamelis à parties égales

Aspect : Liquide brun foncé.

Solubilité : Dans l'alcool. Précipite dans l'eau.

Saveur : Acidule et amère. Odeur de coca.

Equivalence : 1 gr. = 50 gouttes.

Doses :

De 1 à 3 ans.....	X à XXX gouttes.
De 3 à 5 ans.....	XXX gouttes à 2 gr.
De 5 à 10 ans.....	2 à 4 gr.

Exemple de formule :

Extrait fluide d'Hamamélis.....	10 gr.
Teinture de vanille.....	2 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères, q. s. pr	90 cmc.

Hedonal

Aspect : Poudre cristalline blanche.

Saveur : et odeur légèrement aromatiques.

Solubilité : Dans l'alcool.

Incompatibilité : Alcalis.

Doses :

De 5 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Hedonal.....	4 gr.
Alcool à 60°..... ...	20 gr.
Teinture de cannelle.....	X gouttes.
Sirop d'écorces d'oranges. q. s. pour.....	60 cmc.

Hémato-éthyroïdine (Sérum de mouton éthyroïdisé).

Doses : De 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau à distance des repas.

Hermophényl

Utilisé surtout pour usage externe comme antiseptique ; à l'intérieur comme antisyphilitique.

Aspect : Poudre blanche amorphe.

Saveur : Nulle, odeur nulle.

Solubilité : Eau, glycérine.

Doses :

De 1 à 3 ans	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 20

Exemple de formule :

Hermophényl	1 gr.
Glycérine	10 gr.
Sirop simple ..... q. s. pour	100 cmc.

(Une cuillerée à café contient 0 gr. 05).

Héroïne

On emploie le chlorhydrate.

Aspect : Poudre cristalline blanche, inodore.

Solubilité : Dans l'eau.

Incompatibilité : Alcalis.

Doses : Abstention jusqu'à 3 ans. Au-dessus, être réservé dans son emploi.

De 5 à 12 ans.....	0 gr. 001 à 0 gr. 004

Exemple de formule :

Chlorhydrate d'Héroïne.....	0 gr. 01
Eau de laurier-cerise.....	5 gr.
Sirop de Tolu.....	60 gr.
Julep gommeux..... q. s. pour	90 cmc.

Ou, en injections hypodermiques (comme succédané de la morphine dans le traitement de la coqueluche) :

Chlorhydrate d'Héroïne.....	0 gr. 10.
Eau distillée stérilisée, refroidie.	20 cmc.

Houblon

Employer la macération ou le sirop.

Doses : Pour macération.

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	2 gr. à 5 gr.
De 3 à 5 ans.....	5 gr. à 10 gr.
De 5 à 12 ans.....	10 gr. à 15 gr.

Huile de cade

Aspect : Liquide épais, de coloration brunâtre, extrait du genévrier

Saveur : Acre et caustique. Odeur forte de viande fumée. Elle se désodorise par addition de quelques gouttes d'essence de verveine.

S'emploie exclusivement pour l'usage externe, soit sous forme de pommades :

I.

Huile de cade.....	1 gr.
Glycérolé d'amidon à la glycérine neutre.....	40 gr.

II.

Huile de cade.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	
Vaseline.....	20 gr.
Lanoline.....	

III.

Huile de cade.....	4 gr.
Glycérolé d'amidon	àà 30 gr.
Extrait fluide de Panama	

VI.

Huile de cade	6 gr.
Mucilage de semences de coings.	40 gr.

Ou sous forme d'emplâtre :

Sparadrap à l'Huile de cade.
Ou Sparadrap à l'huile de cade désodorisée.

Ou sous forme de Collodion :

Huile de cade	1 gr.
Collodion	50 gr.

Ne jamais employer l'huile de cade pure en badigeonnages chez les enfants.

L'huile de cade s'associe très souvent aux autres médications employées en dermatologie. Voici, par exemple, une formule utile en lotions contre la séborrhée huileuse :

Huile de cade	10 gr.
Soufre précipité	20 gr.
Acide pyrogallique	2 gr.
Acide chrysophanique, Sublimé corrosif	âà 0 gr. 20
Alcool à 90°, Acétone	âà 100 gr.

Le savon à l'huile de cade est très employé.

Huile de foie de morue

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	10 à 20 gr.
De 3 à 5 ans.....	20 à 30 gr.
De 5 à 10 ans.....	30 à 40 gr.

S'administre soit en nature soit en émulsions.

1° Emulsion renfermant le tiers de son poids d'huile de foie de morue : (Codex)

Huile de foie de morue.....	140 gr.
Sirop simple.....	60 gr.
Eau distillée de fleurs d'oranger.	40 gr.
Carragaheen.....	5 gr.
Eau distillée.....	q.s.
Essenee d'amandes amères.....	IV gouttes.

2° Emulsion renfermant la moitié de son poids d'huile de foie de morue.

Huile de foie de morue..... ...	480 gr.
Solution de laeto-phosphate de chaux à 5 p. 100.....	150 gr.
Sirop de laeto phosphate de chaux à 5 p. 100.....	325 gr.
Aleoolat de citron.....	20 gr.
Gomme adragante.....	5 gr.

3° Emulsion au 1/3 de son poids d'huile de foie de morue.

Huile de foie de morue blanche.	300 gr.

Glycérine pure à 30°.....)	
Sirop de Tolu .....)	aâ 130
Eau de fleurs d'oranger.....	90 gr.
Fucus crispus.....	10 gr.
Hypophosphite de chaux.... ...	8 gr. 50
Eau distillée..... q.s. pour	1 litre
Essence d'amandes amères	XII gouttes.

Huile de foie de morue phosphorée

On peut l'associer au phosphore :

Huile de foie de morue à 0 gr. 05 de phosphore pour 1000 ou au 1/20000.
(1 cuillerée à café renferme 1/4 de milligr. de Phosphore).

Doses :

De 3 à 5 ans.....	5 à 10 gr.
De 5 à 13 ans	10 à 20 gr.

Huile de foie de morue créosotée et gaïacolée

On l'associe également à la créosote.
Huile de foie de morue créosotée au centième.

Doses :

Moitié moindre que l'huile de foie de morue pure

On emploie aussi aux mêmes doses l'huile de foie de morue gaïacolée au centième.

Huile de foie de morue Iodée

Voici une formule de cette association :

Iode bisublimé.....	1 gr.
Iodure de sodium.....	0 gr. 25
Eau distillée.....	V gouttes.
Huile de foie de morue blonde..	1 litre.

Mêmes doses que l'huile de foie de morue créosotée.

Extraits glycérinés concentrés de foies frais de morue ou de cabillaud (Sanas ; Cabilline)

Ces extraits sont mieux tolérés que l'huile de foie de morue et s'administrent à doses moindres.

Aspect : Liquide sirupeux jaunâtre.

Saveur : De poisson, odeur de sardine.

Solubilité : Miscibles à tous aliments ou liquides.

Doses :

De X à XX gouttes chaque matin (dans la première cuillerée du petit déjeuner).

Huile de Haarlem

Aspect : Huile volatile jaunâtre, paraissant être extraite du genevrier ou de l'huile pyrogénée de gaïac. C'est une sorte d'huile de cade.

Solubilité : Glycérine, huile, ou dans l'eau par émulsion avec la semence de coings.

Saveur : Acre, aromatique.

Equivalence : 1 gr. = XXX gouttes.

Doses :

De 3 à 10 ans.....	II à VI gouttes.

Dans une infusion chaude.

Exemple de formule :

Huile de Haarlem.....	10 gr.
Oxymel scillitique.....	30 gr.
Infusion d'Hysope.....q.s. pour	180 cmc.

Ou en capsules de 0 gr. 05 à 0 gr. 10

Huile iodée

Huile d'olive lavée à l'alcool.....	50 gr.
Iode métalloïde.....	0 gr. 25
Alcool.....	4 gr.

Injecter une ou 2 seringues de Pravaz par jour.

Sous le nom de *Lipiodol*, on utilise une combinaison de l'acide iodhydrique et de l'huile. C'est un liquide visqueux, peu coloré, renfermant environ l'équivalent de 0 gr. 50 d'iode par cmc. On injecte une seringue de Pravaz. L'injection est indolore.

Huile de ricin

Doses :

De 0 à 6 mois.....	2 à 4 gr.
De 6 à 15 mois.....	4 à 6 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	6 à 8 gr.
De 3 à 5 ans.....	8 à 15 gr.
De 5 à 10 ans.....	15 à 20 gr.

Formuler :

Huile de ricin.....
Cassis ..... } ââ 20 gr.

Agiter au moment de l'emploi.

Ou :

Huile de ricin .....
Vin de Malaga ..... } ââ 10 gr.

Ou :

Emulsionner dans du lait chaud, et aromatiser avec du sirop de fleurs d'oranger.

Ou :

Huile de ricin.....
Eau de menthe poivrée..... } ââ 1 partie
Eau distillée..... 2 parties.
Jaune d'œuf..... N° 1

Hydrate d'amylène

Aspect : Liquide incolore.
Solubilité : Dans l'eau, l'alcool, le sirop.

Doses :

De 6 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Hydrastis canadensis

Utiliser l'extrait hydro-alcoolique, l'extrait fluide, la teinture au 1/5e.

Extrait Hydro-alcoolique

Aspect : Masse jaune foncée.
Saveur : Amère, persistante, astringente. Odeur vireuse.
Solubilité : Dans le sirop.

Doses :

De 3 à 5 ans..... ..	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20

En pilules.

Extrait fluide

Aspect : Liquide jaune brun.

Saveur : Amère, odeur vireuse.

Solubilité : Précipite par l'eau, soluble dans alcool, glycérine, sirop.

Equivalence : 1 gr. = 59 gouttes.

Doses :

De 3 à 5 ans.....	V à XV gouttes.
De 5 à 12 ans.....	XV à XXV gouttes.

Exemple de formule :

Extrait fluide d'hydrastis.....	1 gr.
Glycérine..... / Alcool..... \	ââ 10 gr.
Sirop de Colombo, q. s. pour...	60 cmc.

Teinture d'Hydrastis au 1/5e

Aspect : Liquide rouge brun.

Saveur : Amère.

Solubilité : Dans le sirop, l'alcool, la glycérine précipite par l'eau.

Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

De 3 à 5 ans.....	V à XV gouttes.
De 5 à 12 ans.....	XV à XXV gouttes.

Hypophosphite de chaux

(Se donne en solution ou sirop au 1/100e.)
Aspect : Prismes rectangulaires.
Solubilité : Très soluble, déliquescent.

Solution ou sirop au 1/100e

Doses :

De 0 à 15 mois.....	5 gr. à 10 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	10 gr. à 15 gr.
De 3 à 5 ans.....	15 gr. à 20 gr.
De 5 à 10 ans.....	20 gr. à 40 gr.

Hypnal

(Chloral-antipyrine à équivalents égaux).
Aspect : Cristaux blancs.
Solubilité : Dans l'eau et le sirop.
Saveur : Doucereuse et nauséeuse.

Doses :

De 6 à 12 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50

Hyposulfite de soude

Aspect : Cristaux blancs.

Solubilité : Très grande dans la glycérine et l'eau.

Saveur : Amère, désagréable.

Incompatibilités : Iode, sels acides, sels de Pb, de Hg, de Ag, acides.

Doses :

De 6 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Hyposulfite de soude.....	4 gr.
Sirop d'eucalyptus.....	40 gr.
Sirop de framboises, q. s. pour..	100 cmc.

Hysope

Utiliser le sirop (5 gr. par année d'âge).

Ichthyol

Aspect : Aspect de goudron liquide.

Solubilité : Miscible à la vaseline et aux huiles. S'émulsionne avec l'eau.

Saveur : Aromatique, peu caustique, odeur de bitume.

Doses :

Rarement utilisé à l'intérieur :

0 gr. 05 par année d'âge à partir de 5 ans, avec une limite de 0 gr. 25.

Pour l'usage externe, pommade avec :

Ichthyol	5 gr.
Oxyde de zinc	1 gr.
Axonge benzoïnée	50 gr.

Iode

On emploi la teinture d'iode, le sirop de raifort iodé, le sirop iodotannique, le sirop de quinquina iodé, le sirop tormentille iodé.

Teinture d'iode au 1/10e

Solubilité : Précipite par l'eau.

Saveur : Styptique.

Equivalence : 1 gr = 62 gouttes.

Incompatibilités : Alcalis et carbonates alcalins, sels d'argent, de mercure, de plomb, cyanures, eau de laurier-cerise, alcaloïdes, gomme, amidon, ammoniaque. Préparations opiacées.

Doses :

Jusqu'à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	I à II gouttes.
De 3 à 5 ans.....	II à V gouttes.
De 5 à 12 ans.....	V à XII gouttes.

Exemple de formule :

Teinture d'iode au 1/10e.....	L gouttes.
Glycérine	10 gr.
Extrait de feuilles de noyer.....	5 gr.
Sirop simple, q. s. pour.....	250 cme.

(1 cuillerée à café renferme 1 goutte).

On peut aussi la donner dans du lait ou dans un peu d'eau sucrée.

Sirop de raifort iodé

Equivalence : 20 gr. renferment 0 gr. 02 d'iode ou équivalent à un peu plus de XII gouttes de teinture d'iode au 1/10e.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	4 gr. à 10 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	10 gr. à 20 gr.
De 3 à 5 ans.	20 gr. à 30 gr
De 5 à 12 ans.....	30 gr. à 40 gr.

Sirop iodotannique

Aspect : Couleur ambrée.

Saveur : Astringente.

Equivalence : 20 gr. = 0 gr. 04 d'iode et 0 gr. 08 de tanin.

Doses :

Jusqu'à 15 mois.....	2 gr. à 5 gr.
De 15 mois à 3 ans....	5 gr. à 10 gr.
De 3 à 5 ans.....	10 gr. à 20 gr.
De 5 à 12 ans.....	20 gr. à 40 gr.

Sirop iodotannique phosphaté

Equivalence : 20 gr. = 0 gr. 04 d'iode, 0 gr. 08 de tanin et 0 gr. 40 de phosphate de chaux.

Doses :

Les mêmes que le sirop iodotannique.

Vin iodotannique phosphaté

Equivalence : 20 gr. = 0 gr. 04 d'iode, 0 gr. 40 de phosphate de chaux.

Mêmes doses que le sirop.

Sirop de quinquina iodé

Iode.....	2 gr.
Alcool à 90°.....	28 gr.
Sirop de quinquina à l'eau.....	970 gr.

20 gr. = 0 gr. 04 d'iode.

Mêmes doses que le sirop iodotannique.

Sirop de tormentille iodé

Iode	1 gr.
Alcool à 90°	14 gr.
Extrait de tormentille	30 gr.
Sirop de sucre	925 gr.
Eau distillée	30 gr.

Equivalence : 20 gr. = 0 gr. 02 d'iode.

Doses :

Comme le sirop de raifort iodé.

Iodure de potassium

Aspect : Sel blanc, cristallisé.

Solubilité : Très grande dans l'eau, moindre dans l'alcool.

Saveur : Amère.

Incompatibilités : Acides, alcools, brome, chlore, sels d'argent, de mercure, iodures métalliques, sulfate de quinine, tanin, sirop de Tolu, hydrates de carbone, sels d'alcaloïdes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 20
De 15 mois à 3 ans....	0 gr. 20 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr. 50
De 5 à 12 ans.....	1 gr. 50 à 3 gr.

Ce sont là des doses maxima, et, dans la pratique, on se contente de doses 4 à 5 fois moindres.

Exemple de formule :

Iodure de potassium.....	10 gr.
Rhum.	20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	80 gr.
Eau distillée, q. s. pour.....	200 cmc.

Iodure de sodium

Comme l'iodure de potassium.

Iodure de fer

Se prescrit sous forme de sirop d'iodure ferreux (Codex).

Aspect : Sirop légèrement verdâtre.

Saveur : Astringente et styptique.

Equivalence : 20 gr. = 0 gr. 10 d'iodure de fer.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	5 gr. à 15 gr.
De 3 à 5 ans.....	15 gr. à 40 gr.
De 5 à 12 ans.....	40 gr. à 60 gr.

Iodipine

(Chlorure d'iode dissous dans l'huile de sésame).
Utiliser la solution au 1 10e, liquide clair.
En injections de 1 cmc. à partir de 5 ans.

Iodoforme

Aspect : Poudre jaunâtre.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther et les huiles.

Incompatibilité : Calomel.

Saveur : Alliacée, odeur pénétrante, âcre.

Doses :

De 0 à 1 an.....	Abstention.

De 1 à 2 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 25

Exemple de formule :

Dragées d'Iodoforme à 0 gr. 05

Ipécacuanha

On emploie la poudre d'ipéca,
l'extrait hydro-alcoolique,
la teinture de racines au 1/10e,
le sirop d'ipéca,
le sirop de Desessartz.

Poudre de racines d'ipéca

Incompatibilités : Sels de mercure, de plomb, acides végétaux, tanin, astringents.

Doses :

Comme expectorant

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 10 à 0 gr. 15
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 25
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 30

Exemple de formule :

Infusion de racines d'ipéca à 0 gr. 25.....	60 gr.
Benzoate de soude.....	0 gr. 50
Sirop de capillaire, q. s. pour...	100 cmc.

Comme vomitif

Nouveau-né.....	0 gr. 10
De 0 à 1 an.....	0 gr. 20
De 1 à 3 ans.....	0 gr. 30
De 3 à 5 ans	0 gr. 50
De 5 à 10 ans, 0 gr. 50 à.....	1 gr.

Exemple de formule :

Poudre d'ipéca.....	0 gr. 20
Sirop d'ipéca..... ...	30 gr.

Extrait d'ipéca

Aspect : Extrait ferme, brun foncé.

Solubilité : Dans l'eau (solution trouble).

Saveur : Amère, nauséeuse.

Doses :

Comme expectorant

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 05 à 0 gr. 15
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 25
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 40

Teinture de racines au 1/10^{e}

Aspect : Liquide brun rougeâtre.

Solubilité : Se trouble avec l'eau.

Saveur : Amère et nauséeuse.

Doses :

Comme expectorant seulement
environ 5 fois moins que l'extrait.

Exemple de formules :

Teinture de racines au 1/10e.....	1 gr.
Sirop simple	40 cmc.

Sirop d'ipéca

Incompatibilités : Tanin, ammoniaque, borax, iode, sirop d'iodure de fer.

Doses :

Comme expectorant seulement.

(20 gr. de sirop équivalent à 0 gr. 20 d'extrait. Se baser pour la posologie aux doses correspondantes d'extrait indiquées ci-dessus).

Exemple de formules :

Oxyde blanc d'antimoine.....	1 gr.
Teinture de racines d'aconit.....	X gouttes.
Teinture de noix vomique.....	XV gouttes.
Eau de laurier-cerise.....	5 gr.
Sirop diacode..... / Sirop d'ipéca..... \	ââ 20 gr.
Eau de tilleul, q. s. pour.....	120 cmc.

Sirop de Desessartz (ou Sirop d'ipéca composé).

Contient :

Ipéca concassé	3 gr.
Folioles de séné	10 gr.
Serpolet	3 gr.
Fleurs de coquelicot	12 gr.
Sulfate de magnésie	10 gr.
Vin blanc	75 gr.
Eau de fleurs d'oranger	75 gr.
Eau bouillante	300 gr.
Sucre blanc	q. s.

Equivalence : 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 10 de poudre.

Doses :

Comme expectorant

De 0 à 15 mois	5 gr.
De 15 mois à 3 ans	5 gr. à 10 gr.
De 3 à 5 ans	10 gr. à 20 gr.
De 5 à 10 ans	20 gr. à 30 gr.

Une forme commode d'administrer l'ipéca comme expectorant consiste à donner les *Tablettes* du Codex dosées à 0 gr. 01 par tablette.

Jaborandi

On emploie la teinture au 1/5e et la pilocarpine.

Teinture au 1/5e

Aspect : Liquide vert brun.

Saveur : Amère, Odeur aromatique.

Solubilité : Miscible au sirop.

Equivalence : 1 gr. = 55 gouttes.

Doses :

De 3 à 5 ans.....	X à XV gouttes.
De 5 à 12 ans.....	XV à XXV gouttes.

Pilocarpine

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 01
De 1 à 3 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 3 à 6 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 03
De 6 à 10 ans.....	0 gr. 03 à 0 gr. 04
De 10 à 15 ans.....	0 gr. 04 à 0 gr. 05

En granules.

Jalap

On utilise la poudre et la teinture de Jalap composée.

Poudre

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10

De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 10 à 0 gr. 15
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 25
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 45

Dans du lait.

Teinture de Jalap composée (Eau-de-vie allemande).

Aspect : Liquide jaunâtre.
Solubilité : Non miscible à l'eau, louchit le sirop.
Saveur : Acre.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	2 gr. à 5 gr.
De 5 à 12 ans.....	5 gr. à 10 gr.

Exemple de formule :

Eau-de-vie allemande.....	5 gr.
Sirop de Nerprun.....	5 gr. à 10 gr.

Jusquiame

On utilise la poudre de feuilles, l'extrait hydro-alcoolique de feuilles sèches, la teinture de feuilles sèches, les pilules de Méglin

Poudre de feuilles

Incompatibilités générales : Comme la belladone.

Doses :

De 3 à 5 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 05
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15

Exemple de formule :

Poudre de feuilles de jusquiame. 0 gr. 02

Par pilule.

Extrait de feuilles sèches.

Aspect : Extrait brun verdâtre.

Solubilité : Dans l'alcool, se trouble avec l'eau, insoluble dans le sirop.

Saveur : Amère, odeur vireuse.

Doses :

Jusqu'à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 3 ans.....	0 gr. 001 à 0 gr. 01
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 04

Exemple de formule :

Extrait alcoolique de feuilles sèches.....	0 gr. 02
Rhum.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges, q. s pour..	90 cmc.

Teinture de feuilles sèches au 1/10e

Aspect : Liquide vert.

Saveur : Amère. Odeur vireuse.

Solubilité : Se trouble par addition d'eau, miscible au sirop.

Equivalence : 1 gr. = 57 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	I à	IV gouttes.
De 15 mois à 3 ans....	IV à	VIII gouttes.
De 3 à 5 ans.....	VIII à	XVI gouttes.
De 5 à 10 ans.....	XVI à	XXV gouttes.

Exemple de formule :

Teinture de feuilles de jusquiame au 1/10e.....	)
Benzoate de soude.....	) ââ 2 gr.
Rhum.....	10 gr.
Sirop simple, q. s. pour.....	90 cmc.

Pilules de Méglin

Extrait de feuilles de jusquiame.	)
— de valériane..	) ââ 0 gr. 05
Oxyde de zinc.....	)

Par pilule.

Doses :

De 5 à 13 ans.....	1 à 2 pilules.

Kola

On utilise l'extrait hydro-alcoolique, l'extrait fluide, la teinture au 1/5, le vin, le sirop, l'élixir, le saccharolé.

Extrait alcoolique

Aspect : Masse de couleur marron.
Solubilité : Dans l'alcool et le sirop.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge.

Exemple de formule :

Extrait de Kola.....
Lécithine..... ..... } aâ 0 gr. 05

Par pilule.

Extrait fluide à parties égales

Aspect : Liquide rouge foncé.
Saveur : Amère et astringente.
Solubilité : Dans le sirop.
Equivalence : 1 gr. = 55 gouttes.

Doses :

X gouttes par année d'âge

Teinture au 1/5

Aspect : Liquide rouge brun.
Saveur : Apre et amère.
Solubilité : Se trouble par addition d'eau.
Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

de 0 à 15 mois....	X à XXX gouttes
de 15 mois à 3 ans.	XXX gouttes à 1 gr.
de 3 à 5 ans.....	1 à 2 gr.
de 5 à 10 ans.....	2 à 4 gr.

Exemple de formule :

Teinture de Kola au 1/5.....	4 gr.
— Scille au 1/5.....	XXX gouttes
— Digitale au 1/5.....	XX gouttes
Sirop de cerises.....	100 cmc.

Sirop et Vin

Extrait fluide de kola.....	60 gr.
Sirop ou Vin de Malaga.....	940 gr.

(D. S. A.)

Elixir de Kola

Extrait fluide de Kola.....	5 gr.
Alcool à 60°..... }	ââ 10 gr.
Sirop simple..... }	
Vin de Lunel.....	75 gr.

Saccharolé

A poids égal de noix.

Doses :

de 1 à 3 cuillerées à café (de 4 à 10 ans)

Lab-ferment

S'emploie en spécialité sous le nom de Pegnine où il est associé avec du sucre de lait. On peut formuler :

Lab ferment	0 gr. 50
Sirop de sucre.....	45 gr.
Eau de fleurs d'oranger, q. s. pour	60 cmc.

1 à 2 cuillerées à café.

Lactique (Acide)

Aspect : Liquide sirupeux, incolore.

Solubilité : Très soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther.

Saveur : Très acide.

Equivalence : 1 gr. = 39 gouttes.

Doses :

Jusqu'à 1 an.....	0 gr. 50 à 1 gr.
de 1 à 3 ans.....	1 gr. à 2 gr.
de 3 à 5 ans.....	2 gr. à 4 gr.
de 5 à 10 ans.....	4 gr. à 6 gr.

Exemple de formule :

Acide lactique.....	2 gr.
Essence de menthe.....	2 gouttes
Eau distillée.	40 gr.
Sirop de mûres .....q.s. pour	100 cme.

Lactose

Aspect : Poudre cristallisée.
Solubilité : Dans l'eau froide au 1/6e.
Saveur: Légèrement sucrée.

Doses :

de 10 à 100 gr. (selon l'âge et l'effet recherché)

Lactucarium

Utiliser l'extrait alcoolique ou le sirop de lactucarium.

Extrait alcoolique

Solubilité : Dans le sirop.
Incompatibilité : Alcalis.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
de 15 mois à 3 ans...	0 gr. 02 à 0 gr. 03
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 03 à 0 gr. 05
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15

Sirop

Dosé à 0 gr. 01 par cuillerée à soupe.

Le sirop de lactucarium est opiacé et renferme 0 gr. 005 d'extrait d'opium par cuillerée à soupe. Il n'existe plus au Codex.

Laitue

Employer l'extrait ou l'eau distillée de laitue.

Dose .

(Ad libitum)

Laurier-cerise (Eau de)

Aspect : Liquide sans couleur.
Solubilité : Miscible à la plupart des potions.
Saveur : Amère.
Incompatibilité : Calomel.
Equivalence : 1 gr. = XXII gouttes

Doses :

De 0 à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 3 ans.....	III gout. à X gouttes.
De 3 à 5 ans.....	X gout. à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 4 gr.

Exemple de formule :

Eau de laurier-cerise..... 4 gr.
Sirop de capillaire..... } ââ 4 gr.
Sirop de Tolu..... }
Eau de laitue, q. s. pour..... 120 cmc.

1 cuillerée à café contient environ 2 gouttes.

Lécithine

Formuler des dragées ou du Saccharolé :

Dosé à 0 gr. 05 par cuillerée à café.

Doses :

De 0 gr. 05 à 0 gr. 10 (enfants de 3 à 10 ans)

Levures

On utilise la levure de bière fraîche, la levure de bière desséchée, la levure de bière et de vin selectionnées (staphylase).

Levure de bière fraîche (2 fois par jour gros comme une noisette).

Levure desséchée (2 à 3 cachets de 0 gr. 50)

Staphylase (2 à 3 cuillerées à soupe)

Lichen d'Islande

Employer la teinture au 1/5e (à préparer).

Doses :

X gouttes par année d'âge (à partir de 3 ans).

Lierre terrestre

Employer le sirop (dose ad libitum).

Liniments

Médicaments servant à oindre ou frictionner la peau. Peuvent être liquides ou avoir la consistance de pommades.

Exemples de formules :

Liniment ammoniacal (Codex)

Ammoniaque liquide.....	10 gr.
Huile d'olive.....	90 gr.

Liniment ammoniacal camphré (Codex)

Huile camphrée.....	90 gr.
Ammoniaque liquide.....	10 gr.

Liniment chloroformé (Codex)

Chloroforme rectifié.....	10 gr.
Huile d'œillette.....	90 gr.

Liniment de Rosen (Codex)

Beurre de muscade.....	ââ 5 gr.
Essence de girofle...	
Essence de genièvre.....	ââ 2 gr.
Huile de ricin	
Alcool à 95°.....	86 gr.

Baume opodeldoch (Codex)

Le Baume opodeldoch couramment employé contient :

Savon animal râpé et desséché..	93 gr.
Camphre pulvérisé.....	75 gr.
Ammoniaque ordinaire.....	30 gr.
Essence de romarin.....	20 gr.
Essence de thym	5 gr.
Alcool à 90°.....	775 gr.

Il constitue une gelée incolore, légèrement opalescente, et fondant facilement à la chaleur de la main.

Baume de Fioraventi (Codex)

Le Baume de Fioraventi, également d'usage courant, contient :

Térébenthine de mélèze.....	50 gr.
Elemi.....	
Styrax liquide.....	
Galbanum.....	ââ 10 gr.
Myrrhe.....	
Baies de laurier.....	
Aloès.....	
Galanga.....	
Gingembre	
Ivedoaere.....	ââ 5 gr.
Cannelle de Ceylan.....	
Clous de girofle.....	
Muscade.....	
Dictame de Crète.....	
Alcool à 30°.....	300 gr.

C'est un liquide limpide, incolore, se troublant par addition de son volume d'eau.

On emploie aussi comme liniments, certaines huiles ou certains alcoolats :

ρ) L'huile de Jusquiame au 1/10e (Codex).

β) L'huile de camomille au 1/10e (Codex).

λ) L'huile de camomille camphrée au 1/10e (Codex).

ζ) L'huile camphrée au 1/10e (Codex).

Baume tranquille (Codex)

C'est de l'huile de Jusquiame composée dont la composition est la suivante :

Feuilles sèches de Belladone...	
— Jusquiame..	
— Morelle.....	ââ 5 gr.
— Pavot.....	
— Stramoine..	
Essence de Lavande.....	
— Menthe.....	ââ 0 gr. 10
— Romarin	
— Thym	
Alcool à 95o.....	20 gr.
Huile d'œillette.....	500 gr.

Parmi les alcoolats on emploie :

ρ) L'eau-de-vie camphrée (Codex).

β) L'eau sédative (Codex).

Ammoniaque liquide.....	ââ 60 gr.
Nacl	
Acool camphré.....	10 gr.
Eau distillée	1000 gr.

Formules diverses

I.

Essence de térébenthine ..... } ââ
Baume de Fioraventi..... }

II.

Laudanum..... XX gouttes.
Chloroforme..... 10 gr.
Baume tranquille..... 40 gr.

III.

Huile de Jusquiame..... } ââ
Huile de camomille camphrée.. }

IV.

Menthol..... }
Camphre..... ..... } ââ 5 gr.
Hydrate de chloral..... }
Huile de camomille..... 40 gr.

V.

Alcool camphré ..... } ââ 80 gr.
Alcoolat de genièvre..... }
— lavande ..... 60 gr.
Chloroforme ..... } ââ 15 gr.
Teinture d'opium..... }

Liqueur de Labarraque

Composition :

Chlorure de chaux sec officinal.. 25 gr.
Carbonate neutre de soude cristallisé..... 50 gr.
Eau distillée..... 1125 gr.

Aspect : Liquide d'odeur chlorée

S'emploie seulement en solution diluée (4 cuillerées à soupe par litre d'eau) pour lavages.

Lithine

On emploie le benzoate et le carbonate.

Benzoate de lithine

Aspect : Poudre blanche.
Solubilité : Dans l'eau.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50

Exemple de formule :

Benzoate de lithine.....
Extrait de stigmates de maïs...) ââ 0 gr. 05

Par pilule.

Carbonate de lithine

Aspect : Sel blanc cristallisé.
Solubilité: Dans l'eau au 1/10e.

Doses :

Comme le benzoate.

Exemple de formule :

Carbonate de lithine.....	10 gr.
Acide citrique.....	40 gr.
Bicarbonate de potasse.....	50 gr.

En granulé. (Une cuillerée à café contient 0 gr. 20).

Lobelie enflée

Employer l'extrait fluide à parties égales ou la teinture de feuilles au 1/10e.

Extrait fluide à parties égales

(de Dausse)

Solubilité : Dans l'alcool et la glycérine. Précipite par l'eau.

Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

1 goutte par année d'âge.

Teinture de feuilles au 1/10e.

Aspect : Liquide brun verdâtre.

Solubilité : Alcool, glycérine, sirop.

Saveur : Amère et âcre.

Equivalence : 1 gr. = 58 gouttes.

Doses :

de 3 à 5 ans.....	X à XXX gouttes.
de 5 à 10 ans....	XXX gouttes à 1 gr.

Exemple de formule :

Teinture de lobelie au 1/10.....	2 gr.
Alcool..... / Glycérine.....	ââ 10 gr.
Sirop d'éther..... / — de Belladone.....	aâ 20 gr.
— de Tolu.....q. s. pour	120 eme.

Lycopode

Aspect : Poudre fine, mobile, d'une teinte jaune pâle et d'une odeur résineuse.

Flotte sur l'eau et se mouille difficilement.

S'emploie presque exclusivement pour l'usage externe.

Magnésie calcinée

On trouve dans les pharmacies deux sortes de magnésie, la magnésie légère et la magnésie lourde (ou anglaise). La première se délaye assez mal dans l'eau en formant des grumeaux, la seconde se mêle assez bien à l'eau et est plus active que la première.

Aspect : Poudre amorphe, blanche, très légère.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

Saveur : Pas de saveur, ni d'odeur.

Incompatibilités : Carbonates alcalins, chlorate de potasse, sels arsenicaux, arséniate de soude, borate de soude.

Doses :

de 0 à 15 mois	1 à 2 gr.
de 15 mois à 3 ans	2 à 3 gr.
de 3 à 5 ans	3 à 4 gr.
de 5 à 10 ans	4 à 5 gr.

Exemples de formules :

Bicarbonate de soude
Magnésie calcinée } ââ 0 gr.
Craie préparée

Par paquet, à chaque repas comme antiacide.

Ou :

Magnésie calcinée ..... 4 gr.

Sucre.....	40 gr.
Eau de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	100 cme.

Comme laxatif ou purgatif.

Ou :

Magnésie anglaise.....	
Suere.....	ââ 4 gr.
Poudre d'anis.....	
Poudre de senè.....	16 gr.
Poudre de feuilles d'oranger....	12 gr.
Essenee de menthe.....	q. s.

(1/2 à cuillerée à café le soir).

Ou :

Magnésie.....	
Fleur de soufre.....	ââ 0 gr. 25
Crème de tartre.....	

(Par paquet).

Magnésie (Chlorure de)

Aspect : Sel blanc.
Solubilité: Dans l'eau froide et l'alcool.

Doses :

1 gr. par année d'âge.

Magnésie (Tartrate de)

Comme le citrate.

Magnésie (Citrate de M...)

Aspect : Poudre blanche, amorphe, granuleuse.

Saveur : Presque nulle. Inodore.

Solubilité : Dans 2 parties d'eau chaude. Insoluble dans l'alcool.

Incompatibilités : Acides et sels acides.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	1 gr. à 2 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	2 gr. à 4 gr.
De 3 à 5 ans.....	4 gr. à 8 gr.
De 5 à 12 ans.....	8 gr. à 12 gr.

Exemples de formules :

I.

Citrate de magnésie granulé effervescent à 40 pour 100.

II.

Citrate de magnésie.....	10 gr.
Sirop de cerises.....	40 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	90 cmc.

III. Limonade citro-magnésienne du Codex :

Acide citrique..	32 gr.
Hydrocarbonate de magnésie. ..	20 gr.
Eau distillée.....	300 gr.
Sirop de cerise.....	100 gr.
Alcoolature de citron.....	1 gr.

Cette limonade contient 50 gr. de citrate de magnésie, mais on peut la doser à 40, 30 gr. ou même moins.

Sulfate de magnésie

Aspect : Sel incolore.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Saveur : Un peu amère et nauséeuse.

Incompatibilités : Alcalis, carbonates alcalins, phosphates solubles, sels de chaux, de plomb, de strontium, borates.

Doses :

de 0 à 3 ans.....	Abstention
de 3 à 5 ans.....	3 à 6 gr.
de 5 à 10 ans.....	6 à 15 gr.

Exemple de formules :

Sulfate de magnésie.....	6 gr.
Bicarbonate de soude.....	2 gr.
Essence de menthe.....	4 gouttes.
Eau.....	100 gr.

Ou :

Sulfate de magnésie.....	6 gr.
Infusion de café	80 gr.
Sirop de sucre.....q. s. pour	120 cmc.

Carbonate de magnésie

Aspect : Poudre blanche légère.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'eau de Seltz.

Saveur : Savonneuse.

Incompatibilité : Avec les acides.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 30
de 15 mois à 3 ans ...	0 gr. 30 à 0 gr. 50
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 0 gr. 60
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 60 à 1 gr.

Exemples de formules :

Carbonate de magnésie..... 0 gr. 50
Julep gommeux..... } ââ 20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges..... }
Eau de tilleul.....q. s. pour 60 cmc.

Maïs

Employer l'extrait aqueux ou le sirop de stigmates.

Extrait aqueux

Aspect : Masse molle soluble dans l'eau.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge.

Sirop

Dosé au 1/20e d'extrait (Une cuillerée à soupe contient environ 0 gr. 25 d'extrait).

Maltine (ou diastase)

Aspect : Poudre amorphe, de couleur blanc jaunâtre.

Solubilité : Dans l'eau, un peu dans l'alcool faible, presque incomplètement dans l'alcool fort.

Saveur : Comparable à la pepsine, rappelant un peu la brioche.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 3 à 12 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Maltine (titre 100).....	5 gr.
Glycérine.....	15 gr.
Sirop simple.....	80 gr.

(Une cuillerée à soupe contient 1 gr. de Diastase titre 100).

Ou :

Maltine (titre 100).....	5 gr.
Glycérine pure.....	15 gr.
Sirop simple.....	25 gr.
Alcoolat de Garus.....	10 gr.
Eau distillée.....	45 gr.

(Une cuillerée à soupe contient 1 gr. de Diastase titre 100).

Ou :

Pepsine .....
Maltine..... } ââ 0 gr. 05
Pancréatine .....
Bicarbonate de soude..... 0 gr. 20

(Par cachet ou paquet).

Manganèse

On emploie le carbonate, le bioxyde, le protochlorure et le sulfate.

Carbonate de manganèse

Aspect : Poudre amorphe blanc rosé.
Saveur : Nulle.
Solubilité : Insignifiante dans l'eau.

Doses :

de 5 à 12 ans..... 0 gr. 05 à 0 gr. 10

Exemple de formule :

Pilules de carbonate de manganèse de 0 gr. 05

Protochlorure de manganèse

Aspect: Cristaux transparents, rosés, déliquescents.

Solubilité : Dans l'eau.

Saveur : Astringente.

Doses : Comme le carbonate.

Exemple de formule :

Protochlorure de manganèse en dragées de 0 gr. 05.

Sulfate de manganèse

Aspect : Cristaux volumineux, transparents, rose pâle.

Saveur : Styptique.

Solubilité : Dans l'eau.

Doses : Comme le carbonate.

Bioxyde de manganèse

Aspect : Masse noire compacte.

Solubilité : Nulle.

Doses : Comme le carbonate.

Permanganate de potasse

Surtout employé pour l'usage externe.

S'emploie à l'intérieur associé à l'arsenic :

Arséniate de soude.....	0 gr. 25
Permanganate de potasse	5 gr.
Eau distillée	95 gr.

Doses :

de 5 à 12 ans..... de V à X gouttes

Manne (en larmes)

Aspect : Morceaux stalactiformes aplatis, poreux, friables, de couleur jaune pâle.

Solubilité : Eau, lait (surtout à chaud).

Saveur : Agréable et sucrée, devenant légèrement âcre et amère.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	5 gr. à 10 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	10 gr. à 15 gr.
De 3 à 5 ans.....	15 gr. à 20 gr.
De 5 à 12 ans.....	20 gr. à 30 gr.

Exemples de formules :

I.

Tablettes de manne dosées à.... 0 gr. 20

II.

Manne en larmes.....
Miel blanc..... } ââ 100 gr.
Magnésie calcinée..... 15 gr.

(D. S. A.)

III.

Manne .....
Miel blanc..... } ââ 20 gr.
Eau de fleurs d'oranger..... 10 gr.
Sirop de cerises .....q. s. pour 100 cmc.

IV.

Manne en larmes.....	
Casse cuite.....	ââ 50 gr.
Huile d'amandes douces.....	
Sucre blanc concassé.....	
Infusion concentrée de café	75 gr.

V.

Manne en larmes.....	60 gr.
Eau à 15°.....	80 gr.
Sucre.....	150 gr.

Pour faire un sirop de manne, très recommandable.

Entre dans la composition de la médecine noire du Codex :

Folioles de séné mondées.....	10 gr.
Rhubarbe de Chine concassée....	5 gr.
Sulfate de soude officinal.....	15 gr.
Manne en larmes.....	60 gr.
Eau distillée bouillante.....	100 gr.

Mannite

Aspect : Cristaux blancs.

Solubilité : Dans l'eau.

Saveur : Légèrement sucrée.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 20
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 05 à 0 gr. 40
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 40 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 5 gr.

Exemple de formule :

Mannite.....	0 gr. 40
Infusion de tilleul.....	100 cmc.

Mauve

En infusion à 10 p. 1000.

Mélisse

Utiliser l'alcoolat de Mélisse composé.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	1 à 2 gr.
de 15 mois à 3 ans.....	2 à 4 gr.
de 3 à 5 ans.....	4 à 6 gr.
de 5 à 12 ans.....	6 à 10 gr.

Exemple de formule :

Alcoolat de Mélisse	20 gr.
Sirop de Lierre terrestre.....	40 gr.
Eau de laitue.....q. s. pour	100 cmc.

Menthe

Utiliser la teinture d'essence de menthe (0 gr. 10 par année d'âge) ou les pastilles d'essence de menthe (de 2 à 10 par jour).

Menthol

S'emploie en pastilles ou dragées associées à la cocaïne et au Borate de soude. S'emploie également en vaporisations ou pulvérisations dissous dans l'alcool ou incorporé à l'huile. Pour l'usage externe, le Codex indique l'huile de vaseline mentholée à 1 à 2 p. 100, ou la vaseline mentholée aux mêmes doses.

Ményanthe

Utiliser le sirop, (10 gr. par année d'âge).

Mercure

Les principales préparations employées en thérapeutique infantile sont : l'onguent mercuriel, l'huile grise, le mercurium cum creta, le mercure colloïdal, le protoiodure, le biiodure, le sublimé, le benzoate, le cacodylate iodo-hydrargyrique le peptonate d'hydrargyre, le lactate de mercure, l'onguent à l'amalgame d'argent, l'huile à l'amalgame d'argent.

Onguent mercuriel

Aspect : Pommade grise renfermant parties égales de mercure métallique et d'axonge benzoïnée.

Doses : L'employer dédoublé chez les enfants :

Onguent napolitain.....
Axonge benzoïnée..... } aâ

Une friction tous les 2 ou 3 jours avec gros comme une noisette, jusqu'à concurrence de 8 à 10 frictions.

Frictions faites sur la face interne des cuisses, aux plis du coude, aux jarrets, aux aisselles.

Etaler une partie de l'onguent et frotter avec une peau de chamois dont on aura garni un corps

dur, mousse et un peu aplati, comme un manche de coupe-papier en bois, par exemple.

Au fur à mesure que l'onguent s'absorbe, en ajouter une nouvelle quantité. Ne pas laver après la friction, mais recouvrir de ouate ou de flanelle. Nettoyer à l'eau chaude et au savon le lendemain matin seulement.

Huile grise

Aspect : Solution soit sirupeuse, épaisse, grise, dans le cas de la formule du Codex, ou assez liquide, nettement huileuse dans la formule Vigier-Lesure.

La formule du Codex est la suivante :

Mercure purifié.....	40 gr.
Graisse de laine.....	26 gr.
Huile de vaseline.....	60 gr.

Elle représente 40 centigrammes de mercure métallique par centimètre cube.

Quelle que soit la formule de l'huile grise, l'agiter fortement au moment de l'emploi.

L'injection se fait profondément, intra-musculaire, à l'aide d'une seringue de Barthélemy de 1/4 de centimètre cube.

La demi-seringue de Barthélemy contient 0 gr. 05 de mercure métallique dans le cas de la formule du Codex et 64 milligrammes avec l'huile grise Vigier-Lesure.

Doses :

Ne pas l'utiliser avant 3 ou 4 ans.

De 4 à 6 ans	2 à 4 cg. par semaine.
De 6 à 12 ans.....	4 à 6 cg. par semaine.

Faire des séries de 5 à 8 injections.

Pour calculer les doses, retenir que la seringue de Barthélemy présente 14 divisions et qu'une division correspond par conséquent à 0,007 milligrammes environ de mercure métallique dans la formule du Codex et à 0,009 dans la formule Vigier-Lesure.

Mercurium cum creta

Aspect : Poudre blanche.

Doses :

De 1 à 6 mois.....	0 gr. 03 à 0 gr. 06

Exemple de formule :

Mercurium cum creta.....	0 gr. 02
Sucre de lait	0 gr. 10

A donner dans du lait.

Mercure colloïdal (Electr. Hg.)

Employer une solution isotonique stérilisée de mercure colloïdal en ampoules de 3 cmc. dosées à 1/2 milligramme par centimètre cube.

Aspect : Liquide brun rougeâtre par transparence, gris par réflexion.

Doses :

Une injection profonde une ou deux fois la semaine.

Protoiodure de mercure

Aspect : Poudre amorphe, jaune verdâtre.

Solubilité : Nulle.

Incompatibilités : Acides, Alcalis, Chlorures, Bromures, Iodures, Sulfures.

Doses :

De 3 à 6 ans	0 gr. 01 à 0 gr. 03
De 6 à 12 ans	0 gr. 03 à 0 gr. 05

Exemple de formule :

Protoiodure d'hydrargyre.....	0 gr. 02
Extrait thébaïque	0 gr. 005

Par pilule.

(Surveiller la médication).

Biiodure de mercure

Aspect : Sel amorphe, rouge.

Solubilité : Dans l'alcool, l'éther, les huiles, les matières grasses, les solutions de chlorures, bromures, iodures.

Incompatibilités : Alcalis, carbonates alcalins, lumière.

Doses :

S'emploie sous forme de sirop de Gibert :

Bi-iodure de mercure.....	0 gr. 50
Iodure de potassium..... }	ââ 25 gr.
Eau distillée..... }	
Sirop simple.....	950 gr.

(Une cuillerée à soupe renferme 0 gr. 01 de bi-iodure et 0 gr. 50 de KI).

Au-dessous de 1 an.	1/3 à 1/2 cuillerée à café.
A 2 ans.....	1 cuillerée à café.
De 3 à 5 ans	2 à 3 cuillerées à café.
De 5 à 10 ans.....	1/2 à 1 cuillerée à soupe.

(En plusieurs fois dans une potion).

On peut formuler plus simplement.

Bi-iodure d'Hydrargyre	0 gr. 10
Iodure de potassium	30 gr.
Eau	150 gr.
Sirop de sucre..... q. s. pour	300 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 5 milligr. de bi-iodure. En donner 1 à 2 par jour).

Sublimé

S'emploie sous forme de liqueur de Van Swieten.

Equivalence : 1 gr. = 0 gr. 001 milligramme de sublimé = XX gouttes.

Doses :

De 0 à 2 ans.....	II à XX gouttes.
De 2 à 3 ans.....	XX gouttes à 2 gr.
De 3 à 5 ans.....	2 gr. à 4 gr.
De 5 à 10 ans.....	4 gr. à 10 gr.

(A donner dans du lait).

Benzoate d'hydrargyre

Aspect : Poudre blanche cristallisée, peu stable, obtenue par double décomposition.

Solubilité : En présence d'autres benzoates ; ou dans une solution de chlorure de sodium.

Exemple de formule :

Benzoate de mercure.....	0 gr. 30
Benzoate d'ammoniaque.....	1 gr. 50
Eau distillée bouillie.....	30 gr.

(Par injections hypodermiques).

Doses :

De 2 à 4 injections de 1 cmc. par semaine. passé 6 ans seulement.

Cacodylate iodo-hydrargyrique

Exemple de formule :

Biiodure d'Hg.....	0 gr. 05
Iodure de sodium..... }	âà 0 gr. 06
Chlorure de sodium..... }	
Cacodylate de soude.....	0 gr. 30
Eau distillée..... q. s. pour	10 cmc.

A diviser en ampoules de 1 cmc.

Doses :

2 à 4 injections par semaine, passé 6 ans seulement.

Peptonate de mercure

Exemple de formule :

Pilules molles de peptonate de mercure dosées à 0 gr. 005 de sublimé (Lesure).

Doses : (1 à 2 pilules par année d'âge). Se baser sur la posologie du sublimé qui est la suivante :

De 0 à 2 ans.....	1/2 mmg.	à	3/4 de mmg.
De 2 à 3 ans.....	3/4 mmg.	à	0 gr. 002
De 3 à 7 ans.....	0 gr. 002	à	0 gr. 005
De 7 à 10 ans.....	0 gr. 005	à	0 gr. 01
De 10 à 15 ans.....	0 gr. 01	à	0 gr. 02

(Surveiller la médication).

Lactate de mercure

Aspect : Cristaux brillants.

Solubilité : Dans l'eau.

On emploie la solution au millième de lactate mercurique.

Doses :

1/3 plus élevées que les doses de liqueur de Van Swieten.

Exemple de formule :

Solution au millième de lactate mercurique..... 50 gr.
Julep gommeux..... q. s. pour 100 cme.

Amalgame d'argent (Arqueritol)

S'emploie de deux façons, soit en frictions, soit en injections intra-musculaires.

Pour les frictions : employer l'onguent à l'amalgame d'argent à 16 p. %. Une friction quotidienne.

Pour les injections : employer l'huile à l'amalgame d'argent soit à 16 p. % en volume (1 cmc. contient 0 gr. 16 de Hg.) soit à 40 p. % en volume (1 cmc. contient 0 gr. 40 de Hg.).

Aspect : Huile grise, assez consistante, contenant une infinité de petits points brillants.

Doses : Nous conseillons, chez les enfants, d'en rester ordinairement à l'huile à 16 p. %. Une seringue de Barthélemy représente 0 gr. 04 de mercure métallique plus l'argent.

De 3 à 6 ans...	1/2 à 1 seringue de Barthélemy par semaine.
De 6 à 12 ans..	1 seringue de Barthélemy par semaine.
De 12 à 20 ans.	1 à 2 seringues de Barthélemy selon la néeessité.

Faire des séries de 6, 8, 10 et même 12 piqûres. Les doses peuvent être augmentées en cas de nécessité.

Si on veut avoir recours à des doses plus fortes, employer l'huile à 40 p. %, et injecter la quantité désirée.

Faire la piqûre dans les museles de la fesse, loin du sciatique, profondément, et sans aller jusqu'à l'os. Anesthésier localement la peau par une pulvérisation de Kelène ou de chlorure d'éthyle. Introduire brusquement et à la profondeur voulue l'aiguille seule (employe rdes aiguilles de platine iridié ou de nickel pur stérilisées). S'il ne sort pas de sang par l'aiguille, agiter la seringue et pousser lentement l'injection. Retirer brusquement et en deux temps l'aiguille. Lavage à l'eau de Cologne.

D'après notre expérienee, les injections d'arqueritol sont indolores, exemptes de dangers, ne produisent pas d'induration et elles sont la méthode de choix chez les enfants qui ont plus de 3 ans. Nous les préférons, sans aueune eomparaison, à toutes les autres piqûres. Les doses peuvent être graduées à volonté et selon les besoins. Les injections *bien faites* sont inoffensives.

Amalgame de platine

Mêmes doses, mêmes formules, même emploi que l'amalgame d'argent.

Mercuriale

Employer le miel de Mercuriale en lavements seulement :

Doses :

de 6 mois à 5 ans.....	10 à 25 gr.
de 5 à 10 ans.....	25 à 40 gr.

Métaux ferments

On désigne sous ce nom les métaux transformés à l'état colloïde, en grains fins ultra-microscopiques. On peut les obtenir aussi par voie chimique, mais ils sont plus purs lorsqu'ils sont obtenus directement par l'électricité. On utilise :

l'argent colloïdal électrique,
l'or colloïdal électrique,
le platine colloïdal électrique,
le palladium colloïdal électrique,
le mercure colloïdal électrique.

Monosulfure de sodium

Aspect : Cristaux transparents et incolores.

Solubilité : Déliquescent et très soluble dans l'eau. Peu soluble dans l'alcool.

Saveur : Légèrement piquante et sulfureuse. Odeur sulfureuse.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 03

Incompatibilités : Sels acides, sels des métaux, solutés acides.

Exemple de formule :

Monosulfure de sodium cristallisé	1 gr.
Liqueur de goudron alcaline....	50 gr.
Sirop de sucre	950 gr.

(20 grammes représentent 0 gr. 02 de monosulfure de sodium).

Mousse de Corse

Employer la poudre et le sirop.

Poudre

de 0 à 15 mois.....	1 à 2 gr.
de 15 mois à 3 ans.....	2 à 3 gr.
de 3 à 5 ans.....	3 à 5 gr.
de 5 à 12 ans.....	5 à 10 gr.

En décoction sucrée à donner dans du lait.

Sirop de mousse de Corse

Equivalence : Une cuillerée à soupe représente environ 3 gr. de mousse de Corse.

Muguet

Utiliser l'extrait aqueux.

Aspect : Masse brun jaune.

Solubilité : Dans l'eau, le sirop.

Doses :

de 0 à 3 ans.....	Abstention.
de 3 à 5 ans	0 gr. 25 à 0 gr. 50
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Extrait de Muguet.....	4 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères	100 cme.

Musc (en nature)

Aspect : Masse noire.

Solubilité : Incomplètement soluble dans l'eau, mais peut s'émulsionner.

Saveur : Amère, odeur forte.

Incompatibilités : Camphre, soufre, kermès, antimoniaux, eau de laurier-cerise, alcalins, quinquina, ergot de seigle.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 02 à 0 gr. 05
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30

Exemple de formule :

Musc.....	0 gr. 60
Bromure de potassium.....	1 gr.
Gomme arabique.....	4 gr. .
Eau de cannelle.....	80 gr.
Sirop d'écorees d'oranges amères, q. s. pour.....	120 eme.

Teinture de musc au 1/10e

Aspect : Liquide brun rougeâtre foncé.

Solubilité : Se trouble par addition d'eau.

Incompatibilités : Looch, sirop d'orgeat, d'aman-

des amères, eau de laurier-cerise, sulfures alcalins, quinquina, ergot de seigle.

Equivalence : 1 gr. = 60 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	V g. à	X gouttes.
De 15 mois à 3 ans.	X g. à	XX gouttes.
De 3 à 5 ans.....	XX g. à	XXX gouttes.
De 5 à 12 ans.....	XXX g. à	1 gr.

Exemple de formule :

Teinture de musc.....	XX gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Eau distillée, q. s. pour.....	60 cmc.

Ou en lavement.

Naphtolate de soude

Aspect : Masse blanc grisâtre, pulvérisée.
Solubilité : A 5 p. 1000.
S'emploie comme antiseptique pour usage externe.

Naphtol β

Aspect : Lamelles micacées, incolores, brillantes.
Solubilité : Dans l'alcool, très peu dans l'eau.

Saveur : Acre et piquante.

Incompatibilité : Camphre.

Doses :

De 1 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 50
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formules :

Naphtol β.....	âà 0 gr. 10
Magnésie.....	

Par cachet.

Ou :

Naphtol β.....	1 gr.
Looch huileux.....	75 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 20). A donner par cuillerées à soupe dans du lait.

Nerprun

Utiliser le sirop.

Doses :

de 0 à 15 mois.....	3 à 5 gr.
de 15 mois à 3 ans.....	5 à 10 gr.
de 3 à 5 ans.....	10 à 15 gr.
de 5 à 12 ans.....	15 à 20 gr.

Exemple de formule :

Sirop de Nerprun.....	15 gr.
Sirop de limons.....	100 gr.
Eau de menthe.....q. s. pour	150 cmc.

Nitrate de potasse

Aspect : Sel incolore cristallisé.
Solubilité : Dans 4 parties d'eau froide.
Saveur : Fraîche, piquante et amère.
Incompatibilités : Soufre, charbon.

Doses :

De 1 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 50 à 2 gr.

Exemples de formules :

Nitrate de potasse.....	2 gr.
Teinture de seille.....	2 gr.
Sirop des cinq raeines... q. s. p.	60 eme.

On utilise souvent la poudre diurétique suivante : (Codex) :

Poudre de nitrate de potasse....	10 gr.
— gomme.....	60 gr.
— guimauve.....	10 gr.
— réglisse.....	20 gr.
— suere de lait.....	60 gr.

(En paquets de 10 gr.).

On met un de ces paquets dans un litre de tisane de chiendent.

Nitrite de soude

Aspect : Cristaux blancs, déliquescents.
Solubilité : Très grande.

Doses :

de 5 à 12 ans..... 0 gr. 02 à 0 gr. 10

Exemple de formule :

Nitrite de soude..... ..... 1 gr.
Eau distillée..... 60 gr.
Sirop d'écorees d'oranges, q.s. pour 100 cmc.

Noix vomique

On emploie l'extrait, la teinture de semences, la strychnine.

Extrait de noix vomique

Aspect : Extrait pulvérulent de couleur brune.
Solubilité : Solution trouble dans l'eau.
Saveur : Très amère.
Incompatibilités : Iodures, arséniate de soude, phosphate neutre de soude.

Doses :

Au-dessous de 15 mois. Abstention.
De 15 mois à 3 ans..... 0 gr. 001 à 0 gr. 003
De 3 à 5 ans..... 0 gr. 003 à 0 gr. 006
De 5 à 12 ans..... 0 gr. 006 à 0 gr. 012

Exemple de formule :

Extrait de noix vomique..... 0 gr. 001
Poudre de gentiane..... q. s.

Par pilule.
(D. S. A.)

Teinture de noix vomique au 1/10e

Aspect : Liquide jaune clair.
Solubilité : Se trouble par addition d'eau.
Saveur : Amère.
Incompatibilités : Comme l'extrait.
Equivalence : 1 gr. = 56 gouttes.

Doses :

de 6 à 15 mois..... Abstention.
de 15 mois à 3 ans..... V à X gouttes.
de 3 à 5 ans..... X à XV gouttes.
de 5 à 10 ans..... XV à XX gouttes.

Exemple de formule :

Teinture de noix vomique.....
— badiane..... } ââ 2 gr.
— rhubarbe.....
— colombo.....

Rhum ..... } ââ 10 gr.
Glycérine..... }
Elixir de Garus.. .....q.s pour 140 cmc.

(Une cuillerée à café contient IV gouttes ; si on ne met qu'un gramme, la cuillerée à café contient II gouttes).

Sulfate de Strychnine

Aspect : Aiguilles blanches.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Saveur : Amère.

Incompatibilités : Arséniate de soude, Phosphate de soude, Bromure de potassium, Chloral.

Doses :

de 6 à 15 mois.....	1/5 à 1/2 mmgr. par jour
de 15 mois à 5 ans.....	1/2 à 1 mmgr. 1/2
de 5 à 10 ans.....	1 à 2 mmgr.

Exemples de formules :

Granules dosimétriques de 1/2 mmgr.

Ou :

Sulfate de strychnine.....	0 gr. 01
Sirop de sucre.....	100 cmc.

(Une cuillerée à entremets contient 1 milligramme).

Noyer

Utiliser le sirop de noyer.
Incompatibilités : Sels de fer, de gélatine.

Doses :

5 gr. par année d'âge.

Nucléïne

S'emploie en saccharolé glycérophosphaté dosé à 0 gr. 025 par cuillerée à café.

Doses :

2 cuillerées à café.

Ou en sirop :

Nucléïne pure.....	0 gr. 50
Glycérophosphate de soude à 50 p. 0/0.....	2 gr. 50
Sirop simple.....	70 gr.
Elixir de Garus, q. s. pour.....	90 cmc.

(1 à 2 cuillerées à café).

Opium

On utilise : la poudre d'opium, l'extrait d'opium, le sirop diacode, le laudanum de Sydenham, l'élixir parégorique, le diascordium, la teinture d'extrait d'opium, la poudre de Dower, la masse de Cynoglosse, la morphine, la codéine, le phosphate de codéine, la narcéine, l'héroïne, la dionine.

Poudre d'opium

Aspect : Poudre brun-rouge.

Saveur : Acre et amère.

Solubilité : Incomplètement soluble dans les dissolvants habituels. (Les principes actifs se dissolvent, mais pas la partie végétale ligneuse, résineuse).

Incompatibilités : Tannin, carbonates alcalins, eau de chaux, sels de cuivre, de fer, de plomb, de zinc, liqueur de Fowler.

Equivalence : 1 gr. = 0 gr. 10 de morphine.

Doses :

Jusqu'à 1 an	Abstention.
De 1 à 2 ans.....	0 gr. 002
De 2 à 3 ans.....	0 gr. 003
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 004
De 5 à 12 ans, 0 gr. 004 à....	0 gr. 01

Exemple de formule :

Poudre d'opium.....	0 gr. 02
Extrait de gentiane.....	q. s.

(A diviser en 10 pilules).

Extrait d'opium

Aspect : Extrait ferme élastique, brun rougeâtre.
Solubilité : Dans l'eau au 1/50e.
Saveur : Amère, odeur prononcée.
Equivalence : 1 gr. = 0 gr. 20 de morphine. (action double de la poudre d'opium).

Doses :

De 5 à 12 ans.....	0 gr. 002 à 0 gr. 005

Exemple de formule :

Extrait d'opium.....	0 gr. 01
Eau distillée.....	20 gr.
Sirop simple, q. s. pour.....	80 cmc.

Teinture d'extrait d'opium au 1/20e

Aspect : Liquide brun rougeâtre.
Solubilité : Se trouble dans l'eau.
Saveur : Amère, odeur vireuse.
Equivalence : 1 gr. = 0 gr. 01 de morphine.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	IV à VI gouttes.
De 3 à 5 ans.....	VI à XV gouttes.
De 5 à 10.....	XV à XXX gouttes.

Exemple de formule :

Teinture d'extrait d'opium au 1/20e	1 gr.
Alcool ..... }	ââ 10 gr.
Glycérine ..... }	
Sirop simple, q. s. pour.....	120 cmc.

Sirop diacode

Equivalence : 20 gr. contiennent un centigramme d'extrait d'opium.

Doses :

Jusqu'à 6 mois.....	Abstention.
De 6 mois à 5 ans.....	2 gr. à 5 gr.
De 5 à 10 ans.....	5 gr. à 10 gr.

Exemple de formule :

Sirop diacode..... }	ââ 20 gr.
Sirop de Desessartz..... }	
Eau de fleurs d'oranger.....	40 gr.
Sirop de Tolu, q. s. pour.....	120 cmc.

Laudanum de Sydenham

Aspect : Liquide jaune foncé.

Solubilité : Dans l'eau et dans l'alcool ; insoluble dans les huiles.

Saveur : Amère et odeur de safran.

Incompatibilités : Teinture d'iode, iodures alcalins, sels métalliques solubles.

Equivalence : 1 gr. = 43 gouttes = 0 gr. 01 de morphine = 0 gr. 10 d'opium = 0 gr. 05 d'extrait.

La formule est la suivante :

Poudre d'opium	100 gr.
Safran	50 gr.
Essence de cannelle de Ceylan, Essence de girofle	aâ 1 gr.
Alcool à 30°	1000 gr

Doses :

de 0 à 3 mois	1/2 goutte
de 3 à 6 mois	1/2 à 3/4 de goutte
de 6 mois à 1 an	3/4 de goutte à 1 goutte 1/2
de 1 à 2 ans	I à III gouttes
de 2 à 3 ans	III à V gouttes
de 3 à 5 ans	V à VII gouttes
de 5 à 10 ans	VII à XII gouttes

Exemple de formule :

Laudanum de Sydenham	XX gouttes
Eau de laurier-cerise	5 gr.
Eau de tilleul	40 gr.
Sirop de sucre q.s. pour	100 cme.

Ou en lavement.

Elixir parégorique

La formule est la suivante :

Poudre d'opium Acide benzoïque Essence d'anis	ââ 5 gr.
Camphre	2 gr.
Alcool à 60°	935 gr.

Aspect : Liquide jaune-brun.

Saveur : Douceâtre, odeur anisée.

Solubilité : Miscible à l'eau, mais en se troublant.

Equivalence :

20 grammes = 0,10 cg. de poudre d'opium = 0 gr. 05 d'extrait d'opium = 0,01 cg. de morphine.

1 gramme = 53 gouttes.

Doses :

Jusqu'à 6 mois	I à X gouttes
de 6 mois à 1 an	X à XX gouttes
de 1 à 2 ans	XX à XL gouttes
de 2 à 3 ans	XV g. à 2 gr.
de 3 à 5 ans	2 à 10 gr.
de 5 à 10 ans	10 à 20 gr.

Exemple de formule :

Elixir parégorique	10 gr.
Sous-nitrate de Bismuth	10 gr.
Sirop de cachou	20 gr.
Julep gommeux.....q.s. pour	120 cmc

Diascordium

Aspect : Masse pâteuse rouge.

Saveur : Astringente, odeur aromatique.

Equivalence :

N'existe plus au Codex 1908, mais 1 gramme équivaut à : 0 gr. 006 d'extrait d'opium.

Doses :

Jusqu'à 15 mois.....	Abstention
de 15 mois à 3 ans....	0 gr. 10 à 0 gr. 30
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 30 à 1 gr.
de 5 à 12 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Diascordium	ââ 2 gr.
Sous-nitrate de Bismuth.....	
Julep gommeux.....	100 gr.

Poudre de Dower

Composition :

Azotate de potasse	ââ 40 gr.
Sulfate de potasse.....	
Poudre d'ipéca	ââ 10 gr.
Poudre d'opium.....	

Aspect : Gris clair.

Solubilité : Incomplètement soluble dans l'eau.

Saveur : Salée, un peu piquante.

Equivalence : 1 gr. = 0 gr. 10 de poudre d'opium et 0 gr. 10 de poudre d'ipéca.

Doses :

de 0 à 3 ans.....	Abstention
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 40

Exemple de formule :

Poudre de Dower.....	1 gr.
Magnésie anglaise.....	2 gr.
Teinture de Benjoin	L gouttes
Julep gommeux.....	80 cmc.

Cynoglosse (Masse de)

Les pilules de cynoglosse opiacées du Codex pèsent 0 gr. 20 et contiennent 0 gr. 02 d'extrait d'opium et 0 gr. 02 de poudre de semences de jusquiame.

Morphine (Chlorhydrate de ...)

On emploie le chlorhydrate de morphine ou le sirop de morphine.

Aspect : Cristaux incolores à éclat soyeux.

Saveur : Fortement amère. Inodore.

Solubilité : Dans 25 parties d'eau froide ; très soluble dans l'eau chaude ; dans l'alcool, la glycérine.

Incompatibilités : Bases alcalines, permanganate de potasse, carbonates alcalins, tanin, solution iodo-iodurée.

Doses :

De 1 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 005 à 0 gr. 01
De 5 à 10 ans	0 gr. 01 à 0 gr. 02

Exemple de formule :

Chlorhydrate de morphine.....	1 gr.
Eau distillée.....	49 gr.

(Un gramme renferme 0 gr. 02 et X gouttes en contiennent 0 gr. 01)

A utiliser en injections hypodermiques (1/4 de seringue à 1/2 seringue de Pravaz).

Sirop de morphine (Codex)

20 grammes de sirop de morphine contiennent 0 gr. 01 de chlorhydrate de morphine.

Doses :

De 1 à 2 ans.....	Abstention.
De 2 à 5 ans.....	5 à 20 gr.
De 5 à 10 ans	20 à 30 gr.

Exemple de formule :

Sirop de morphine.....	
Sirop d'éther.....	ââ 30 gr.
Sirop de Tolu.....	
Eau de tilleul..... q. s. pour	120 cmc.

Codéine

Aspect : Cristaux incolores, transparents, un peu efflorescents, souvent très volumineux.

Saveur : Amère.

Solubilité : Dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, peu dans l'eau à 1/120.

Incompatibilités : Sels de cuivre, plomb, fer.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 5 à 12 ans	0 gr. 02 à 0 gr. 04

Exemple de formules :

Codéine	0 gr. 25
Alcool à 60°.....	25 gr.
Sirop simple.....q.s. pour	250 cmc.

(Une cuillerée à café contient 0 gr. 005 de codéine.)

Ou :

Pâte de codéine dosée à 1/2 milligr. par morceau.

Ou :

Bromhydrate de codéine	0 gr. 10
Teinture d'aconit.....	XXXX gouttes
Alcool à 80°..... / Eau de laurier cerise.....	ââ 40 gr.
Eau distillée	60 gr.
Benzoate de soude	5 gr
Sirop d'écorces d'oranges.....	80 gr.
Sirop simple.....q.s. pour	300 cmc.

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 005 de codéine, 2 gouttes d'aconit, 0 gr. 25 de benzoate de soude et 2 gr. d'eau de laurier-cerise.

Sirop de codéine

20 grammes de sirop contiennent 0 gr. 04 de codéine.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	5 gr. à 10 gr.
De 5 à 12 ans.....	10 gr. à 20 gr.

Exemple de formule :

Sirop de codéine..... } Sirop d'éther..... }	ââ 20 gr.
Sirop de Tolu..... } — Pensées sauvages..... }	ââ 30 gr.
Eau de tilleul ..... q. s. pour	120 cmc.

Phosphate de codéine

Aspect : Poudre cristalline, incolore.

Solubilité : Très soluble dans l'eau, peu dans l'alcool.

Saveur : Amère.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 005 à 0 gr. 01
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02

Exemple de formule :

Phosphate de codéine.....	0 gr. 05
Eau de laitue	40 gr.
Sirop de coquelicots.. q. s. pour	90 cmc.

Héroïne (chlorhydrate d')

L'héroïne est un éther diacétique de la morphine.

Aspect : Poudre cristalline blanche.

Saveur : Amère. Inodore.

Solubilité : Soluble dans l'eau.

Incompatibilités : Alcalis et substances alcalines. Apomorphine.

Doses :

De 1 à 3 ans	Abstention.
De 3 à 5 ans	0 gr. 001 à 0 gr. 002
De 5 à 10 ans	0 gr. 002 à 0 gr. 005

Exemples de formules :

I.

Chlorhydrate d'Héroïne	0 gr. 05
Eau distillée stérilisée.....	10 cmc.

Pour injections hypodermiques.

(1 cmc. renferme 0 gr. 005 d'Héroïne).

II.

Chlorhydrate d'Héroïne.....	0 gr. 05
Eau de laurier-cerise.....	10 gr.
Sirop de Tolu.....	80 gr.
Sirop de menthe..... q. s. pour	150 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 005 d'Héroïne).

Narcéine

Aspect : Aiguilles blanches et soyeuses.

Solubilité : Très peu dans l'eau, très soluble

dans les alcalis caustiques, surtout soluble à l'état de chlorhydrate.

Saveur : Amère

Incompatibilités : Comme la morphine.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 01 à 0 gr. 05

Exemples de formules :

Chlorhydrate de narcéine.....	0 gr. 20
Eau distillée..... q. s. pour	10 cme.

(Pour injections hypodermiques).

Narcéine..... Acide chlorhydrique.....	ââ 0 gr. 10
Alcool à 90°.....	4 gr.
Sirop de sucre ..... q. s. pour	100 cme.

(Une cuillerée à entremets contient 0 gr. 01 de narcéine).

Sirop de narcéine

Dosé à 0 gr. 02 par cuillerée à soupe.

(D. S. A.)

Chlorhydrate d'éthyl-narcéine (Narcyl)

Aspect : Sel cristallisé, incolore, facilement soluble dans l'alcool, l'éther, soluble à 1/120e dans l'eau.

Doses : Comme la narcéine.

Exemple de formule :

Chlorhydrate d'éthyl-narcéine. .	0 gr. 08
Alcool.	10 gr.
Eau de laurier-cerise.	10 gr.
Sirop de capillaire.	40 gr.
Sirop simple. . . . . q. s. pour	120 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 01 de chlorhydrate d'éthyl-narcéine).

Dionine (Ethyl-morphine)

Aspect : Poudre cristallisée blanche.

Saveur : Un peu amère.

Solubilité : Facilement soluble dans l'eau et l'alcool.

Incompatibilités : Comme le chlorhydrate de morphine.

Doses :

De 0 à 2 ans.	Abstention.
De 2 à 4 ans.	0 gr. 001
De 4 à 12 ans.	0 gr. 001 à 0 gr. 003

Exemples de formules :

Dionine.	0 gr. 01
Eau distillée bouillie.	10 cmc.

(Pour injections hypodermiques).

Ou :

Dioninc.....	0 gr. 05
Sirop de codéine.....	20 gr.
Eau de laurier-cerise.....	10 gr.
Sirop de Tolu.....	50 gr.
Sirop simple..... q. s. pour	210 cmc.

(Une cuillerée à soupe contient 3 milligrammes 1/2 de Dionine).

Opothérapies

On utilise l'extrait hépatique, l'extrait biliaire, l'extrait rénal, l'extrait de mœlle osseuse, l'extrait ovarique, l'extrait thyroïdien.

Les marques habituellement employées sont celles de Carrion, Byla, Chaix, Moncour.

Extrait hépatique en poudre.

Doses :

de 5 à 12 ans.....	5 à 10 gr.

A donner dans une boisson froide.

Extrait biliaire.

Doses :

de 5 à 12 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10

En pilules ou en cachets.

La cholesterine (Lipochol) se donne en pilules de 0,20 cg. (2 à 4 par jour).

Extrait rénal en poudre.

Doses :

de 5 à 12 ans...	Une à deux cuillerées à café dans du miel ou de la confiture.

Extrait de mœlle osseuse.

Une cuillerée à café dans une boisson froide.

Extrait ovarique.

En tablettes de 0 gr. 20 (2 à 3 par jour).

Extrait thyroïdien.

En cachets de 0 gr. 10 ou en tablettes (2 à 3 par jour, sous surveillance).

Oranges

Utiliser la teinture et le sirop.

Teinture d'oranges

Aspect : Liquide brun verdâtre.

Solubilité : Miscible au sirop. Précipite par l'eau.

Incompatibilités : Quinquinas, perchlorure de fer, phosphates acides.

Sirop

Doses :

De 0 à 15 mois.....	1 gr. à 3 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	3 gr. à 10 gr.
De 3 à 5 ans.....	10 gr. à 20 gr.
De 5 à 12 ans.....	20 gr. à 30 gr.

Oranges amères

On emploie la teinture d'oranges amères, et le sirop d'écorces d'oranges amères.

Teinture d'oranges amères au 1/5e

Aspect : Liquide brun jaune ou jaune verdâtre.
Saveur : De l'orange amère.
Solubilité : Précipite par addition d'eau distillée.

Doses :

X gouttes par année d'âge.

Sirop d'oranges amères

Doses :

5 à 10 gr. par année d'âge.

Orthoforme

Aspect : Poudre cristalline, fine, blanche.

Solubilité : Dans 5 à 6 parties d'alcool ; à peine dans l'eau.

Saveur : Un peu amère.

Doses :

de 0 à 3 ans.....	Abstention.
de 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Orthoforme..... 0 gr. 05

Par cachet ou par pilule.

Pour l'usage externe, employer en poudre :

Orthoforme.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	20 gr.

Ou en pommade :

Orthoforme.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	2 gr.
Vaseline..... }	ââ 20 gr.
Lanoline..... }	

Oxyde de zinc

Aspect : Poudre blanche.

Solubilité : Nulle.

Incompatibilités : Acides, sels acides.

Doses :

De 5 à 12 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 20

En pilules.

S'emploie surtout pour l'usage externe en poudre, en pommade ou sous forme d'emplâtre.

Pancréatine

Aspect : Poudre blanc jaunâtre. Il existe aussi une pancréatine liquide au titre 50.

Solubilité : Dans la glycérine, incomplète dans l'eau ou l'alcool faible.

Saveur : Un peu fade.

Incompatibilités : Acides, alcalis concentrés, tanin, matières astringentes.

Doses :

De 0 à 15 mois	0 gr. 08 à 0 gr. 15
De 15 mois à 4 ans...	0 gr. 15 à 0 gr. 25
De 4 à 12 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Pancréatine.....	0 gr. 10
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 25

(Par cachet ou paquet.)

Ou :

Pancréatine liquide (titre 50)....	5 gr.
Glycérine pure.....	15 gr.
Sirop de vanille, q. s. pour.....	90 cmc.

Ou :

Pancréatine liquide (titre 50)....	5 gr.
Glycérine pure.....	15 gr.
Sirop simple.....	25 gr.
Alcoolat de Garus.....	10 gr.
Eau distillée. q. s. pour.....	100 cmc.

Ou :

Pancréatine ..... }	ââ 0 gr. 10
Eutérokinase..... }	
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 25

(Par paquet).

Papaïne

Aspect : Poudre amorphe blanche.

Solubilité : Soluble dans l'eau.

Saveur : Nulle.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 30
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 30 à 0 gr. 40
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 50
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formules :

Papaïne	ââ 0 gr. 10
Suere de lait.....	

(Par paquet) à donner dans un peu d'eau après une tetée.

Papaïne.....	ââ 2 gr.
Pepsine	
Glyeérine pure.....	15 gr.
Sirop de vanille, q. s. pour.....	100 eme.

Paraldéhyde

Aspect : Liquide incolore solidifiable à + 12°.

Saveur : Brûlante ; odeur éthérée.

Solubilité : Assez grande dans l'eau.

Doses : de 0, 50 à 1 gr. (enfants de 6 à 12 ans).

Exemple de formule :

Paraldéhyde.....	2 gr.
Teinture de vanille.....	XX gouttes.
Eau distillée.....	80 gr.
Sirop de laurier-eerise q. s. pour	100 eme.

Pêcher

Utiliser le sirop de fleurs de pêcher.
Doses : de 5 à 15 gr. selon l'âge.

Penghawar-Djambi

Aspect : (Poils de cibotium, sorte de fougère). Pelotes formées de poils ronds emmêlés, jaune brun, d'aspect rubané. S'emploie pour l'usage externe, en tamponnements dans le nez, comme hémostatique.

Pensée sauvage

Utiliser le sirop.
Doses : de 15 à 50 gr.

Pepsine

Aspect : Poudre, pâte ou paillettes blanc jaunâtre. La pepsine officinale est au titre 100. La pepsine amylacée est 2 fois 1/2 moins forte.

Solubilité : Très soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool.

Saveur : Nulle.

Incompatibilités : Créosote, chloral, sublimé, tanin, acide gallique, sels de fer solubles, atropine, phénol, alcool, essence, antiseptiques, alcalis.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 30
De 15 mois à 3 ans....	0 gr. 30 à 0 gr. 40
De 3 ans à 5 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 50
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemples de formules :

Pepsine.....	
Maltine.....	âà 0 gr. 10
Pancréatine.....	
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 25

Par paquet, à donner dans un peu de lait.

Acide chlorhydrique officinal....	II gouttes.
Pepsine.....	5 gr.
Eau distillée.....	30 gr.
Sirop de fleurs d'oranger. q. s. p.	60 cmc.

L'Elixir du Codex contient :

Pepsine	5 gr.
Eau distillée	70 gr.
Vin de Lunel	125 gr.
Glycérine officinale	50 gr.

Peptone

Aspect : Masse spongieuse.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Dose : (de 1 cuillerée à café à 1 cuill. à soupe).

La Peptone liquide est un liquide sirupeux, rouge brun, d'odeur spéciale, de saveur salée, se donne à dose double de la précédente.

Perborate de soude

Aspect : Poudre cristalline, blanche, abandonnant, spontanément ou en présence d'acides, de l'oxygène actif.

Solubilité : Dans l'eau au 1/40e. On augmente cette solubilité par addition d'acide borique, ou citrique, ou tartrique. Très soluble dans la glycérine.

Saveur : Alcaline.

Doses : En solution au 1/40e avec de l'eau distillée ou à titre plus élevé avec addition d'acide borique.

Exemple de formule :

Pour usage externe seulement.

Poudre.....
Ovules... ... } à 10 0/0 de Perborate de soude.
Gaze .....

Peroxyde de magnésie (Hopogan)

Aspect : Poudre blanche, dégage de l'oxygène par addition d'acides ou de suc gastrique.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther.

Saveur : Nulle.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 30
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 60.

Exemples de formules :

Pilules kératinisées à 0 gr. 15

Ou :

Peroxyde de magnésie.....	0 gr. 25
Eau tartrique.....	1 litre.

Pour gargarismes ou lavages de l'estomac.

Peroxyde de zinc (Ektogan)

Très bon antiseptique externe se présentant sous forme de poudre blanche. S'emploie en poudre simple ou composée :

Peroxyde de zinc.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	10 gr.

(Mêler finement).

Ou en pommade à 10 p. 100.

Ou en emplâtre caoutchouté.

Persulfate de soude

Aspect : Sel très instable.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Incompatibilités : Iodure de potassium, acide arsénieux, chlorures et bromures, permanganate.

Doses : De 0 gr. 05 à 0 gr. 10 (entre 5 et 10 ans).

Exemple de formule :

Persulfate de soude.....	2 gr.
Eau distillée	300 gr.

Ou en comprimés de 0 gr. 05 ou 0 gr. 10.

La persodine semble être une solution au 1/100e dans l'eau des persulfates de K, Na, AzH^4, mélangés.

Phénacétine

Aspect : Poudre blanche.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, peu dans l'alcool.

Saveur : Nulle ; Odeur nulle.

Doses :

De 0 à 2 ans.....	Abstention.
De 2 à 3 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 5 à 10 ans	0 gr. 30 à 0 gr. 60

Exemples de formules :

I.

Phénacétine ..... 0 gr. 10

En petits cachets ou en pilules.

On peut délayer la poudre dans du lait.

II.

Phénacétine.....
Salophène..... } ââ 0 gr. 20

Par cachet.

III.

Phénacétine.....
Aristochine..... } ââ 0 gr. 10
Caféine..... 0 gr. 01

Par cachet.

Phénocolle

On emploie le chlorhydrate de Phénocolle.
Aspect : Poudre blanche, finement cristallisée.
Solubilité : Dans 16 parties d'eau.
Saveur : Légèrement saline, arrière-goût amer.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 40
De 6 à 12 ans	0 gr. 40 à 3 gr. 80

Exemples de formules :

Chlorhydrate de phénocolle.....	2 gr.
Sirop de cerises.....	20 gr.
Décocté de guimauve.... q. s. p.	120 cmc.

Ou comme eau antigoutteuse :

Chlorhydrate de phénocolle .... Piperazine .....}	ââ 1 gr.
Eau de Seltz.....	1/2 litre.

(De deux à quatre verres à bordeaux selon l'âge).

Phosphore

On emploie le phosphore dissous dans l'huile, le phosphure de zinc, l'acide phosphorique, les phosphates, les hypophosphites.

Huile Phosphorée

Formuler :

Huile phosphorée du codex au millième.....	1 partie.
Huile de foie de morue.....	10 parties.

De manière à obtenir une huile à un pour dix mille.

Doses :

De 0 à 6 mois.....	Abstention.
De 6 mois à un an.....	1/2 milligr.
De 1 à 3 ans.....	1 milligr.
De 3 à 5 ans.....	2 milligr.
De 5 à 10 ans.....	2 à 5 milligr.

(La cuillerée à café de l'huile ci-dessus contient 1/2 mmg .)

Phosphure de zinc

Aspect : Prismes grisâtres.

Solubilité : Nulle dans l'eau. Soluble dans l'acide phosphorique.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 001 à 0 gr. 002
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 002 à 0 gr. 005

Exemple de formule :

Granules dosés à un milligramme.

Acide phosphorique

Aspect : Liquide sirupeux incolore.

Solubilité : En toute proportion dans l'eau.

Saveur : Acide. Pas d'odeur.

Incompatibilités : Sels de chaux, de bismuth, d'argent, de plomb, de fer, alcalis, carbonates.

Equivalence : 1 gr. = XXIII gouttes.

Doses :

De 0 à 1 an.....	Abstention.
De 1 à 3 ans.....	5 à 10 gouttes.
De 3 à 5 ans.....	10 à 15 gouttes.
De 5 à 13 ans	15 gouttes à 1 gr.

Exemple de formule :

Acide phosphorique	10 gr.
Alcoolat d'oranger.....	20 gr.
Sirop de sucre	250 gr.
Blanc d'œuf.....	N° 1
Eau distillée.....q. s. pour	1 litre.

Ou encore :

Acide phosphorique.....	10 gr.
Phosphate de soude.....	20 gr.
Eau distillée..... q s. pour	1 litre.

Phosphate de chaux (Phosphate neutre)

Aspect : Poudre blanche.

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

Saveur : Nulle.

Incompatibilité : Acides.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 15 mois à 3 ans....	0 gr. 10 à 0 gr. 15
De 3 à 5 ans	0 gr. 15 à 0 gr. 20
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50

Exemple de formule :

Phosphate neutre de chaux.....	5 gr.
Sirop de sucre.....	âà 30 gr.
Julep gommeux.....	
Eau distillée .....q.s. pour	120 cmc.

Ou en paquets délayés dans du lait.

Phosphate de chaux (Phosphate monocalcique)

Aspect : Cristaux nacrés.

Solubilité : Déliquescent.

Saveur : Acide.

Incompatibilités : Sels de chaux, de bismuth, d'argent, de plomb, de fer, alcalis, carbonates, solutions d'alcaloïdes, vins chargés en tannin, teinture de noix vomique.

Doses : Comme le phosphate neutre.

Exemple de formules :

Phosphate monocalcique.....	4 gr.
Alcoolat de citron	2 gr.
Sirop simple	250 cmc.

Ou :

Phosphate de chaux.....	5 gr.
Eau distillée.....	5 gr.
Sirop iodotannique.....	250 cmc.

Lactophosphate de chaux

Aspect : Cristaux nacrés.
Solubilité : Déliquescent.
Doses : Comme le phosphate de chaux.

Exemple de formule :

Sirop de Lactophosphate de chaux à 1 pour 80.

(20 gr. = 0,25 de phosphate de chaux).

Chlorhydrophosphate de chaux

Aspect : Cristaux nacrés.
Solubilité : Déliquescent.
Doses : Comme le phosphate de chaux.

Exemple de formule :

Sirop de Chlorhydrophosphate de chaux 1 p. 80.

(20 gr. = 0,25 de phosphate de chaux).

Ou :

Huile de foie de morue.....	500 gr.
Solution de lactophosphate de chaux à 50 pour 1000.....	150 gr.

Sirop de lactophosphate de chaux à 50 pour 1000	350 gr.
Gomme adragante	5 gr.
Alcoolat de zestes de citron	20 gr.

(2 à 5 cuillerées à café par jour).

Hypophosphite de chaux

Aspect : Prismes rectangulaires.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Doses : (Administrer le sirop au centième).

De 0 à 15 mois	5 gr. à 10 gr.
De 15 mois à 3 ans	10 gr. à 15 gr.
De 3 à 5 ans	15 gr. à 20 gr.
De 5 à 10 ans	20 gr. à 40 gr.

Exemples de formules :

Sirop d'Hypophosphite de chaux au centième.

Ou :

Hypophosphite de chaux	} ââ 6 gr.
— fer	
— manganèse	
Citrate de potasse	
Eau de fleurs d'oranger	50 gr.
Sirop de sucre q.s. pour	500 cmc.

On peut aussi mettre :

Hypophosphite de chaux	} ââ 5 gr.
— potasse	
— soude	
— fer	2 gr.
Eau de fleurs d'oranger	50 gr.
Sirop de sucre q.s. pour	500 cmc.

Glycérophosphate de chaux

Aspect : Poudre blanche.
Solubilité : Assez soluble dans l'eau.
Incompatibilité : Alcool.

Doses :

De 0 à 6 mois.....	Abstention.
De 6 à 15 mois.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 02 à 0 gr. 05
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 20

Exemples de formules :

Saccharolé de glycérophosphate de chaux à 5 pour 100 (1 cuillerée à café = 0 gr. 175).

Ou :

Sirop de glycérophosphate de chaux à 10 pour 1000.....	80 gr.
Huile de foie de morue	100 gr.
Gomme arabique pulvérisée	àà 30 gr.
Teint. d'écorces d'oranges amères.....	
Eau distillée..... q.s. pour	250 cmc.

Les glycérophosphates de soude et de magnésie peuvent s'employer de la même façon. On utilise aussi ceux de fer, de potasse, de lithine.

Phosphate de soude

Aspect : Cristaux transparents.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Incompatibilités : Comme l'acide phosphorique.

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 1 à 2 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 5 à 10 ans	0 gr. 30 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Donner la poudre dans du lait.

Ou :

Phosphate de soude.....
Magnésie..... } ââ 0 gr. 05
Craie préparée.....

Par paquet.

Phytine (Phosphore organique)

Aspect : Masse jaune, mielleuse.

Saveur : Acide.

S'emploie sous forme de Phytinate de chaux, poudre blanche acide soluble dans l'eau.

Doses :

De 0 à 2 ans.....	Abstention.
De 2 à 6 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 6 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Phytinate de chaux.....	2 gr.
Eau distillée	40 gr.
Sirop simple..... q.s. pour	80 cmc.

Piperazine

Aspect : Masse cristalline, neigeuse.
Solubilité : Dans l'eau en toutes proportions.

Doses :

De 5 à 12 ans..... 0 gr. 25 à 0 gr. 75

Exemples de formules :

Cachets de 0 gr. 25

Ou :

Granulé dosé à 0 gr. 20 par cuillerée à soupe.

Lycetol

Aspect : Poudre blanche incolore.
Solubilité : Dans l'eau.
Saveur : Un peu acide.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge à partir de 3 ans.

Exemple de formule :

Lycetol granulé à 0 gr. 20 par cuillerée à soupe (à donner dans de l'eau).

Sidonal (Quinate de pipérazine)

Aspect : Poudre blanche.
Saveur : Douce, agréable.
Solubilité : Dans l'eau.

Doses :

De 6 à 12 ans..... 0 gr. 50 à 1 gr.

Plomb

On n'emploie que l'acétate basique dissous (extrait de Saturne) et pour l'usage externe seulement. La solution officinale porte le nom *d'eau blanche*, elle a l'aspect d'un liquide laiteux que l'on doit agiter au moment d'en faire usage.

Podophylle

Utiliser le podophyllin.
Aspect : Poudre jaunâtre ou brunâtre.
Solubilité : Dans l'alcool au 1/10.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 002 à 0 gr. 008
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 008 à 0 gr. 02
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 02 à 0 gr. 04

Exemples de formules :

Podophyllin.....	0 gr. 10
Cognac.....	5 gr.
Sirop de framboises....q.s. pour	60 cmc.

Ou :

Extrait de Belladone.....	0 gr. 10
Podophyllin pulvérisé.....	ââ 0 gr. 20
Savon médicinal.....	

(En dix pilules).

Polygala

Utiliser le sirop de Polygala.

Doses :

5 gr. par année d'âge (en moyenne).

Protargol

Aspect : Poudre jaunâtre.

Solubilité : Soluble dans l'eau.

Incompatibilités : Cocaïne, sulfate de zinc, de cuivre, de fer, sublimé, sels métalliques, gomme arabique.

Exemple de formule :

Protargol.....	0 gr. 50
Glycérine neutre.....	5 gr.
Eau bouillie.....	200 gr.

(Pour usage externe seulement).

Psyllium

Utiliser l'extrait fluide.

Soluble dans l'eau et le sirop.

Doses :

de 2 à 10 gr.

Pyramidon

Aspect : Poudre cristalline blanc jaunâtre.

Solubilité : Dans l'eau au 1/10e.

Saveur : Faible, un peu nauséeuse.

Incompatibilités : Gomme et ferments oxydants. (Si on veut mettre le pyramidon dans du Julep gommeux, il faut faire bouillir préalablement celui-ci, si on veut éviter les colorations variées qui se produiraient assez vite dans la potion).

Doses :

de 2 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 30
de 5 à 12 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 75

Exemple de formule :

Pyramidon.....	2 gr.
Eau distillée.....	20 gr.
Sirop de sucre.....q.s. pour	90 cmc.

Quassia amara

Utiliser l'extrait aqueux ou la teinture au 1/5e.

Aspect : Masse brun noir, grumeleuse.

Saveur : Très amère.

Solubilité : Dans l'eau ou le sirop.

Doses :

0 gr. 01 par année d'âge.

Exemple de formule :

Extrait aqueux de quassia amara	0 gr. 20
Sirop de gentiane.....	40 gr.
Eau de fleurs d'oranger.q.s. pour	90 cme.

Quillaya

Utiliser la teinture au 1/5e, soluble dans l'eau et le sirop (Sert à émulsionner les substances grasses et résineuses).

Doses :

De 0 gr. 25 à 1 gr.

Exemple de formule :

Baume de Tolu.....	1 gr.
Teinture de Quillaya.....	2 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	20 gr.
Eau de tilleul.....q.s. pour	90 cme.

Quinquinas

On emploie l'extrait alcoolique de quinquina jaune, l'extrait aqueux de quinquina rouge, la teinture de quinquina rouge, le sirop de quinquina, le vin de quinquina.

Incompatibilités : Eau de chaux, acétate d'ammoniaque, phosphates alcalins, bromures, eau de cannelle, tannin, iode, sirop d'iodure de fer, pyramidon, préparations d'absinthe, l'antipyrine, le borax, le salicylate de soude, le sirop d'écorces d'oranges amères, les sels de fer, le sirop de Gibert.

Un certain nombre de ces incompatibilités ne sont pas absolues et on peut y pallier par un tour de main.

Extrait hydro-alcoolique de quinquina

Aspect : Extrait brun rougeâtre,

Solubilité : Entièrement soluble dans l'alcool à 60°, solution trouble avec l'eau.

Saveur : Amère et légèrement arômatique.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 15 mois à 3 ans ...	0 gr. 25 à 0 gr. 40
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 80
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 80 à 2 gr.

Exemple de formule :

Extrait hydro-alcoolique de quinquina.....	5 gr.
Alcool à 60°.....	20 gr.
Sirop simple, q. s. pour.....	250 cmc.

Extrait aqueux de quinquina rouge

Aspect : Extrait brun rougeâtre, rouge vu en couche mince.

Solubilité : Soluté légèrement trouble dans l'eau.

Saveur : Amère.

Doses :

Comme celles de l'extrait hydro-alcoolique.

Exemple de formule :

Extrait de quinquina.....	
Tartrate ferrico-potassique.....	ââ 10 gr.
Eau distillée.....	
Glycérine.....	20 gr.
Madère, q. s. pour.....	1 litre.

Sirop de quinquina

20 gr. renferment un peu plus de 1 gr. 30 de sirop.

Doses :

De 0 à 15 mois....	1 à 2 cuillerées à café.
De 15 mois à 3 ans.	2 à 4 cuillerées à café.
De 3 à 5 ans.....	1 cuillerée à soupe.
De 5 à 10 ans.....	2 à 3 cuillerées à soupe.

Teinture de quinquina rouge

Aspect : Liquide rouge brun.
Solubilité : Non miscible à l'eau.
Saveur : Très amère, peu aromatique.
Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	1 gr. à 2 gr.
De 3 à 5 ans.....	2 gr. à 3 gr.
De 5 à 12 ans.....	3 gr. à 5 gr.

Exemple de formule :

Teinture de quinquina.....)
— gentiane.....) ââ 10 gr.
— badiane.....)

(En gouttes. D. S. A.)

Vin de quinquina

Contient :

Quinquina rouge en poudre.....	25 gr.
Alcool à 60°.....	75 gr.
Acide chlorhydrique dilué.....	2 gr.
Vin rouge ou blanc	920 gr.

Doses :

Au-dessous de 3 ans...	abstention.
De 3 à 5 ans.....	2 cuillerées à café.
De 5 à 10 ans.....	2 cuillerées à dessert.

Quinine

Les sels de quinine employés sont : le sulfate, le bromhydrate, le chlorhydrate, le valérianate, le lactate, l'aristochine, l'euquinine.

Sulfate de quinine

Aspect : Poudre blanche cristalline.

Saveur : Très amer.

Solubilité : Presque insoluble dans l'eau, soluble dans l'eau acidulée, un peu soluble dans l'alcool fort.

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 1 à 2 ans	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 2 à 3 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 25
De 3 à 4 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 4 à 7 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 40
De 7 à 10 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 60

Exemple de formule :

A formuler : soit mélangé à du miel ou du jus de réglisse, soit en petits cachets, soit en pilules, soit en suppositoires, soit en solution.

Sulfate de quinine.....	4 gr.
Rhum	10 gr.

Eau distillée.....	50 gr.
Sirop de quinquina.....	50 gr.
Sirop de café..... q. s. pour	150 cmc.

Chlorhydrate basique de quinine

Solubilité : Dans l'alcool, dans 25 parties d'eau.

Saveur : Amer.

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 02 à 0 gr. 06
De 1 à 2 ans.....	0 gr. 06 à 0 gr. 15
De 2 à 10 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 40

Exemple de formule :

Chlorhydrate basique de quinine	2 gr. 50
Antipyrine.....	1 gr.
Eau distillée.....	10 cmc.

(Pour injections hypodermiques).

On peut préférer le chlorhydrate neutre soluble dans moins de son poids d'eau.

Chlorhydrate neutre de quinine.	0 gr. 40
Extrait de réglisse.....	3 gr.
Sirop de sucre.....	10 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	40 cmc.

Bromhydrate neutre de quinine

Solubilité : Dans 7 parties d'eau.

Doses :

Comme le sulfate et formules analogues.

Valérianate de quinine

Solubilité : Dans 39 parties d'eau, plus dans l'alcool.

Doses :

De 1 à 2 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30

Formuler en pilules ou en dragées.

Lactate neutre de quinine

Solubilité : Très soluble dans l'eau (dans 3 parties).

Doses : Comme le sulfate.

Formuler en pilules ou en potion.

Aristochine (ou Carbonate de quinine).

Aspect : Poudre blanche.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, dans l'eau acidulée.

Saveur : Nulle.

Doses : Comme le valérianate de quinine. (C'est le plus riche des sels de quinine 96 0/0).

Exemple de formule :

Aristochine.....	1 gr.
Rhum.....	10 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères ..... q. s. pour	80 cmc.

Euquinine (ou Ethylcarbonate)

Comme pour l'aristochine.

Raifort

Utiliser le sirop de Raifort simple ou le sirop de Raifort iodé.

Doses :

5 gr. par année d'âge.

Ratanhia

On emploie l'extrait, la teinture et le sirop.

Extrait de ratanhia

Aspect : Masse rouge foncé.

Saveur : Astringente.

Solubilité : Dans l'eau à chaud, mais trouble à froid.

Incompatibilités : Carbonates alcalins, sels métalliques, gélatine, albumine.

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 1 à 3 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Extrait de ratanhia.....	5 gr.
Sirop de coings.....	50 gr.
Eau.....q. s. pour	150 cme.

Teinture de ratanhia

Aspect : Liquide rouge foncé.

Saveur : Astringente.

Solubilité : Se trouble par addition d'eau.

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 1 à 3 ans.....	0 gr. 20 à 1 gr.
De 3 à 5 ans	1 gr. à 3 gr.
De 5 à 10 ans.	3 gr. à 5 gr.

Exemple de formule :

Teinture de ratanhia.....	5 gr.
Alcool.....)	
Glycérine.....)	ââ 5 gr.
Sirop de mûres.....	50 gr.
Eau distillée.....q. s. pour	120 cme.

(D. S. A.)

Sirop de ratanhia (Codex)

Doses :

De 0 à 15 mois.....	5 gr. à 10 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	10 gr. à 20 gr.
De 3 à 5 ans.....	20 gr. à 30 gr.
De 5 à 10 ans.....	30 gr. à 50 gr.

Réglisse

Utiliser l'extrait aqueux, soluble dans l'eau, l'alcool, le sirop. Masque les saveurs âcres.

Resorcine

Aspect : Cristaux blancs, légèrement rosés.

Solubilité : Dans l'eau, l'alcool, l'éther, l'huile d'olive, mais ne se dissout pas dans l'huile de vaseline.

Saveur : Douceâtre, odeur de phénol.

Incompatibilités : Camphre, antipyrine.

Doses :

De 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par année.

Exemple de formule :

Benzonaphtol	
Salicylate de Bismuth.....	âà 0 gr. 05
Resoreine.....	

Par cachet.

On l'emploie fréquemment pour l'usage externe en pommades, ou pour instillations nasales.

Huile résoreinée à 1 ou 2 p. 0/0.

Ou :

Résoreine.....	1 gr.
Menthol.....	0 gr. 25
Vaseline.....	30 gr.

Rhubarbe

On utilise la poudre de rhubarbe, le sirop de rhubarbe simple et le sirop de rhubarbe composé, l'extrait aqueux et la teinture de rhubarbe.

Poudre de rhubarbe

Incompatibilités : Eau de chaux, émétique, astringents, acides, sulfates de zinc, de fer, sublimé.

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
De 1 an à 3 ans..	0 gr. 15 à 0 gr. 40
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 60
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 60 à 1 gr.

Exemple de formule :

Poudre de rhubarbe.....	0 gr. 05
Savon pulvérisé	q. s.

Pour une pilule.

Extrait aqueux de rhubarbe

Aspect : Extrait jaune brun.

Solubilité : Dans l'eau et le sirop, mais incomplètement.

Doses :

Comme la poudre (un peu plus faibles).

Exemple de formule :

Extrait de rhubarbe.....	0 gr. 05
Calomel.....	0 gr. 01

Par pilule.

Teinture de rhubarbe

Aspect : Liquide jaune verdâtre.

Solubilité : Soluble dans le sirop, dans l'eau.

Equivalence : 1 gr. = 56 gouttes.

Doses :

De 2 à 5 ans..... 0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans..... 1 gr. à 3 gr.

Exemples de formules :

Teinture de rhubarbe..... 2 gr.
Glycérine..... 5 gr.
Sirop simple..... q. s. pour 60 cme.

Ou :

Teinture de rhubarbe.....
— quassia..... âà 10 gr.
— d'écorces d'oranges...

De XV à XXX gouttes par jour.

Sirop de rhubarbe simple ou composé

20 gr. correspondent à environ 1 gr. de rhubarbe.

Doses :

De 0 à 6 mois..... 5 gr.
De 6 mois à 3 ans..... 5 gr. à 20 gr.
De 3 à 12 ans..... 20 gr. à 40 gr.

Rhus aromatica

Employer l'extrait hydro-alcoolique en pilules (insoluble dans le sirop).

Doses :

De 2 à 5 ans..... 0 gr. 02 à 0 gr. 04
De 5 à 10 ans..... 0 gr. 04 à 0 gr. 08

Romarin

Utiliser le sirop (5 gr. par année d'âge).

Ronce

Utiliser le sirop (5 gr. par année d'âge).

Sirop de ronces ..... } àâ 20 gr.
Sirop de mûres ..... }

Rose

Utiliser le sirop (10 gr. par année d'âge).

Salicylate de soude

Aspect : Cristaux incolores.
Solubilité : Très soluble dans l'eau et l'alcool.
Saveur : Un peu sucrée. Pas d'odeur.

Incompatibilités : Borax, Acides, Perchlorure de fer, Antipyrine, Eau de chaux, Extrait de quinquina, Naphtol, Sels métalliques.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 50 à 1 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	1 gr. 50 à 3 gr.
De 5 à 10 ans.....	3 gr. à 4 gr.

Exemple de formule :

Salicylate de soude.....	10 gr.
Bicarbonate de soude.....	10 gr.
Eau distillée	50 gr.
Sirop de groseilles ....q. s. pour	150 cmc.

A donner par cuillerées à soupe, et ingérer ensuite un peu d'eau gazeuse.

Salipyrine (Salicylate d'antipyrine)

Aspect : Poudre cristalline.

Solubilité : Dans l'alcool, très faiblement dans l'eau.

Incompatibilités : Avec le bicarbonate de soude (tombe en deliquium).

Saveur : Un peu douce.

Doses :

De 6 à 12 ans..... 0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formule :

Salipyrine..... 0 gr. 25

Par cachet.

Salol

Aspect : Poudre blanche, cristalline, onctueuse.

Solubilité : Insoluble dans l'eau et la glycérine, peu dans l'alcool, très soluble dans le chloroforme, la vaseline, les huiles fixes.

Saveur : Doucereuse et nauséeuse.

Incompatibilité : Camphre.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 20 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formules :

Salol..... 0 gr. 20

En paquets ou par petits cachets.

Ou :

Salol.....	1 gr.
Julep gommeux	60 gr.

Agiter.

Salophène

Aspect : Paillettes incolores, inodores.
Solubilité : Très soluble dans l'alcool et l'éther.
Saveur : Nulle.
Doses : Mêmes doses que le salol.

Exemple de formule :

Salophène.....	0 gr. 20

Par paquet.

A donner dans un Julep ou mélangé avec du miel ou de la confiture.

Ou :

Salophène ..... / Phénacétine ..... \	ââ 0 gr. 20

Par cachet.

Salsepareille

Utiliser l'extrait hydro-alcoolique, l'extrait fluide à parties égales, le sirop composé de Cuisinier.

Extrait hydro-alcoolique

Aspect : Masse brun foncé.
Solubilité : Dans l'alcool à 60°.
Doses : 0 gr. 05 par année à partir de 3 ans.

Extrait fluide à parties égales

Aspect : Liquide rouge brun.
Saveur : Amère.
Solubilité : Dans l'eau.
Equivalence : 1 gr. = 40 gouttes.
Doses : 0 gr. 10 par année d'âge à partir de 3 ans.

Sirop composé de Salsepareille de Cuisinier

(Contient : bourrache, pétales de roses, follicules de Sené, fruits d'anis vert).

Doses :

De 0 à 15 mois.....	1 à 2 cuillerées à café.
De 15 mois à 3 ans.	1 à 4 —
De 3 à 5 ans.....	1 à 2 cuillerées à soupe.
De 5 à 12 ans.....	2 à 3 —

Sapin

Utiliser le sirop de bourgeons de sapin.

Dose :

De 20 gr. à 60 gr.

Saponaire

Employer le sirop (5 gr. par année d'âge).

Sauge

Utiliser la teinture au 5e, miscible au sirop.

Doses :

X gouttes par année d'âge.

Saule

Infusion d'écorce (5 gr. par jour).
Incompatibilités : Carbonates alcalins.

Scammonée

Aspect : Poudre couleur chamois.

Doses :

Jusqu'à 1 an	Abstention.
De 1 à 3 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 30
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Scammonée pulvérisée	1 gr.
Sucre blanc.....	15 gr.
Eau de laurier-cerise.....	3 gr.
Lait.....	120 gr.

Ou :

Calomel..... / Scammonée.....	ââ 0 gr. 05

Par paquet (à donner dans du lait).

Scille

On emploie la poudre de Scille, l'extrait hydro-alcoolique, la teinture, l'oxymel scillitique, le vin diurétique de la Charité.

Poudre de Scille

Aspect : Poudre rougeâtre.
Solubilité : Très hygrométrique.
Saveur : Amère. Inodore.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 30

Exemple de formules :

Poudre de Scille.....
— Digitale..... } ââ 0 gr. 05
— Seammonée.....

Par pilule.

Ou :

Poudre de Dower.....
Poudre de Scille..... } ââ 0 gr. 05
Suere de lait.....

Par pilule.

Ou :

Poudre de Seille.....
Nitrate de potasse..... ââ 0 gr. 05
Gomme ammoniaque.....

Par pilule.

Extrait hydro-alcoolique

Aspect : Extrait rougeâtre.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, soluble dans le sirop.

Saveur : Acre.

Doses :

Moitié moins que la poudre.

Exemple de formule :

Extrait hydro-alcoolique de scille	0 gr. 20
Sirop de pointes d'asperges.....	40 gr.
Infusion de chiendent..q.s. pour	150 cmc.

Teinture de Scille au 1/5

Aspect : Liquide jaune rosé, visqueux, filant.

Solubilité : Miscible au sirop, ne se trouble pas par addition d'eau.

Saveur : Acre et amère.

Equivalence: 1 gr. = 55 gouttes.

Doses :

Jusqu'à 3 ans.....	Abstention
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Teinture de scille.....	ââ 1 gr.
Teinture de feuilles de digitale.	
Sirop de menthe.....	40 gr.
Infusion de genêts.....q.s. pour	100 cmc.

Oxymel scillitique

Représente de l'extrait de Scille, dissous dans du sirop de miel.

Incompatibilité : Carbonate d'ammoniaque.

Doses :

Jusqu'à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	5 gr. à 10 gr.
De 3 à 5 ans.....	10 gr. à 30 gr.
De 5 à 10 ans.....	30 gr. à 40 gr.

Exemple de formule :

Oxymel scillitique..... ...	10 gr.
Teinture de belladone.....	ââ X gouttes.
— racines d'aconit...	
Sirop de terpine.....	10 gr.
Eau distillée..... q.s. pour	80 cmc.

Vin de Scille composé (vin de la Charité)

Doses :

Jusqu'à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans	5 gr. à 20 gr.
De 3 à 5 ans,.....	20 gr. à 40 gr.
De 5 à 10 ans.....	40 gr. à 60 gr.

Semen-Contra

On utilise la poudre de semen-contra, et la santonine.

Poudre de Semen-Contra

Doses :

De 0 à 2 ans.....	Abstention.
De 2 à 5 ans.....	1 à 2 gr.
De 5 à 10 ans.....	2 à 5 gr.

Exemple de formule :

Electuaire contenant 4 gr. de poudre de semen-contra à donner avec une limonade citrique ou en infusion.

Santonine

Aspect : Paillettes nacrées.

Solubilité : A peu près insoluble.

Saveur : Amère.

Doses :

Jusqu'à 2 ans.....	Abstention.
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15

Exemple de formule :

Santonine.....	ââ 0 gr. 02
Calomel.....	
Suere de lait.....	0 gr. 50

Par paquet.

Ou :

Tablettes de Santonine dosées à 0 gr. 01

Séné

On emploie la poudre de Séné lavée à l'alcool, ou la poudre de réglisse composée ; l'extrait fluide de Séné et la teinture de Séné.

Poudre de Séné

Doses :

De 0 à 15 mois	Abstention.
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 3 à 5 ans	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 2 gr.

Exemple de formule :

Séné	2 gr.
Fleurs de sureau, Semenees de fenouil, — d'anis, Crème de tartre	âà 0 gr. 50

A diviser en paquets, à mettre infuser (D. S. A.) avec des pruneaux.

Poudre de réglisse composée :

Folioles de Séné, Racine de réglisse	âà 15 gr.
Fruits de fenouil pulvérisés, Soufre sublimé et lavé	âà 10 gr.
Suere blane pulvérisé	50 gr.

Doses :

Selon l'âge, d'une 1/2 euillerée à eafé à 1 euillerée à entremets.

Extrait fluide de Séné

Aspect : Liquide brun foncé.

Saveur : Prononcée. Odeur spéciale, légèrement aromatique.

Equivalence : 1 gr. = 38 gouttes.

Doses : A peu près comme la poudre.

Exemple de formule :

Teinture de noix vomique	0 gr. 01
Teinture de Belladone	0 gr. 20

Extrait fluide de Sené.....	0 gr. 30
Sirop de cascara sans amertume q.s. pour.....	30 cme.

A donner en 3 fois dans la journée.

Teinture de feuilles au 1/5

Aspect : Liquide jaune verdâtre.
Solubilité : Se trouble par addition d'eau.
Saveur : Amère et nauséeuse.
Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

Moitié moins que l'extrait.

Exemple de formule :

Teinture de Séné.....	4 gr.
Glycérine	20 gr.
Sirop de menthe	40 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	100 cme.

Seneçon

Employer la teinture au 1/5e, miscible au sirop.
Equivalence : 1 gr. = 54 gouttes.

Doses :

X gouttes par année.

Serpolet

Utiliser le sirop (5 à 10 gr. par année).

Sérums médicamenteux

1° Sérum simple.

Chlorure de sodium.....	7 gr. 50
Eau distillée.....q. s. pour	1 litre.

2° Sérum isotonique.

Chlorure de sodium.....	7 gr.
Sulfate de soude.....	10 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	1 litre.

3° Sérum de Hayem.

Sulfate de soude.....	10 gr.
Chlorure de sodium.....	5 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	1 litre.

4° Sérum gélatineux.

Chlorure de sodium.....	7 gr.
Gélatine blanche.....	50 gr.
Eau distillée..... q. s. pour	1 litre.

Sérums antitoxiques et antimicrobiens

Sérum antidipthérique :

Dose : 20 cmc. à renouveler 2 à 3 fois, si nécessaire.

Sérum antipesteux.

— antistreptococcique.

— antitétanique.

— antivenimeux.

Ces sérums sont inscrits au Codex. — Se conformer pour l'emploi aux notices de l'Institut Pasteur.

Simarouba

Employer le sirop. (5 gr. par année d'âge).

Soude

On emploie le bicarbonate de soude, le citrate de soude, le sulfate de soude.

Bicarbonate de soude

Aspect : Cristaux incolores.

Solubilité : Très soluble dans l'eau ou la glycérine.

Saveur : Alcaline.

Incompatibilités : Acides, sels acides, sels de mercure, fer, baryte, chaux, strontium, eau de chaux, chlorhydrate d'ammoniaque, infusions de végétaux, alcaloïdes.

Doses : (Variables selon l'effet cherché).

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 50
De 15 mois à 3 ans....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 3 à 5 ans.....	1 gr. à 2 gr.
De 5 à 10 ans.....	2 gr. à 4 gr.

(La dose n'est pas progressive avec l'âge).

Exemples de formules :

Tablettes de Vichy dosées à 0 gr. 10

Ou :

Bicarbonate de soude.....
Magnésie calcinée..... } ââ 0 gr. 10

(Par paquet). A donner dans du lait ou de l'eau sucrée.

Le bicarbonate de soude fait partie de la potion de Rivière :

N° 1.

Bicarbonate de soude.....	3 gr. 50
Eau distillée.....	100 gr.
Sirop simple.....	30 gr.

N° 2.

Acide citrique.....	4 gr.
Eau distillée.....	100 gr.
Sirop d'acide citrique.....	30 gr.

Faire prendre d'abord 1 cuillerée à soupe de la potion n° 1 puis immédiatement 1 cuillerée de la potion n° 2.

Sulfate de soude

Aspect : Cristaux blanchâtres.

Solubilité : Très soluble dans l'eau et la glycérine.

Saveur : Amère.

Incompatibilités : Sels de plomb, de chaux, de strontium.

Doses : (Comme purgatif).

De 0 à 15 mois.....	Abstention
De 15 mois à 3 ans.....	5 à 10 gr.
De 3 à 5 ans	10 à 15 gr.
De 5 à 10 ans.....	15 à 25 gr.

Exemple de formule :

Sulfate de soude.....	10 gr.
Eau distillée.....	40 gr.
Glycérine.....	10 gr.
Sirop de limons.....q. s. pour	150 cmc.

Citrate de soude

Aspect : Sel blanc efflorescent.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Saveur : Légèrement savonneuse, et un peu acide.

Doses : Variable selon l'effet recherché (purgatif ou eupeptique).

2 gr. par année d'âge comme purgatif.
Comme eupeptique 0 gr. 20 à 0 gr. 50 par jour.

Exemples de formules :

Citrate de soude	20 gr.
Eau.....	20 gr.
Sirop tartrique.....q. s. pour	60 cmc.

Ou comme eupeptique :

Citrate de soude.....	0 gr. 10

Par paquet ou par comprimé, à mettre dissoudre dans le lait de l'enfant.

Soufre

On n'emploie que le soufre lavé.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 01 à 0 gr. 02
De 15 mois à 3 ans ...	0 gr. 02 à 0 gr. 05
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 5 à 12 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 15

Exemples de formules :

Soufre	0 gr. 10
Miel	20 gr.

Ou :

Soufre sublimé et lavé en tablettes de 0 gr. 10

Stérésol

Composition :

Gomme laque purifiée	27 gr.
Benjoin purifié	0 gr. 10
Baume de Tolu	1 gr.
Acide phénique cristallisé	10 gr.
Essence de cannelle de Chine, Saccharine	ââ 0 gr. 60
Alcool à 90°	q. s. pour 100 cmc.

Aspect : Liquide poisseux, jaune rouge, d'odeur agréable. Utilisé simplement pour usage externe, comme topique sur les plaies et les muqueuses auxquelles il adhère.

Stovaïne

Aspect : Lamelles brillantes.

Solubilité : Dans l'eau et l'alcool.

Saveur : Un peu amère.

Doses :

De 0 à 3 ans	Abstention.
De 3 à 6 ans	0 gr. 001 à 0 gr. 005
De 6 à 12 ans	0 gr. 005 à 0 gr. 01

Exemples de formules :

Stovaïne..... 0 gr. 40
Eau distillée stérilisée..... 10 gr.

(En collyre).

Ou :

Stovaïne..... 0 gr. 50
Eau distillée stérilisée..... 50 cmc.

(Pour injections hypodermiques comme anesthésique local).

Ou :

Stovaïne ..... 0 gr. 25
Eau chloroformée..... 50 gr.
Sirop simple.....q. s. pour 150 cmc.

(Contre les douleurs stomacales).

Ou :

Pastilles de Stovaïne à 0 gr. 002

Stramoine

Ne pas l'utiliser chez l'enfant.

Strontium (Lactate de)

Aspect : Poudre amorphe incolore.

Solubilité : Dans l'eau.

Saveur : Légèrement piquante. Inodore.

Incompatibilités : Carbonates alcalins, sulfates solubles.

Doses :

De 6 à 12 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 40

Exemple de formule :

Lactate de strontium.....	2 gr.
Eau distillée	20 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères..... q. s. pour	90 cme.

Strophantus

On emploie la teinture au 1/10e ou des granules d'extrait de Strophantus à 1 milligr.

Teinture de Strophantus

Aspect : Liquide jaunâtre.

Solubilité : Se trouble par addition d'eau distillée.

Saveur : Fortement amère.

Equivalence : 1 gr. = 56 gouttes.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	V à VIII gouttes.
De 5 à 10 ans	VIII à X gouttes.

Exemple de formule :

Teinture de Strophantus.....	1 gr.
Glycérine.....	10 gr.
Sirop d'éther.....	40 gr.
Eau de fleurs d'oranger.. q. s. p.	100 cme.

Extrait de Strophantus

Aspect : Masse molle verdâtre.

Solubilité : Dans l'alcool à 60°. Se trouble mélangé au sirop.

Saveur : Amère, odeur aromatique.

Doses :

De 5 à 8 ans.....	0 gr. 0005
De 8 à 10 ans.....	0 gr. 0005 à 0 gr. 001
De 10 à 15 ans.....	0 gr. 001 à 0 gr. 002

Exemple de formule :

Granules d'extrait de Strophantus dosés à un milligramme.

Les granules de Catillon sont dosés à un milligramme.

Sulfonal

Aspect : Cristaux incolores.
Solubilité : Insignifiante.
Saveur : Nulle. Pas d'odeur.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 50

Exemple de formule :

Sulfonal.....	0 gr. 25
Miel ou Julep gommeux.	10 gr. ou 20 gr.

Sureau

Infusion d'écorce seconde.

Tamarin

Employer la pulpe de Tamarin.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans.....	5 gr.
De 3 à 5 ans	5 gr. à 10 gr.
De 5 à 12 ans.....	10 gr. à 30 gr.

Tannalbine

Aspect : Poudre jaune pâle.
Solubilité : Nulle dans l'eau.
Saveur : Nulle. Odeur nulle.
Incompatibilités : Alcalins.

Doses :

De 0 à 2 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 60
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 60 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 1 gr. 50

Exemple de formule :

Tannalbine.....	0 gr. 20
Sucre de lait.....	0 gr. 50

Par paquet.

Tannigène

Aspect : Poudre blanchâtre.
Solubilité : Nulle dans l'eau, soluble dans l'alcool.
Saveur : Nulle, pas d'odeur.
Incompatibilités : Alcalins.

Doses :

De 0 à 2 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 50
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Tannigène.....	0 gr. 25
Sucre de lait.....	0 gr. 50

Par paquet.

Tannin

Aspect : Poudre légère, amorphe, jaunâtre.
Solubilité : Dans l'eau et la glycérine.
Saveur : Astringente.
Incompatibilités : Acétate de potasse, émétique, sels métalliques, gélatine, albumine, amidon, alcaloïdes, eau de chaux.

Doses :

De 0 à 1 an.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 1 à 3 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 40
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 40 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 2 gr.

Exemple de formules :

Tannin.....	1 gr.
Glycérine.....	4 gr.
Sirop de coings.....	40 gr.
Eau de fleurs d'oranger. q. s. pour	60 cmc.

Le sirop iodotannique contient :

Iode 0 gr. 04. Tannin 0 gr. 08 pour 20 gr.

Le sirop iodotannique phosphaté contient en plus

0 gr. 40 de phosphate monocalcique.

Tannoforme

Aspect : Poudre fine, blanc rosé.
Solubilité : Nulle dans l'eau. Soluble dans l'alcool.
Saveur : Un peu astringente.

Doses :

De 0 à 2 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20

De 2 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 40
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 40 à 0 gr. 60

Exemple de formule :

Tannoforme.....	0 gr. 20
Sucre de lait.....	0 gr. 50

Par paquet.

Térébenthine

On emploie l'essence de térébenthine, ou le sirop de térébenthine.

Essence de térébenthine

Aspect : Liquide incolore inflammable.
Solubilité : Seulement dans l'éther ou les huiles.
Equivalence : 1 gr. = 56 gouttes.
Saveur : Caustique et brûlante.

Doses :

De 0 à 3 ans.....	Abstention.
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemple de formules :

Essence de térébenthine en capsules de.....	0 gr. 10

Ou :

Essence de térébenthine.....	1 gr.
Gomme adragante.....	0 gr. 25
Sirop de fleurs d'oranger.....	40 gr.
Eau de tilleul..... q. s. pour	100 cmc.

Sirop de térébenthine (dosé au dixième).

Doses :

De 0 à 15 mois.....	5 gr. à 10 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	10 gr. à 20 gr.
De 3 à 5 ans.....	20 gr. à 30 gr.
De 5 à 12 ans.....	30 gr. à 40 gr.

Exemple de formule :

Sirop de térébenthine.....		
— goudron.....	} ââ 50 gr.	
— bourgeons de sapin...		
— baume de Tolu. q. s. p.		150 cmc.

Terpine

Aspect : Prismes blancs.

Solubilité : Insignifiante dans l'eau, assez soluble dans l'alcool et la glycérine.

Saveur : Nulle. Pas d'odeur.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 30
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50

Exemples de formules :

Terpine	0 gr. 25
Benzoate de soude.....	0 gr. 50
Sirop de cachou.....	15 gr.
Julep gommeux..... q. s. pour	60 cmc.

(Agiter).

Ou :

Terpine	1 gr.
Alcool à 90°.....	10 gr.
Elixir de Garus.....	40 gr.
Sirop de framboises.. q. s. pour	100 cmc.

Ou :

Terpine	0 gr. 50
Cognac.....	20 gr.
Julep gommeux..... q. s. pour	100 cmc.

Ou :

Terpine.....	1 gr. 25
Elixir de Garus	100 gr.

20 gr. de cet élixir (Codex) contiennent 0 gr. 25 de terpine.

Tilleul

En infusion ou le sirop (dose ad libitum).

Théobromine

Aspect : Poudre cristalline blanche.
Solubilité : Nulle.
Saveur : Amère.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 40
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 40 à 1 gr.

Exemple de formule :

Théobromine..... / Phosphate neutre de soude .... \	âà 0 gr. 20

(Par cachet).

Ou :

Théobromine	0 gr. 20
Caféine.....	0 gr. 10
Sulfate de spartéine.....	0 gr. 01

(Par cachet).

Ou :

Théobromine.....	0 gr. 20
Acide Thyminique.....	0 gr. 05
Benzoate de Lithine.....	0 gr. 05

(Par cachet).

Théobromose (Théobrominate de Lithium)

Aspect : Cristaux blancs déliquescents, à ne pas conserver à l'état sec ou à l'air libre.

Solubilité : En toute proportion dans l'eau.

Saveur : Amère.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 40

Exemple de formule :

Solution titrée de Théobromose à 0 gr. 50
par cuillerée à soupe.

(A donner dans de l'eau sucrée ou du sirop).

Thiocol (Gaïacolsulfonate de potasse)

Aspect : Poudre blanche, cristalline.

Solubilité : Très soluble dans l'eau.

Saveur : Un peu amère.

Doses :

De 3 à 5 ans..... 0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 12 ans..... 1 gr. à 2 gr.

Exemple de formule :

Thiocol..... 4 gr.
Benzoate de soude..... 2 gr.
Teinture d'aconit..... XX gouttes.
Eau de laurier-cerise..... 10 gr.
Julep gommeux ..... q. s. pour 150 cmc.

Thym

Employer l'extrait fluide à poids égal de plantes soluble dans l'eau, le sirop (entre dans la composition de la Pertussine).

Equivalence : 1 gr. = 39 gouttes.

Doses :

De 5 à 20 gr. entre 3 et 12 ans.

Thyminique (acide) ou *Solurol*

Aspect : Poudre jaunâtre amorphe.
Solubilité : Dans l'eau chaude.

Saveur : Nulle.

Doses :

De 3 à 6 ans.....	0 gr. 10 à 0 gr. 20
De 6 à 12 ans.....	0 gr. 20 à 0 gr. 50

Exemple de formule :

Acide thyminique.....	0 gr. 10

Par cachet ou en tablettes de 0 gr. 25.

Thymol

Aspect : Cristaux incolores.

Solubilité : Dans l'alcool, les alcalis, la glycérine.

S'emploie pour l'usage externe.

Thymol.....	5 gr.
Alcool.....	20 gr.
Teinture d'eucalyptus.....	20 gr.
Glycérine ..... q. s. pour	100 cme.

Mettre quelques gouttes par verre d'eau pour faire rincer la bouche.

Tormentille

En poudre dans du vin (0 gr. 10 à 0 gr. 20 par année d'âge).

Trinitrine

On emploie la solution alcoolique au centième.

Equivalence : 6 gouttes renferment un milligr.

Doses :

De 5 à 12 ans.....	1/2 à 1 goutte.

Exemple de formule :

Solution alcoolique de trinitrine au 1/100e	V gouttes.
Eau distillée sucrée légèrement..	50 gr.

Une cuillerée à café renferme 1/2 goutte.

Trional

Aspect : Cristaux brillants.

Solubilité : Insignifiante dans l'eau, soluble dans l'huile au 1/20e.

Saveur : Amère.

Doses :

De 0 à 2 ans.....	Abstention.
De 2 à 5 ans.....	0 gr. 30 à 0 gr. 50
De 5 à 10 ans	0 gr. 50 à 1 gr.

Exemples de formules :

Trional.....	0 gr. 25

Pour un petit cachet.

Ou :

Trional.....	1 gr.
Huile d'amandes douces.....	20 gr.
Sirop d'amandes douces	40 gr.
Eau de fleurs d'oranger. q. s. pour	80 cmc.

Tussilage

En sirop (5 gr. par année d'âge).

Ulmarène

Aspect : Liquide légèrement jaune rosé.

Solubilité : Insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool.

Odeur : Faible de salol.

Doses : Peu usité pour l'usage interne, bien que employable.

Exemple de formule :

Ulmarène..... 5 gr.
Lanoline ..... } ââ 15 gr.
Vaseline..... }

Pour usage externe, en liniment.

Urethane

Aspect : Cristaux incolores.
Solubilité : Dans l'eau, l'alcool.

Dose :

0 gr. 10 par année d'âge.

Urotropine

Aspect : Cristaux blancs.
Saveur : Presque nulle.
Solubilité : Très grande dans l'eau.
Incompatibilités : Acides.

Doses :

0 gr. 05 par année d'âge.

Exemple de formule :

Urotropine.....	1 gr. 50
Eau ordinaire ou gazeuse.....	150 gr.

Ou en comprimés dosés à 0 gr. 50.

(Faire fondre dans l'eau et faire prendre en 4 fois dans la journée).

Uva-Ursi

En sirop (5 gr. par année d'âge).

Valériane

On utilise la poudre de valériane, l'extrait de valériane, le sirop de valériane, le valérianate d'ammoniaque cristallisé, le valérianate d'ammoniaque liquide, le valérianate de quinine et le valérianate de zinc.

Poudre de valériane

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 10 à 0 gr. 25
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 25 à 0 gr. 50
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 50 à 1 gr.
De 5 à 10 ans.....	1 gr. à 3 gr.

Exemple de formule :

Poudre de valériane, 1 gr. à infuser dans 100 gr. d'eau. Ajouter teinture de cannelle 5 gr.

Extrait de valériane

Aspect : Masse brune ferme.

Solubilité : Dans le sirop.

Saveur : Désagréable, odeur de valériane.

Doses :

Moitié moins que la poudre.

Exemples de formules :

Extrait de valériane, 0 gr. 05 par pilule.

Ou : Sous forme de pilules de Méglin.

Extrait de valériane.....
— jusquiame..... } ââ 0 gr. 05
Oxyde de zinc.....

Sirop de valériane

Contient 0 gr. 25 d'extrait par cuillerée à soupe.

Doses :

De 0 a 15 mois.....	2 gr. à 5 gr.
De 15 mois à 3 ans.....	5 gr. à 10 gr.
De 3 à 5 ans.....	10 gr. à 20 gr.
De 5 à 10 ans.....	20 gr. à 30 gr.

Teinture de racines de valériane au 1/5e

Aspect : Liquide rougeâtre.
Solubilité : Miscible à l'eau.
Equivalence : 1 gr. = 53 gouttes.

Doses :

De 0 à 15 mois..	V g.	à	XX gouttes.
De 15 m. à 3 ans.	XX g.	à	XXXX gouttes.
De 3 à 5 ans.....	XXXX g.	à	1 gr.
De 5 à 10 ans....	1 gr.	à	2 gr.

Exemple de formule :

Teinture de racines de valériane	1 gr.
Eau distillée.....	20 gr.
Elixir de menthe.....	40 gr.
Eau de menthe..... q. s. pour	80 cmc.

Valérianate d'ammoniaque cristallisé

Aspect : Cristaux blanchâtres.
Solubilité : Très soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 01 à 0 gr. 05
De 3 à 5 ans.....	0 gr. 05 à 0 gr. 15
De 5 à 10 ans.....	0 gr. 15 à 0 gr. 30

Exemple de formule :

Valérianate d'ammoniaque.....
Extrait de valériane..... } ââ 0 gr. 05

Par pilule.

Ou :

Valérianate d'ammoniaque.....	0 gr. 30
Rhum.....	10 gr.
Sirop d'éther..... q. s. pour	60 cme.

Valérianate d'ammoniaque liquide

Ainsi composé (Codex) :

Acide valérianique.....	3 gr.
Sesquicarbonate d'ammoniaque.	q. s. p. saturer.
Extrait de valériane.....	2 gr.
Eau distillée.. q. s. pour obtenir	100 gr.

Doses :

De 0 à 15 mois.....	0 gr. 50 à	1 gr.
De 15 mois à 3 ans..	1 gr. à	2 gr.
De 3 à 5 ans.....	2 gr. à	5 gr.
De 5 à 10 ans.....	5 gr. à	10 gr.

Valérianate de quinine (v. quinine)

Valérianate de zinc

Doses :

De 0 à 15 mois.....	Abstention.
De 15 mois à 3 ans...	0 gr. 02 à 0 gr. 05

De 3 à 5 ans..... 0 gr. 05 à 0 gr. 10
De 5 à 10 ans..... 0 gr. 10 à 0 gr. 20

A formuler en dragées de 0 gr. 05.

Energetène de valériane. (Extrait de racines fraîches)

Aspect : Liquide limpide peu coloré.
Solubilité : Miscible à l'eau.
Saveur : Faible, odeur aromatique.
Doses : Comme la teinture.

Vanadate de soude

Aspect : Petits cristaux blancs.
Solubilité : Dans l'eau.
Incompatibilités : Sucre, sirop, vin.

Doses :

De 3 à 6 ans..... 0 gr. 0005 à 0 gr. 001
De 6 à 12 ans..... 0 gr. 001 à 0 gr. 002

Exemple de formules :

Granules dosés à un milligramme.

Ou :

Vernadate de soude.....
Arséniate de soude..... } aâ 0 gr. 01
Glycérophosphate de soude..... 5 gr.
Elixir de Garus..... 50 cme.

Vanadine

(Solution de tetraoxyde de vanadium).
Aspect : Liquide jaunâtre.
Saveur : Légèrement amère.

Doses :

De 6 à 12 ans..... .. II à V gouttes.

(Avant chaque repas, dans un peu d'eau).

Vanille

Utiliser la teinture au 1/10e ou la vanilline.

Teinture au 1/10e

Aspect : Liquide brun.
Saveur : Chaude, aromatique.
Solubilité : Dans le sirop, non miscible à l'eau.
Equivalence : 1 gr. = 58 gouttes.

Doses :

V gouttes par année d'âge.

Vanilline

Dose de 1/4 à 1 milligr. selon l'âge (en granules).

Véronal (*Acide diéthylbarbiturique*)

Aspect : Petits cristaux incolores.

Saveur : Amère.

Solubilité : Au 1/150e dans l'eau, facilement soluble en présence des alcalins.

Doses :

De 6 à 12 ans..... 0 gr. 25 à 0 gr. 50

(A surveiller).

Exemple de formule :

Véronal..... 0 gr. 25
Bicarbonate de soude..... 2 gr.

Par paquet (à donner dans une infusion de tilleul).

Viburnum Prunifolium

Utiliser l'extrait fluide.

Aspect : Liquide brun rouge.

Saveur : Amère et styptique, odeur répugnante.
Solubilité : Dans l'eau ou le sirop.
Equivalence : 1 gr. = 58 gouttes.

Doses :

X à XX gouttes chez les fillettes de 12 à 13 ans.

Exemple de formule :

Extrait fluide de viburnum.....	
— d'hydrastis canadensis.....	ââ 1 gr.
Elixir de Garus.....	20 gr.
Julep gommeux..... q. s. pour	90 cmc.

PARALLÈLE ENTRE LES CODEX 1884 ET 1909.

Pour les confrères qui sont habitués au Codex 1884, il leur suffit, pour être d'accord avec le Codex 1909, de se rappeler les notions générales suivantes :

Médicaments plus actifs

Eau distillée de Laurier-cerise : 2 fois plus.
Teinture d'Iode au 1/10e (au lieu de 1/13e).
Pepsine, Maltine, Pancréatine : Titre 2 fois plus fort.
Pastilles de Vichy (4 fois plus de Bicarbonate de soude).

Médicaments moins actifs

Sirop de Belladone : 1/3 moins fort.
Elixir parégorique : moitié moins.
Gouttes amères de Baumé : 2 fois 1/2 moins.
Laudanum de Sydenham : 1/5e moins.

Teintures d'Aconit de Belladone de Colchique de Digitale d'Ipéca de Jusquiame de Lobelie de Noix vomique de Strophantus	Moitié moins.

Teinture d'opium : au 1/20e d'extrait au lieu de 1/13e.

MEMORANDUM

Dans ce memorandum, nous réunissons les Eaux, Pâtes, Pommades, Sirops, Tablettes, Tisanes inscrites au Codex, dont la composition est utile à connaître pour le praticien.

Eaux

Eau de cannelle (au 1/10)^{e} : Dose (ad libitum).
Eau de fleurs d'oranger : Dose (ad libitum).
Eau de laurier-cerise (au 1/4).
Eau de menthe : Dose (ad libitum).
Eau de rose : Dose, usage externe (ad libitum).
Eau de tilleul : Dose (ad libitum).
Eau de Valériane : Dose (ad libitum).
Eau de goudron (à 5 p. 1000) : Dose (ad libitum)

Eau saline purgative :

Sulfate de magnésie.....
Sulfate de soude..... } àà 10 gr.
Eau distillée..... 650 gr.

Eau saline purgative gazeuse :

Sulfate de magnésie	30 gr.
Bicarbonate de soude, Acide tartrique	ââ 4 gr.
Eau distillée	650 gr.

Dose: Variable selon l'effet désiré.

Pâtes

Pâte de guimauve : Dose (ad libitum).

Pâte de Lichen : Dose (ad libitum).

Pâte pectorale officinale :

Espèces pectorales	10 gr.
Eau distillée, Gomme du Sénégal	ââ 300 gr.
Sucre blanc	200 gr.
Eau de Laurier-cerise	5 gr.
Extrait d'opium	0 gr. 125

Dose : (ad libitum).

Pâte de réglisse officinale :

Sue de réglisse	10 gr.
Gomme du Sénégal	150 gr.
Sucre blanc	100 gr.
Eau distillée	250 gr
Extrait d'opium	0 gr. 075

Dose : (A calculer d'après la teneur en opium).

Pommades

Vaseline boriquée (à 1/10).

Pommade d'Helmerich :

Soufre sublimé	10 gr.
Carbonate neutre de potasse	
Eau distillée	ââ 5 gr.
Huile d'œillette	
Axonge	30 gr.

Onguent Basilicum :

Poix noire purifiée	
Colophane	7 gr.
Cire jaune	
Huile d'olive	29 gr.

Baume Nerval :

Moelle de bœuf	35 gr.
Huile d'œillette	10 gr.
Beurre de muscade	45 gr.
Essence de girofle	1 gr. 50
Essence de romarin	3 gr.
Camphre pulvérisé	1 gr. 50
Baume de Tolu	3 gr.
Alcool à 80°	6 gr.

Pommade Belladonée :

Extrait de Belladone	3 gr.
Glycérine	2 gr.
Axonge benzoïnée	25 gr.

Onguent Populeum :

Bourgeons de peuplier		80 gr.
Feuilles sèches de Belladone		
— de Jusquiame	ââ 10 gr.	
— de Morelle		
— de Pavot		
Axonge		400 gr.
Alcool à 95°		40 gr.

Pommade de Calomel (au 1/10e).

Pommade camphrée (au 1/5e).

Pommade de chloroforme (au 1/10e).

Pommade au sublimé (au 1/100e).

Pommade citrine :

Axonge	ââ 40 gr.	
Huile d'olive		
Mercure		4 gr.
Acide azotique		8 gr.

Pommade épispastique jaune :

Cantharides		6 gr.
Axonge		87 gr.
Cire jaune		12 gr. 50
Curcuma pulvérisé	ââ 0 gr. 50	
Essence de citron		

Pommade épispastique verte :

Cantharides en poudre	3 gr.
Pommade de bourgeons de peuplier	85 gr.
Cire blanche	12 gr.

Pommade de goudron (au 1/10e).

Pommade d'iodoforme (au 1/10e).
Pommade d'iodure de plomb (au 1/10e).

Pommade d'iodure de potassium :

Iodure de Potassium	10 gr.
Hyposulfite de soude	0 gr. 10
Eau distillée	10 gr.
Axonge benzoïnée	80 gr.

Pommade d'iodure de Potassium iodée :

Iodure de Potassium	10 gr.
Iode	2 gr.
Eau distillée	8 gr.
Axonge benzoïnée	80 gr.

Onguent Napolitain (à parties égales).
Onguent gris (au huitième).
Pommade d'oxyde jaune de mercure (au 1/20e).
Pommade d'oxyde rouge de mercure. (au 1/20e).
Pommade d'oxyde de zinc (au 1/10e).
Vaseline Phéniquée (au 1/100e).
Pommade au précipité blanc (au 1/10e).
Pommade au Salol (au 1/10e).
Pommade soufrée (au 1/10e).

Onguent styrax:

Styrax liquide	80 gr.
Colophane	145 gr.
Elemi purifié, Cire jaune	àà 80 gr.
Huile d'olive	115 gr.

Sirops

Sirop d'acide citrique (au 1/100e).

Sirop d'acide tartrique (au 1/100e).

Sirop d'aconit (à 2,5 de Teinture pour 100).

(Une cuillerée à soupe représente 0,50 de teinture de racines d'aconit).

Sirop d'orgeat. Dose (ad libitum).

Sirop de baume de Tolu (à 5 p. 100) Dose : (ad libitum).

Sirop de Belladone (au 1/10e).

(Une cuillerée à soupe représente 2 gr. de teinture de Belladone).

Sirop de Gibert :

Biiodure de mereure.....	0 gr. 10
Iodure de potassium.....	ââ 5 gr.
Eau distillée.....	
Sirop simple.....	190 gr.

Une cuillerée à soupe représente 0 gr. 01 de biiodure et 0 gr. 50 d'iodure de potassium.

Sirop de Bourgeons de pin (au 1/100e) Dose : (ad libitum).

Sirop de Bromure de Potassium (au 1/20e).

Sirop de Capillaire (au 1/150e) Dose (ad libitum).

Sirop de cerise : Dose (ad libitum).

Sirop de chloral (au 1/20e)

Une cuillerée à soupe représente 1 gr. d'Hydrate de chloral.

Sirop de chlorhydro-phosphate de chaux :

Phosphate bicalcique	1 gr. 25
Acide chlorhydrique dilué	3 gr.
Eau distillée	31 gr.
Sucre blanc	63 gr.
Alcoolature de citron	1 gr.

Une cuillerée à soupe représente 0 gr. 25 de phosphate de chaux.

Sirop des cinq racines :

Racine d'ache — d'asperge — de fenouil — de persil Rhizome de petit houx	ââ 10 gr.
Eau distillée bouillante	300 gr.
Sucre blanc	200 gr.

Dose (ad libitum).

Sirop de codéine (à 0,2 p. 100).

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 04 de codéine.

Sirop de coings : Dose (ad libitum).

Sirop diacode :

Sirop d'opium	25 gr.
Sirop simple	75 gr.

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 01 d'extrait d'opium.

Sirop de digitale :

Teinture de digitale.....	5 gr.
Sirop simple.....	95 gr.

Une cuillerée à soupe renferme 1 gr. de teinture de digitale.

Sirop d'espèces pectorales :

Espèces pectorales.....	10 gr.
Eau distillée bouillante.....	120 gr.
Sucre blanc.....	200 gr.
Eau distillée de fleurs d'oranger.	5 gr.
Extrait d'opium.....	0 gr. 03

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 002 d'extrait d'opium.

Sirop d'éther :

Une cuillerée à soupe renferme 0 gr. 40 d'éther.

Sirop de fleurs d'oranger. Dose (ad libitum).

Sirop de framboise. Dose (ad libitum).

Sirop de fumeterre. Dose (ad libitum).

Sirop de gentiane. Dose (ad libitum).

Sirop de gomme. Dose (ad libitum).

Sirop de goudron (au 1/100e). Dose (ad libitum).

Sirop de groseille. Dose (ad libitum).

Sirop iodotannique :

Iode.....	0 gr. 20
Tannin.....	0 gr. 40

Eau distillée	36 gr.
Sucre blanc	64 gr.

Une cuillerée à soupe correspond à 0 gr. 04 d'iode.

Sirop iodotannique phosphaté :

Sirop iodotannique	98 gr.
Phosphate monocalcique	2 gr.

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 04 d'iode et 0 gr. 40 de phosphate monocalcique.

Sirop d'iodure de fer :

Limaille de fer	2 gr.
Iode	4 gr. 10
Eau distillée	q. s.
Acide tartrique	1 gr.
Sirop simple	975 gr.

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 10 d'iodure de fer.

Sirop d'iodure de potassium (à 2,50 p. 100).

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 50 d'iodure.

Sirop d'ipécacuanha (au 1/100e).

Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 20 d'extrait d'ipéca.

Sirop de Desessartz ou sirop d'ipéca composé :

Racine d'ipéca concassé	3 gr.
Follicules de sené	10 gr.
Serpolet	3 gr.
Fleurs de coquelicot	12 gr. 50

Sulfate de magnésie.....	10 gr.
Vin blanc..... / Eau de fleurs d'oranger..... \	75 gr.
Eau distillée bouillante.....	300 gr.
Sucre blanc.....	q. s.

Sirop de morphine (à 0,05 p. 100).

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 01 de chlorhydrate de morphine).

Sirop de mousse de Corse (à 20 p. 100).

Sirop de mûres. Dose (ad libitum).

Sirop de nerprun. (Ne pas l'utiliser chez l'enfant).

Sirop thébaïque (ou sirop d'opium) :

Extrait d'opium.....	2 gr.
Eau distillée.....	8 gr.
Sirop simple.....	990 gr.

Une cuillerée à soupe contient 0 gr 04 d'extrait d'opium.

Sirop d'écorces d'oranges amères. Dose (ad libitum).

Sirop de polygala. Dose (ad libitum).

Sirop de quinquina (au 1/20e).

Sirop antiscorbutique (ou sirop de raifort composé) :

Feuilles fraîches de Cochléaria. / Feuilles fraîches de cresson.... \ Racine fraîche de raifort.....	ââ 100 gr.
Feuilles sèches de Menyanthe..	10 gr.

Zestes d'orange amère	20 gr.
Cannelle de Ceylan	5 gr.
Vin blanc	400 gr.
Sucre blanc	500 gr.

Sirop de raifort iodé :

Teinture d'iode	10 gr.
Sirop antiscorbutique	990 gr.

(Une cuillerée à soupe renferme 0 gr. 02 d'iode.

Sirop de ratanhia (à 2,5 pour 100).

(Une cuillerée à soupe renferme 0 gr. 50 d'extrait de ratanhia).

Sirop de rhubarbe composé (ou sirop de chicorée composé) :

Rhubarbe de Chine Racine de chicorée	ââ 20 gr.
Feuilles de chicorée	30 gr.
Fumeterre Scolopendre	ââ 10 gr.
Baies d'alkekenge	5 gr.
Cannelle de Ceylan Santal citrin	ââ 3 gr.
Sucre blanc	300 gr.
Eau distillée	q. s.

Sirop de salsepareille composée (sirop de Cuisinier) :

Salsepareille	100 gr.
Fleurs sèches de bourrache Pétales secs de rose pâle Folioles de séné Fruits d'anis vert	ââ 6 gr.

Eau distillée..... q. s.
Sucre blanc..... } âà 100 gr.
Miel blanc..... }

Sirop de saponaire. Dose (ad libitum).

Sirop simple. Dose (ad libitum).

Sirop de stigmates de maïs. Dose (ad libitum).

Sirop de térébenthine (au 1/10e).

Sirop de valériane :

Extrait de valériane..... 3 gr. 50
Eau distillée de valériane..... 100 gr.
Sucre blanc..... 180 gr.

(Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 25 d'extrait de valériane).

Tablettes

Tablettes de baume de Tolu. (La tablette est de 1 gr., mais la quantité de baume de Tolu ou plutôt des principes solubles de ce baume ne peut être précisée).

Tablettes de bicarbonate de soude ou pastilles de Vichy (0 gr. 10 par tablette).

Tablettes de borate de soude (0 gr. 10 par tablette).

Tablettes de cachou (0 gr. 10 par tablette).

Tablettes de charbon (0 gr. 50 par tablette).

Tablettes de chlorate de potasse (0 gr. 10 par tablette).

Tablettes de chlorhydrate de cocaïne (0 gr. 001 par tablette).

Tablettes d'ipéca (0 gr. 01 par tablette).

Tablettes de Kermès (0 gr. 01 par tablette).

Tablettes de menthe.

Tablettes de santonine (0 gr. 01 par tablette).

Tablettes de soufre (0 gr. 10 par tablette).

Tisanes

I. — Préparées par solution

Gomme du Sénégal	20 gr. par litre

II. — Préparées par macération de 5 heures

Réglisse (racine)	10 gr. par litre
Gentiane (racine) *Quassia* (bois) *Rhubarbe* (racine)	5 gr. par litre

III. — Préparées par infusion de 1/2 heure

Anis (fruits) *Armoise* (feuilles) *Busserolle* (feuilles) *Capillaire du Canada* *Centaurée* (petite) *Chicorée* (feuilles) *Coca* (feuilles) *Eucalyptus* (feuilles) *Guimauve* (fleurs) — (racines) *Houblon* (cônes) *Lierre terrestre* (feuilles) *Lin* (semences) *Maïs* (styles) *Mauve* (fleurs) *Polygala de Virginie* (racines) *Thé* (feuilles) *Tilleul* (fleurs) *Valériane* (racines) *Violette* (fleurs)	10 gr. par litre

Bouillon blanc (fleurs) *Bourrache* (fleurs) *Camomille* (fleurs) *Coquelicots* (fleurs) *Espèces pectorales* *Hysope* (sommités fleuries) *Mélisse* (feuilles) *Menthe* (feuilles) *Oranger* (feuilles) *Sauge* (feuilles) *Tussilage* (fleurs)	5 gr. par litre
Safran	0 gr. 20 par litre

IV. — Préparées par infusion de 2 heures

Asperge (racines) *Consoude* (racines) *Douce-amère* (tige) *Pin* (bourgeons) *Quinquina* (écorce) *Ratanhia* (racine)	20 gr. par litre

Tisane de Carragaheen, 5 gr. par litre. (Laver d'abord à l'eau froide, puis faire bouillir 10 minutes).

Tisane de chiendent, 20 gr. par litre. (Bouillir 1/2 heure).

Tisane de Lichen d'Islande, 10 gr. par litre. (Rejeter le premier bouillon, laver à l'eau froide, faire bouillir 1/2 heure).

Tisane d'orge, 20 gr. par litre. (Faire bouillir jusqu'à ce que l'orge soit crevé, laisser reposer, passer).

Tisane de Salsepareille, 50 gr. par litre. (Macérer pendant 2 heures, chauffer, et, au moment de l'ébullition, retirer du feu et laisser digérer pendant 2 heures).

Biscuits

B... à la Scammonée dosés à..... 0.60
— — — 0.30
B... à la santonine dosés à..... 0.05

Chocolats

C... en pastilles à la santonine dosés à.... 0.01
par pastille.
C... à la scammonée en croquettes dosés à. 0.30

On recommande souvent les médicaments sous forme de granulés ou de comprimés. Voici une liste des dosages courants de ces médicaments :

Saccharures granulés ou Granulés

Il existe deux granulés mentionnés au codex :

1° Le granulé de cola représentant sensiblement son poids de semences de cola, et est préparé avec de l'extrait de cola.

2° Le granulé de glycérophosphate de chaux, 20 gr. renfermant 1 gr. de glycérophosphate de chaux.

On prépare un grand nombre de granulés médicamenteux, les principaux sont les suivants :

	Dosage par cuillerée à café.
Caféine	0 gr. 10
Cascara sagrada	0 gr. 05
Charbon	1 gr. 50
— *et benzonaphtol*	0 gr. 30
— *naphtolé*	0 gr. 10
— *salolé*	0 gr. 10
Chlorhydrophosphate de chaux	0 gr. 30
Coca (*Extrait hydroalcoolique*)	0 gr. 30
Condurango	0 gr. 30
Glycérophosphate de fer	0 gr. 30
— de lithine	0 gr. 30
— de magnésie	0 gr. 30
— de potasse	0 gr. 30

	Dosage par cuillerée à café
— de soude.....	0 gr. 30
— composé... ââ	0 gr. 05
Hémoglobine.....	0 gr. 30
Kola glycérophosphatée..... ââ	0 gr. 10
Kola et quinium..... ââ	0 gr. 15
Kola et coca..... ââ	0 gr. 15
Lactophosphate de chaux.....	0 gr. 30
Lécithine.....	0 gr. 10
Magnésie.....	1 gr.
Maté (*Extrait hydroalcool*).....	0 gr. 30
Naphtol.....	0 gr. 10
Pepsine.....	0 gr. 30
Quinium.....	0 gr. 30
Quinquina (*Extrait mou*).....	0 gr. 30
Rhubarbe.....	0 gr. 25
Tridigestif (*Diastase, pancréatine, pepsine*).....	0 gr. 10

Granulés effervescents

Antipyrine granulée.....	10 0/0
Benzoate de lithine.....	5 0/0
— de soude.....	5 0/0
Carbonate de lithine.....	5 0/0
Citrate de lithine.....	5 0/0
Glycérophosphate de chaux.....	5 0/0
Pipérazine.....	2.5 0/0
Salicylate de lithine.....	5 0/0

Le citrate de magnésie, et le sel de sedlitz granulés effervescents sont ordinairement dosés à environ 40 0/0 de principe actif. La dose doit donc

être un peu plus du double que celle du principe actif.

Principaux comprimés

	Dosés
Sulfonal	0 gr. 25
—	0 gr. 50
Phénacétine	0 gr. 30
Analgésine	0 gr. 25
—	0 gr. 50
Bicarbonate de soude	0 gr. 25
— —	0 gr. 50
— —	1 gr.
Borate de soude	0 gr. 30
Bromhydrate de quinine	0 gr. 25
Bromure de potassium	0 gr. 25
Carbonate de chaux	0 gr. 25
Cascara	0 gr. 50
Chlorate de potasse	0 gr. 30
Chlorhydrate de quinine	0 gr. 25
Chlorydro-sulfate de quinine	0 gr. 25
Hydrate de magnésie	0 gr. 25
KI	0 gr. 50
Ipéca	0 gr. 25
Kola	0 gr. 50
Lithine (carbonate de)	0 gr. 25
— (salicylate de)	0 gr. 25
Permanganate de potasse	0 gr. 25
— —	0 gr. 50
— —	1 gr.
Phénolphtaléine	0 gr. 10
Rhubarbe	0 gr. 25
Saccharine	0 gr. 025

	Dosés à
Salol	0 gr. 25
Salicylate de soude	0 gr. 50
Sublimé	0 gr. 25
—	0 gr. 50
—	1 gr.
Sulfate de quinine	0 gr. 25
Bisulfate	0 gr. 25
Oxycyanure d'hydrargyre (*Guillaumin*)	0 gr. 50

CODEX 1908

POIDS DES GOUTTES

des principaux médicaments liquides inscrits au Codex de 1908

(Température : + 15°)

MÉDICAMENTS :	Nombre de gouttes pour 1 gramme
Acétique (acide) cristallisable, D = 1,0553	LVI
— *dilué*	XXXI
Alcool absolu	LXVIII
— à 95°	LXIV
— à 90°	LXI
— à 80°	LVII
— à 70°	LVI
— à 60°	LIII
Alcoolature d'aconit (*feuilles*)	LIII
Ammoniaque *diluée*	XXIII
— officinale, D = 0,925	XXV
— (acétate d') dissous	XX
Amyle (nitrite d')	LXXIII
Azotique (acide) dilué	XXI
— officinal. D = 1.391	XXIV
Bromhydrique (acide) D = 1.077	XX
Bromure d'éthyle	LXIX
Chlorhydrique (acide) *dilué*	XX
— — officinal, D = 1,171	XXI
Chloroforme *anesthésique* (contenant 5 gr. d'alcool éthylique pour 1000)	LX
Chloroforme rectifié	LIX
Créosote officinale D = 1,085	XLI
Cyanhydrique (acide) dissous (solute contenant *2 gr. d'acide pour 100*)	XXIII

MÉDICAMENTS :	Nombre de gouttes pour 1 litre
Eau distillée	**XX**
Eau distillée de laurier-cerise	XXII
Elixir parégorique	LIII
Essence d'anis	XLII
— de menthe poivrée	LII
— de térébenthine	LVI
Ether alcoolisé	LXXV
— *anesthésique* officinal, D = 0,720	XCIII
Ethyle (bromure d')	LXIX
Eucalyptol	LIII
Fer (perchlorure de) officinal. D = 1,26	XVIII
Huile ou bi-iodure de mercure	L
— de croton	L
— phosphorée au 1/100e	L
Lactique (acide) officinal, D = 1,24	XXXIX
Laudanum de Sydenham	XLIII
Liqueur de Fowler	XXXIV
Méthyle (salicylate de)	XXXVII
Phénol aqueux	XXXVIII
Phosphorique (acide) *dilué*	XX
— — officinal, D = 1,349	XIX
Pyridine	XLI
Soluté d'arsénite de potasse	XXXIV
— officinal de bromoforme	LX
— de digitaline crist. *au 1/1000e*	LVI
— de chlorhydrate de morphine *au 1/50e*	XX
Sulfurique (acide) *dilué*	XX
Teinture d'aconit	LVII
— d'arnica	LIV
— de belladone	LVII
— de camphre	LX
— de cantharide	LVII
— de colchique	LVI
— de digitale	LVII
— de fèves de Saint-Ignace composée	LIV
— d'iode	LXI
— de jusquiame	LVII
— de lobélie	LVII
— de noix vomique	LVII
— d'opium	LVI
— de scille	LVI
— de strophantus	LVII
— de valériane	LIV

TABLEAU DES DOSES MAXIMA

[*N. B. — Sont précédés du signe* * *les médicaments dont la* FORMULE, *et, par suite, la* POSOLOGIE, *ont été modifiées dans l'édition 1908 du Codex*].

DÉNOMINATION DES MÉDICAMENTS :	DOSES MAXIMA en une fois	DOSES MAXIMA par 24 h.
	gr.	gr.
Acétanilide	0,30	1,50
Acétyl-salycilique (acide) [*Aspirine*]	1	6
Aconitine (cristallisée)	0,0002	0 0005
Aconitine (azotate d')	0 0002	0,0005
Alcoolature de *feuilles* d'aconit	1	5
Amyle (nitrite d')	0,20	1.40
Antipyrine	4	8
Apomorphine (et : chlorhydrate d')	0.015	0,015
Arécoline (bromhydrate d')	0,0005	0.0015
Argent (azotate d')	0,03	0,15
Arrhénal	0.20	0.20
Arsénieux (anhydride)	0.005	0.015
Atropine	0,0005	0 001
— (sulfate d')	0,001	0,002
Bromoforme	0,50	1,50
Caféine	0,50	2
Calomel	1	1
Chloral (hydrate de)	4	12
Chloroforme	0,50	3
Cocaïne (chlorhydrate de)	0,05	0,15
Codéine	0,05	0.20
— (phosphate de)	0,075	0,30
Colchicine	0,002	0,004
Conine (bromhydrate de)	0,03	0,15
Créosote	0,50	1,50
Cuivre (sulfate de)	0,75	0,75
* Cyanhydrique (acide) dissous à 2 %	0,10	0,50
Cyanure de mercure	0,01	0,04
— de potassium	0,01	0,04
Diéthylsulfone-diméthylméthane [*sulfonal*]	2	2
Diéthylsulfone-éthylméthylméthane [*Trional*]	2	2
Digitaline cristallisée	0,0003	0,001
Diméthylamino-antipyrine [*Pyramidon*]	1	3
* Eau distillée de laurier-cerise (à 0 g. 10 %)	2	10

DÉNOMINATION DES MÉDICAMENTS :	DOSES MAXIMA en une fois	DOSES MAXIMA par 24 h.
	gr.	gr.
Émétique	0,20	0,60
Ergot de seigle [*poudre d'*]	1	4
Ergotinine	0,001	0,002
Evonymine brune	0,10	0,20
Extrait aleoolique d'aeonit	0,03	0,10
* — — de belladone	0,03	0,10
* — — de eiguë	0,05	0,20
— — de colchique	0,05	0,20
* — — de digitale	0,05	0,20
— — d'evonymus atropurpureus [*évonymine brune*]	0,10	0,20
* Extrait aleoolique de jusquiame	0,10	0,30
* — — de noix vomique (titré à 16 gr. d'alcaloïdes °/₀)	0,04	0,10
Extrait aleoolique de seille	0,20	0,50
Extrait aqueux d'ergot de seigle	1	6
— — d'opium	0,10	0,30
Extrait fluide d'ergot de seigle	1	6
— d'hydrastis	1	4
Fer (arséniate de)	0,05	0,15
Gaïacol	0,50	1,50
— (earbonate de)	0,50	2
Huile de croton	0,05	0,10
Huile de foie de morue (*phosphorée au 10/20.000e*)	20	40
Huile phosphorée *au 1/100e*	0,10	0,20
Hydrastine	0,10	0,30
Hydrastinine (chlorhydrate d')	0,05	0,15
Iodoforme	0,20	1
* Laudanum de Sydenham	2	6
Mercure (benzoate de)	0,01	0,05
— (biehlorure de)	0,02	0,06
— (bi-iodure de)	0,02	0,08
— (cyanure de)	0,01	0,04
— (protochlorure de) [*Calomel*]	1	1
— (proto-iodure de)	0,05	0,20
Méthylarsinate de soude [*Arrhénal*]	0,20	0,20
Morphine (chlorhydrate de)	0,02	0,08
Naphtol-*B*	1	3
Pelletiérine (sulfate de) en solution tannique	0,40	
Phénacétine	1	3

DÉNOMINATION DES MÉDICAMENTS .	DOSES MAXIMA en une fois	DOSES MAXIMA par 24 h.
	gr.	gr.
Phénol	0,10	0,30
Phényle (salicylate de) [*salol*]	1	6
Phosphore	0,001	0,002
Phosphure de zinc	0,008	0,016
Picrotoxine	0,002	0,006
Pilocarpine (azotate de)	0,02	0,05
— (chlorhydrate de)	0,025	0,05
Pipérazine	0,75	3
Plomb (acétate neutre de)	0,10	0,30
Podophylline	0,05	0,20
Potasse (chlorate de)	1	4
Potassium (cyanure de)	0,01	0,04
Poudre d'aconit (racine)	0,10	0,30
— d'aconitine (cristall.) *au 1/100e*	0,02	0,05
— d'azotate d'aconitine *au 1/100e*	0,02	0,05
— d'agaric	0,50	1,50
— de belladone (*feuille*)	0,15	0,50
— de cantharide	0,05	0,15
— de ciguë	0,25	0,75
— de digitale	0,20	1
— de digitaline cristallisée *au 1/100e*	0,03	0,10
— d'ergot de seigle	1	4
— de fèves de Saint-Ignace	0,10	0,30
— de gomme-gutte	0,25	0,50
— d'ipécacuanha	2	2
— d'ipécacuanha opiacée [*poudre de Dower*]	1	4
— de jaborandi	3	3
— de jusquiame	0,20	0,60
— de noix vomique	0,10	0,30
— d'opium	0,20	0,60
— de rue	0,50	1
— de sabine	0,50	1
— de scille	0,25	1
— de stramoine (datura)	0,25	1
— de strophantine *au 1/100e*	0,03	0,10
Pyramidon	1	3
Quassine	0,004	0,012
Résorcine	1,25	5
Salicylate de soude	2	12
Salicylique (acide)	1	4
Salol	1	6

DÉNOMINATION DES MÉDICAMENTS :	DOSES MAXIMA en une fois	DOSES MAXIMA par 24 h.
	gr.	gr.
Santonine	0,10	0,30
* Soluté d'arsénite de potasse [*Liqueur de Fowler*]	0.50	1,50
Soluté officinal de bromoforme	5	15
Soluté de chlorure mercurique [*Liqueur de van Swieten*]	20	60
Soluté de digitaline cristall. au 1/1000e	0,30	1
Soude (arséniate de	0,01	0,02
— (cacodylate de)	0,20	0,20
— (chlorate de)	1	6
Spartéine (sulfate de)	0,05	0,25
Strophantine	0,0003	0,001
Strychnine	0,005	0,015
— (sulfate de)	0,006	0,018
Sulfonal	2	4
* Teinture d'aconit (*racine*) au 1/10e	0,50	1,50
* — de belladone (*feuilles*) au 1/10e.	1	4
— de cantharide au 1/10e	0,50	1,25
* — de colchique (*semences*) au 1/10e	1,50	6
* — de digitale au 1/10e	1,50	5
* — de fève de Saint-Ignace composée (*Gouttes amères de Baumé*)	0,25	1,75
* Teinture d'iode au 1/10e	0,25	1
— de jaborandi	15	15
* — de jusquiame (*feuilles*) au 1/10e	1	4
— de lobélie au 1/10e	1,50	5
— de noix vomique *au 1/10e*	1	5
— d'opium *au 1/10e*	2	6
— de scille	1,50	5
— de strophantus *au 1/10*	0,15	0,60
Théobromine	1	4
Thymol	0,50	4
Trional	2	2
Vératrine officinale	0,002	0,010
Zinc (cyanure de	0,02	0,10
— (sulfate de)	1	1
— (valérianate de)	0,10	0,50

Les doses ainsi indiquées par le Codex représentent les doses applicables à l'adulte. Il est de toute

évidence que, pour l'enfant, il convient de les proportionner selon l'âge. Il ne peut y avoir, à ce sujet, de règle absolue, c'est l'expérience seule qui doit nous guider : certains médicaments sont, proportionnellement et même à dose égale, bien mieux tolérés et bien plus efficaces chez l'enfant que chez l'adulte. La proposition inverse est également exacte. Mais, si le praticien désire s'éviter des ennuis médico-légaux, il peut se conformer aux tables classiques de Gaubius. Personne ne pourra rien lui reprocher ni lui imputer, mais est-ce de la science ou de l'art ? Bien certainement non, à notre avis !

La table de Gaubius donne les proportions suivantes par rapport à la dose de l'adulte :

Au-dessous de	6 mois.....	1/30
—	1 an.....	1/15 à 1/12
—	2 ans.....	1/8
—	3 ans.....	1/6
—	4 ans.....	1/4
—	7 ans.....	1/3
—	14 ans.....	1/2
—	16 ans.....	2/3

Young a traduit les proportions variables de médicaments selon les âges par la formule suivante :

$$\frac{\text{Années}}{\text{Années} + 12} = \frac{X}{Y} \text{ et on ramène } X = 1$$

Par ce moyen, on met au dividende le nombre

d'années, au diviseur, le nombre d'années + la constante 12. Le quotient ainsi obtenu donne les chiffres suivants :

A 1 an	1/13
A 2 ans	1/7
A 3 ans	1/5
A 4 ans	1/4
A 7 ans	10/29
A 14 ans	10/18

D'autres auteurs proposent une méthode très simple : la dose de l'adulte étant représentée par 20/20, on calculera celle des âges différents par autant de vingtièmes qu'il y a d'années d'où :

A 1 an	1/20
A 2 ans	1/10
A 3 ans	1/6
A 4 ans	1/5
A 10 ans	1/2

Gillet conseille comme moyen mnémotechnique de retenir :

A 4 ans, quart de la dose d'adulte.

Table Analytique des Matières

Les Maladies de l'Enfance

Première partie

Pages

Evolution normale de l'enfant. Son alimentation. 9
Allaitement maternel... 9
Dyspepsies par suralimentation dans l'allaitement maternel..... 15
Dyspepsies par hypo-alimentation..... 15
Hoquet..... 16
Allaitement par une nourrice mercenaire..... 16
Allaitement mixte..... 16
Allaitement artificiel.... 17
Sevrage..... 18
Nourriture de 16 mois à 2 ans..... 20
Nourriture vers la fin de la 2e année..... 20
Dentition..... 20
Première dentition..... 20
Dentition de 6 ans..... 21
Dentition de remplacement..... 22
Consultation sur la dentition..... 22
Constipation des bébés.. 23
Puberté..... 24

Deuxième partie

A

Abcès chauds..... 27
Abcès froids..... 28
Abcès rétropharyngiens, et latéropharyngiens.. 30
Abcès sous-cutanés multiples..... 30
Acné..... 31
Adénie..... 32
Adénites aiguës..... 33
Adénites chroniques.... 33
Adénoïdes (Végétations A...)..... 35
Adénopathie trachéo-bronchique..... 36
Albuminurie..... 37
Alopécie..... 37
Amygdalites aiguës..... 38
Amygdal. phlegmoneuse 40
Amygdalite ulcéro-membraneuse..... 41
Amygdalite chronique.. 41
Amygdale (Hypertrophie amygdalienne)..... 41
Amygdale (Kystes épithéliaux de l'A...).... 41
Anasarque..... 42
Anémie..... 42
Anesthésie..... 42
Angines..... 43
Angiomes..... 44
Anorexie..... 44
Anthrax..... 44
Antisepsie intestinale... 45
Aphtes..... 46
Appendicite aiguë..... 46
Appendicite chronique.. 48
Arthrites aiguës..... 49
Arthrites tuberculeuses. 49
Arthristisme..... 49
Arythmie..... 50
Ascite..... 50
Asthme..... 51
Asystolie..... 52
Athrepsie..... 53
Atrophie musculaire.... 53

B

Pages

Balanite..... 54
Bec de lièvre..... 54
Blepharites..... 54
Bouchons de cérumen.. 55
Bronchites aiguës..... 55
Bronchite capillaire.... 57
Bronches (Dilatation des B...)..... 57
Bronchopneumonie..... 58
Brûlures..... 60

C

Céphalée..... 62
Chlorose..... 63
Choléra infantile..... 64
Chorée..... 65
Circoncision..... 66
Cirrhose..... 67
Cirrhose cardio-tuberculeuse..... 67
Cœur..... 68
Coliques hépatiques.... 68
Coliques intestinales.... 69
Conjonctivites..... 69
Constipation..... 70
Convulsions..... 72
Coqueluche..... 73
Cornée..... 77
Corps étrangers..... 78
Coryza..... 79
Coxalgie..... 79
Craniotabes..... 80
Crevasses..... 80
Croissance (Troubles de la C...)..... 81
Croup (v. diphtérie).... 82
Cystite..... 82

D

Diabète..... 83
Diarrhée..... 84
Diarrhée verte infectieuse 85
Diarrhée chronique..... 86
Diphtérie..... 86
Dysenterie..... 92

Pages

Dysidrose..... 93
Dyspepsie..... 94

E

Ecthyma..... 96
Eczéma..... 96
Embarras gastrique.... 99
Emphysème..... 100
Empoisonnements..... 101
Endocardite..... 101
Engelures..... 104
Entérite muco-membraneuse..... 105
Entorse..... 106
Epilepsie..... 106
Epistaxis..... 107
Erysipèle..... 108
Erythèmes..... 109
Erythème induré..... 110
Estomac..... 111

F

Favus..... 111
Fièvre typhoïde..... 112
Fissure anale..... 117
Fistule anale..... 117
Foie (Kystes hydatiques du F...)..... 118
Furoncle..... 118

G

Gale..... 119
Gangrènes cutanées..... 119
Gastralgie..... 119
Gastro-entérites..... 120
Glossite exfoliatrice marginée..... 121
Goitre exophtalmique... 121
Goitre simple kystique . 121
Grenouillette..... 122
Grippe..... 122

H

Hanche (Luxations congénitales de la H...).. 124
Hemiplégie spasmodique. 124

	Pages
Hémoglobinurie	125
Hémophilie	125
Hémoptysies	126
Hémorragies	127
Hernies	128
Herpes	128
Hydrocèle enkystée du cordon	129
Hydrocéphalie	129
Hyperhydrose	130
Hypertrophie du cœur	130
Hystérie	131
I	
Ictère	131
Ichthyose	131
Idiotie	132
Impétigo	132
Incontinence d'urine	133
Indigestion	134
Insolation	134
Insomnie	135
Invagination intestinale	135
L	
Laryngites simples	135
Laryngite striduleuse	136
Lentigo	137
Leucémie	137
Lombricoïdes (Ascaris)	137
Lupus	138
M	
Mal de Pott	139
Maladie d'Addison	139
— de Barlow	139
— de Friedreich	140
— de Hirschprung	140
— de Riga	140
Mastoïdites	141
Mélœna	141
Méninges (Hémorragie méningée)	142
Méningite cérébro-spinale épidémique	142
Méningite tuberculeuse	143
Météorisme	144
Migraine	144
Muguet	145
Myélite	146
Myocardite	146
Myxœdème	147
N	
Nœvus	148
Néphrites	148
Névralgies	150
Noma	150
O	
Obésité	151
Occlusion intestinale	152
Œdème glottique	152
Œsophage	152
Ombilic	153
Onanisme	154
Ongle incarné	154
Oreilles	154
Oreillons	155
Orgelet	155
Ostéomyélite	156
Ostéosarcomes	157
Otites	157
Ovarites	158
Oxyures	159
P	
Paludisme	160
Pancréatites	160
Pansements	160
Paralysie atrophique	162
Paralysie faciale	162
Paralysie infantile	162
Paralysie pseudo-hypertrophique	163
Pelade	164
Pemphigus	164
Péricardites	165
Péritonite aiguë	166
Péritonite tuberculeuse	167
Perlèche	168

	Pages
Pharyngite	168
Phimosis	169
Phlébite des Sinus	169
Phtiriase	160
Pied-bot	170
Piqûres d'insectes	170
Pitiriasis simplex	171
Pitiriasis versicolor	171
Pleurésie	172
Pneumothorax	172
Pneumonie	173
Polypes naso-pharyngiens	174
Polypes du rectum	175
Polyurie	175
Poumon (congestion du)	175
— (gangrène du)	176
Prolapsus du rectum	176
Prurigo	177
Pseudoparalysie syphilitique de Parrot	178
Psoriasis	178
Purpura	178

R

Rachitisme	179
Rage	180
Rate	180
Rhumatisme aigu	181
Rhumatisme chronique	182
Rougeole	182
Rubeole	184

S

Sarcomes	185
Scarlatine	185
Sclérose cérébrale	187
Scoliose	187
Scorbut infantile	188
Scrofule	188
Séborrhée	189
Spasme glottique	190
Spasmes du pylore	190
Stomatites	191
Strabisme	193
Spina-ventosa	191
Sudamina	193
Sueurs fétides des pieds	194
Syphilis	194

T

Tabes dorsal spasmodique	197
Tarsalgie	197
Teigne	197
Terreurs nocturnes	198
Testicule (Ectopie du T.)	198
Tétanie	198
Tétanos	199
Thymus (Hypertrophie du T...)	199
Tœnia	200
Torticolis	201
Tricocéphale	201
Tuberculose	202

U

Urticaire	207

V

Vaccination	208
Varicelle	208
Variole	209
Verrues	210
Vessie (Cystites)	210
Voile du palais (Perforations du V...)	211
Vomissements	211
Vulvovaginite	212

Z

Zona	21

Médicaments formulés

A

Pages

Acétate d'ammoniaque... 215
— de potasse..... 216
Acétopyrine..... 217
Ache 217
— *Extrait aqueux d'A..* 217
— *Sirop des cinq racines* 218
Acide carbonique..... 218
— chlorhydrique..... 218
— phénique..... 219
— tartrique..... 220
— *Sel de Seignette*..... 220
— *Crème de Tartre*.... 221
Aconit..... 222
— *Alcoolature de feuilles à parties égales*.... 222
— *Teinture de racines au 1/10*..... 223
— *Extrait hydro-alcoolique de racines au 1/100*..... 223
— *Sirop de racines d'aconit*..... 224
— *Aconitine*..... 224
Adonis vernalis..... 225
Adrenaline..... 225
Aethone..... 226
Agaric blanc..... 227
Albumine..... 228
Alcool..... 228
Alkekenge..... 229
Aloès..... 229
— *Teinture d'aloès au 1/5*..... 229
— *Elixir de longue-vie*. 230
— *Elixir de Garus*..... 230
Alun..... 231
Ammoniaque..... 231
Anémone pulsatile..... 233
Anis vert..... 233
Antimoine..... 234
— *Oxyde blanc d'A*.... 234
— *Kermès*..... 235
— *Emétique*..... 235

Pages

Antipyrine 236
Apocynum cannabinum... 237
Argent (Nitrate d'A...)... 238
Argyrol..... 238
Aristol..... 239
Arsenic..... 240
— *Acide arsénieux Liqueur de Boudin*... 240
— *Arséniate de soude*.. 240
— *Arsénite de potasse*.. 241
— *Arséniate de vanadium*..... 242
— *Arséniate de fer*..... 243
— *Cacodylate de soude*. 243
— *Méthylarsinate de soude*..... 243
Asafœtida..... 244
— *Poudre d'asafœtida*.. 244
— *Teinture au 1/5*.... 244
Asaprol..... 245
Aspirine..... 246
Aubépine..... 246
Aunée..... 247

B

Badiane..... 247
Baume du Pérou..... 248
Baume de Tolu..... 249
— *Teinture de Tolu*.... 249
— *Sirop de Tolu*..... 249
Belladone..... 250
— *Extrait alcoolique de belladone*..... 250
— *Teinture de feuilles au 1/10*..... 251
— *Sirop de belladone* .. 251
— *Atropine*..... 252
Benzoïque (Acide)..... 253
Benzoate de lithine..... 253
Benzoate de soude..... 254
Benzo-naphtol..... 254
Betol..... 255
Bismuth..... 256

Pages

— *Sous-nitrate de bismuth*..... 256
— *Salicylate de bismuth*. 256
Bistorte..... 257
— *Extrait aqueux de bistorte*..... 257
— *Sirop de bistorte*..... 257
Bleu de methylène..... 258
Boldo..... 258
Borate de soude..... 259
Bouillons lactiques..... 260
Bouleau..... 260
Bourdaine..... 261
Bourrache..... 261
Bromoforme..... 262
Bromure de Potassium... 263
— *Sodium*..... 264
— *Ammonium*..... 264
— *Fer*..... 264
— *Camphre*..... 265
Bromidia..... 266

C

Cachou..... 266
— *Poudre de C*..... 266
— *Teinture de C*..... 266
Cactus grandiflora..... 267
Caféine..... 267
— *Citrate de caféine*.... 268
Calamus..... 269
Camphre..... 270
Calomel..... 270
Camomille..... 271
Cannelle..... 272
— *Teinture de cannelle*. 272
— *Eau de cannelle*..... 272
Capillaire..... 273
Cardamome..... 273
Cascara sagrada..... 273
— *Poudre de C*..... 273
— *Extrait hydro-alcoolique*..... 274
— *Teinture d'écorces au 1/5*..... 274
— *Sirop de cascara*.... 275
Cascarille..... 275
Casse..... 275
Cassis..... 276
Centaurée..... 276
Chanvre indien..... 276
Charbon de peuplier..... 277
Chardon-bénit..... 277
Chaux..... 278
— *Eau de ch*..... 278
— *Chlorure de C*..... 278
Chicorée sauvage..... 279
Chiendent..... 279
Chloral..... 280
— *Sirop de C*..... 280
Chlorate de potasse..... 281
Chloréthone..... 282
Chloroforme..... 283
— *Eau ch*..... 283
Chlorure de zinc..... 284
Citrophène..... 284
Coca..... 285
— *Extrait fluide de C*.. 285
— *Teinture de feuilles*.. 285
Cocaïne..... 286
Cochlearia..... 287
Coings..... 288
Colchique..... 288
— *Teinture de semences au 1/10*..... 288
— *Energétène*..... 288
Collargol..... 289
Colombo..... 290
— *Extrait fluide de C*.. 290
— *Teinture de C*..... 290
Condurango..... 291
Consoude..... 291
Coquelicot..... 292
Coriandre..... 292
Créosote..... 293
— *Carbonate de C*..... 294
— *Phosphite de C*..... 294
— *Tannate de C*..... 294
Cresson..... 295
Cryogénine..... 295

D

Dermatol..... 296

Pages

Digitale 297
— *Poudre de feuilles*... 297
— *Teinture de digitale*. 298
— *Digitaline cristallisée* 298
— *Energétène de d*..... 298
Douce-amère..... 299
Drosera rotundifolia..... 300

E

Eau oxygénée..... 301
Emplâtres..... 301
Entérokinase..... 302
Ergot de seigle..... 302
— *Poudre d'*..... 303
— *Extrait fluide d'* 303
— *Extrait aqueux*..... 303
Eserine..... 305
Espèces pectorales..... 305
Ether sulfurique..... 305
— *Liqueur d'Hoffmann*. 306
Eucalyptus..... 307
— *Infusion de feuilles*. 307
— *Teinture d'E*..... 307
— *Eucalyptol*..... 308
Evonymus..... 309

F

Fer..... 309
— *Fer réduit par l'hydrogène* 310
— *Carbonate de fer*..... 310
— *Protochlorure de fer*. 312
— *Perchlorure de fer*... 312
— *Iodure de fer*..... 313
— *Citrate de fer*..... 314
— *Lactate de fer*..... 315
— *Protoxalate de fer*... 315
— *Tartrate ferrico potassique*..... 316
— *Peptonate de fer*.... 317
— *Arséniate de fer*..... 317
— *Phosphate de fer*.... 318
— *Hémoglobine*..... 318
Ferments lactiques..... 319
Fève de Saint-Ignace.... 320
— (*Gouttes amères de Baumé*) 320

Pages

Formiates alcalins..... 321
— *F... de soude*..... 321
— *F... de chaux*..... 321
Formol... 322
Fougère mâle..... 323
Fucus vésiculosus..... 324
Fumeterre..... 324

G

Gaïacol..... 325
— *Carbonate de g*..... 326
— *Phosphate de g*..... 326
Gallique..... 327
— *Acide g*..... 327
Gélatine..... 327
Gelséminm..... 328
Genêts..... 328
— *Fleurs de*..... 328
— *Extrait aqueux de*... 329
— *Extrait fluide de*.... 329
— *Energétène de*..... 329
— *Sulfate de Spartéine*. 330
Gentiane..... 331
Germandrée..... 331
Gingembre 332
Glycérine..... 332
Glycogène..... 333
Glycyrrhizine..... 333
Gomenol 334
Goudron..... 335
Grenadier..... 335
— *Sulfate de Pelletiérine* 336
— *Tannate de Pelletiérine*..... 336
Grindelia robusta..... 337
— *Extrait fluide de*.... 337
— *Teinture de*..... 338
Gui..... 339
— *Teinture de g*..... 339
— *Energétène de*..... 339
Guimauve 339

H

Hamamelis virginica..... 339
— *Teinture d'*..... 339
— *Extrait fluide d'*..... 340

Pages

Hedonal..... 341
Hématoéthyroïdine..... 342
Hermophényl..... 342
Héroïne..... 343
Houblon..... 343
Huile de cade..... 344
Huile de foie de morue.. 346
— *Phosphorée*..... 347
— *Créosotée*..... 347
— *Iodée*..... 347
— *Sanas*..... 348
— *Cabilline*..... 348
Huile de Haarlem..... 348
Huile iodée..... 349
Huile de ricin..... 350
Hydrate d'amylène..... 351
Hydrastis canadensis.... 351
— *Extrait hydro-alcoolique*..... 351
— *Extrait fluide*..... 352
— *Teinture d'hydrastis au 1/5e*..... 352
Hypophosphite de chaux. 353
— *Sirop d'H*..... 353
Hypnal..... 353
Hyposulfite de soude..... 354
Hysope..... 354

I

Iehthyol..... 355
Iode..... 355
— *Teinture d'iode au 1/10e*..... 355
— *Sirop de raifort iodé*. 356
— *Sirop iodo-tannique*. 357
— *Sirop iodo-tannique phosphaté*..... 357
— *Vin iodo-tannique phosphaté*..... 357
— *Sirop de quinquina iodé*..... 357
— *Sirop de Tormentille iodé*..... 358
Iodure de potassium..... 358
— *Sodium*..... 359

Pages

Iodure *de Fer*..... 359
— *Iodipine*..... 360
Iodoforme..... 360
Ipécacuanha..... 361
— *Poudre de racines*... 361
— *Extrait hydro-alcoolique*..... 362
— *Teinture de racines au 1/10e*..... 362
— *Sirop d'ipéca*..... 363
— *Sirop de Desessartz*.. 364

J

Jaborandi..... 364
— *Teinture au 1/5e*... 365
— *Pilocarpine*..... 365
Jalap..... 365
— *Poudre de J*..... 365
— *Eau-de-vie allemande* 366
Jusquiame..... 366
— *Poudre de J*..... 367
— *Extrait hydro-alcoolique de feuilles sèches au 1/10e*..... 367
— *Teinture de feuilles sèches*..... 368
— *Pilules de Méglin*... 368

K

Kola..... 369
— *Extrait hydro-alcoolique*..... 369
— *Extrait fluide*..... 369
— *Teinture au 1/5e*.... 370
— *Vin de Kola*..... 370
— *Sirop de Kola*..... 370
— *Saccharolé de Kola*.. 371

L

Lab-ferment..... 371
Lactique (Acide)..... 371
Lactose..... 372
Lactucarium..... 372
— *Extrait hydro-alcoolide L*..... 373
— *Sirop de L*..... 373

Pages

Laitue..... 373
Laurier-cerise (Eau de).. 374
Lecithine..... 374
Levure..... 375
Lichen d'Islande..... 375
Lierre terrestre..... 375
Liniments..... 376
— *L. ammoniacal*..... 376
— *L. camphré*..... 376
— *L. chloroformé*..... 376
— *L. de Rosen*..... 376
— *Baume tranquille*... 378
— *Baume Opodeldoch*.. 377
— *Baume de Fioraventi* 377
Liqueur de Labarraque.. 379
Lithine..... 380
— *Benzoate de*..... 380
— *Carbonate de*..... 380
Lobélie enflée..... 381
— *Extrait fluide*..... 381
— *Teinture de feuilles au 1/10e*..... 381
Lycopode..... 382

M

Magnésie..... 383
— *Citrate de M*..... 385
— *Sulfate de M*..... 386
— *Carbonate de M*..... 386
Maïs..... 387
— *Extrait aqueux de M.* 387
— *Sirop de M*..... 387
Maltine..... 388
Manganèse..... 389
— *Carbonate de M*.... 390
— *Protochlorure de M.* 390
— *Sulfate de M*..... 390
— *Bioxyde de M*..... 390
— *Permanganate de potasse*..... 390
Manne..... 391
Mannite..... 392
Mauve..... 393
Mélisse..... 393
Menthe..... 394

Pages

Menthol..... 394
Menyanthe..... 394
Mercure..... 395
— *Onguent mercuriel*.. 395
— *Huile grise*..... 396
— *Mercurium cum creta* 396
— *Mercure colloïdal*.... 397
— *Protoïodure de mercure*..... 398
— *Biiodure de mercure*. 398
— *Sublimé*..... 399
— *Benzoate d'hydrargyre*..... 400
— *Cacodylate iodo-hydrargyrique*..... 400
— *Peptonate de mercure.* 401
— *Lactate de mercure*.. 401
— *Amalgame d'argent*.. 402
— *Amalgame de platine.* 403
Mercuriale..... 404
Métaux ferments..... 404
Monosulfure de sodium.. 405
Mousse de Corse..... 405
— *Poudre de M*..... 406
— *Sirop de M*..... 406
Muguet..... 406
Musc..... 407
— *Teinture de M*..... 407

N

Naphtolate de soude..... 408
Naphtol β..... 408
Nerprun..... 409
Nitrate de potasse..... 410
Nitrite de soude..... 411
Noix vomique..... 411
— *Extrait de N*..... 411
— *Teinture de N*..... 412
— *Sulfate de strychnine* 413
Noyer..... 414
Nucléïne..... 414

O

Opium..... 415
— *Poudre d'O*..... 415

Pages

Opium, *Extrait d'O*..... 416
— *Teinture d'O*..... 416
— *Sirop diacode*..... 417
— *Laudanum*..... 417
— *Elixir parégorique*.. 418
— *Diascordium*..... 419
— *Poudre de Dower*... 420
— *Cynoglosse* (*masse de C...*)..... 421
— *Morphine*..... 421
— *Codéine*..... 422
— *Sirop de C*..... 424
— (*Phosphate de C...*).. 424
— *Héroïne*..... 425
— *Narcéine*..... 425
— *Chlorhydrate d'éthyl-narcéine*..... 425
— *Dioninc*..... 427
Opothérapie..... 428
Oranges..... 429
— *Teinture d'O*..... 429
— *Sirop d'O*..... 430
Oranges amères..... 430
Orthoforme..... 431
Oxyde de zinc..... 432

P

Pancréatine..... 432
Papaïne..... 433
Paraldehyde..... 434
Pêcher..... 435
Penghawar-Djambi..... 435
Pensée sauvage..... 435
Pepsine..... 436
Peptone..... 437
Perborate de soude..... 437
Peroxyde de magnésie... 438
Peroxyde de zinc..... 439
Persulfate de soude..... 439
Phénacétine..... 440
Phénocolle..... 441
Phosphore..... 441
— *Huile phosphorée*... 442
— *Phosphure de zinc*.. 442
— *Acide phosphorique*. 443

Pages

— *Phosphate de chaux*. 443
— *Lactophosphate de chaux*..... 445
— *Chlorhydrophosphate de chaux*..... 445
— *Hypophosphite de chaux*..... 446
— *Glycérophosphate de chaux*..... 447
— *Phosphate de soude*. 447
— *Phytine*..... 448
Pipérazine..... 449
— *Lycétol*..... 449
Plomb..... 450
— *Eau blanche*..... 450
Podophylle..... 450
Polygala..... 451
Protargol..... 451
Psyllium..... 452
Pyramidon..... 453

Q

Quassia amara..... 453
Quillaya..... 454
Quinquina..... 455
— *Extrait de Q*..... 455
— *Extrait aqueux de Q*. 456
— *Sirop de Q*..... 456
— *Vin de Q*..... 457
— *Teinture de Q*..... 457
Quinine..... 458
— *Sulfate de Q*..... 458
— *Chlorhydrate de Q*... 459
— *Bromhydrate de Q*.. 459
— *Valérianate de Q*.... 460
— *Lactate de Q*..... 460
— *Aristochine*..... 460
— *Euquinine*..... 461

R

Raifort..... 461
Ratanhia..... 461
— *Extrait de R*..... 461
— *Teinture de R*..... 462
— *Sirop de R*..... 463

Pages

Réglisse..... 463
Résorcine..... 463
Rhubarbe..... 464
— *Poudre de R*..... 464
— *Extrait de R*..... 465
— *Teinture de R*..... 465
Rhus aromatica..... 466
Romarin..... 467
Ronce..... 467
Rose..... 467

S

Salicylate de soude..... 467
Salipyrine..... 468
Salol..... 468
Salophène..... 470
Salsepareille..... 471
— *Extrait de S*..... 471
— *Extrait fluide*..... 471
— *Sirop de Cuisinier*.. 471
Sapin..... 472
Saponaire..... 472
Sauge..... 472
Saule..... 473
Scammonée..... 473
Scille..... 474
— *Poudre de S*..... 474
— *Extrait de S*..... 475
— *Teinture de S*..... 475
— *Oxymel scillitique*... 476
— *Vin de scille composé* 477
Semen-contra..... 477
— *Santonine*..... 477
Séné..... 478
— *Poudre de S*..... 478
— *Poudre de réglisse composée*..... 479
— *Extrait fluide de S*.. 479
— *Teinture de feuilles au 1/5e*..... 480
Seneçon..... 480
Serpolet..... 481
Sérums médicamenteux.. 481
Sérums antitoxiques et anti-microbiens..... 482

Pages

Simarouba..... 482
Soude..... 482
— *Bicarbonate de S*.... 483
— *Sulfate de S*..... 484
— *Citrate de S*..... 485
Soufre..... 485
Stérésol..... 486
Stovaïne..... 486
Stramoine..... 487
Strontium (Lactate de S.) 488
Strophantus..... 488
— *Teinture de S*..... 488
— *Extrait de S*..... 489
Sulfonal..... 490
Sureau..... 490

T

Tamarin..... 490
Tannalbine..... 491
Tannigène..... 492
Tannin..... 492
Tannoforme..... 493
Térébenthine..... 494
— *Essence de T*..... 494
— *Sirop de T*..... 495
Terpine..... 495
Tilleul..... 497
Théobromine..... 497
— *Théobromose*..... 498
Thiocol..... 498
Thym..... 499
Thyminique (Acide)..... 499
Thymol..... 500
Tormentille..... 500
Trinitrine..... 501
Trional..... 501
Tussilage..... 502

U

Ulmarène..... 502
Uréthane..... 503
Urotropine..... 503
Uva-ursi..... 504

V

Valériane..... 504

Pages

— *Poudre de V*..... 504
— *Extrait de V*..... 505
— *Sirop de V*..... 505
— *Teinture de V*..... 506
— *Valérianate d'ammoniaque*..... 506
— *Valérianate d'ammoniaque liquide*..... 507
— *Valérianate de quinine*..... 507
— *Valérianate de zinc*.. 507
— *Energétène de valériane*..... 508
Vanadate de soude..... 508
Vanadine..... 509
Vanille..... 509
— *Teinture de N*..... 509
— *Vanilline*..... 510
Véronal..... 510
Viburnum prunifolium... 510

Parallèle entre les Codex 1884 et 1909... 513

Pages

Mémorandum..... 515
— *Eaux*..... 515
— *Pâtes*..... 516
— *Pommades*..... 517
— *Sirops*..... 520
— *Tablettes*..... 526
— *Tisanes*..... 527
— *Biscuits*..... 530
— *Chocolats*..... 530
— *Saccharures granulés* 531
— *Granulés effervescents* 532
— *Principaux comprimés*..... 533

Codex 1908..... 535
— *Poids des gouttes*.... 535
— *Tableau des doses maxima*..... 537

Table analytique des matières..... 543

Avant Propos..... I à IV



GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — HERBIN, MONTLUÇON

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY

PRIX ORFILA - PRIX DESPORTES - ACADÉMIE de MÉDECINE

DIGITALINE
cristallisée
NATIVELLE

Agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES *1/4 milligr.* (Gr. blancs).
GRANULES *1/10e* — (Gr. roses).
SOLUTION *au millième.*
AMPOULES (*1/4 milligr.*)

Dosage rigoureux

Echant^ons : Laboratoire NATIVELLE
24, Place des Vosges, Paris.

ELIXIR DU DR MIALHE
à l'Extrait complet des glandes pepsiques
Conservation parfaite du pouvoir peptonisant

DIGITALINE PETIT-MIALHE
Solution à 1/1000 titrage toujours identique.

AQUINTOL PETIT-MIALHE
Spécifique de la Coqueluche

Pharmacie MIALHE, *8, rue Favart, 8, PARIS*

PRODUITS ROBIN

PEPTONATE de FER ROBIN

(GOUTTES, VIN, ELIXIR)

Contre : **Chlorose, Anémie**

Véritable fer assimilable. Il ne donne aucune réaction bleue avec le ferri ou ferrocyanure.

DOSE : 5 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau, de vin ou de lait, commencer par 5 gouttes et augmenter progressivement de 2 gouttes par jour suivant le cas.

IODONE ROBIN

(IODO-PEPTONE) — *Gouttes au Peptonate d'Iode*

Artério-Sclérose

Asthme, Syphilis, Rhumatismes

Iode organique assimilable, donne des résultats surprenants

Ne donne aucune réaction bleue avec l'empois d'amidon, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'iode en liberté.

DOSE : Depuis 5 gouttes jusqu'à 120 gouttes par jour. — 20 gouttes égalent 1 gramme iodure de potassium.

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

(Granulé. — Comprimés pour les Diabétiques. — Injectable)

Contre : **Rachitisme**

Nutritif du système nerveux et osseux, très efficace pendant la grossesse, l'allaitement la croissance chez les enfants et l'affaiblissement chez les vieillards.

Véritable sel saponifié, chimiquement pur, assimilable

DOSE : 2 ou 3 cuillerées-mesures par repas.

Vente en Gros : **13, Rue de Poissy, PARIS**

DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

Sinapisme Rigollot

Il est plus propre, plus énergique et plus facile à employer que le Cataplasme de farine de Moutarde. Il se conserve plus longtemps et, comme en attendant l'arrivée du médecin, on peut l'appliquer sans danger; **il est prudent d'en avoir toujours chez soi.**

Le **SINAPISME RIGOLLOT** appelle vigoureusement le sang à la peau et dégage ainsi le cœur, les poumons, le cerveau et la gorge, dès le premier signe de **Congestion Cérébrale**, d'**Attaque d'Apoplexie**, de **Bronchite**, de **Fluxion de Poitrine.** Il favorise l'**Eruption tardive** de la **Rougeole** et de la **Scarlatine.** Il arrête souvent les **Accès de Goutte** ou de **Rhumatisme chronique**, et calme très souvent aussi les **Douleurs névralgiques.**

Le **SINAPISME RIGOLLOT** peut s'appliquer sur n'importe quel point du corps, on le mettra aux mollets et aux cuisses pour les grandes personnes et à la plante des pieds aux enfants. En le recouvrant d'une feuille de papier de soie, on adoucit beaucoup son action.

Se vend en boîtes de 10 Feuilles

S'assurer que chaque boîte, chaque feuille et prospectus portent bien *la Signature en rouge de l'inventeur* F. Rigollot

Vente en Gros: 24, Avenue Victoria, PARIS.

Collection des Ouvrages

"CONSULTATIONS ET FORMULAIRE"

Année 1908.— Consultations et Formulaire de Thérapeutique obstétricale, par les Docteurs P. RUDAUX, accoucheur des hôpitaux de Paris, et P. CARTIER, chef de laboratoire de la Faculté de Médecine à la Maternité de Beaujon. Vol. 340 pages, in-18 relié.
Prix (franco de port)..... **4** fr. **50**

Année 1910.— Consultations et Formulaire de Thérapeutique infantile, par le Docteur M. Deguy, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de laboratoire à l'hôpital des enfants malades. Vol. 550 pages, in-18 rel. Prix (franco de port)..... **7** fr.

A PARAITRE EN 1910 :

Consultations et Formulaire de Thérapeutique oto-rhino-laryngologique, par le Docteur H. BOURGEOIS, oto-rhino-laryngologiste des Hôpitaux de Paris.

Consultations et Formulaire de Thérapeutique médicale (*Cœur-Vaisseaux-Reins*), par le Docteur G. E. PAPILLON, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien médecin consultant de l'hôpital Lariboisière.

Consultations et Formulaire de Thérapeutique gynécologique, par le Docteur A. SÉNÉCHAL, chirurgien-adjoint, à la Maison départementale de la Seine.

Consultations et Formulaire de Thérapeutique médicale, (*Estomac et Intestins*), par le Docteur Emile BOIX, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de laboratoire de la Faculté.

Librairie Médicale et Scientifique

Em. LE FRANÇOIS

9 et 10, Rue Casimir Delavigne

PLACE DE L'ODÉON

(Près la Faculté de Médecine et le Luxembourg)

PARIS (VIe)

LIVRES DE MÉDECINE, PHARMACIE

Sciences Naturelles, etc.

d'Occasion ou Neufs avec fortes remises

Expédition franco de port et d'emballage en France et à l'Etranger.

ACHAT ET ÉCHANGE

aux meilleures conditions

des Ouvrages qui ont cessé de plaire.

Catalogue franco sur demande.

Chemins de fer de Paris à Lyon

ET

à la Méditerranée

STATIONS HIVERNALES

(NICE, CANNES, MENTON, etc...)

PARIS-LA COTE D'AZUR en 13 heures

par le train extra-rapide de nuit ou par le train "*Côte-d'Azur rapide*" (1re classe)

Billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e *et* 3e *classes, valables* 33 *jours*, délivrés du 15 octobre au 15 mai, dans toutes les gares P.-L.-M. aux familles d'au moins 3 personnes, pour: **CASSIS LA CIOTAT, ST-CYR LA-CADIÈRE, BANDOL, OLLIOULES SANARY, LA SEYNE, TAMARIS-SUR-MER, TOULON, HYÈRES** et toutes les gares situées entre **ST RAPHAEL-VALESCURE, GRASSE, NICE** et **MENTON** inclusivement. — Minimum de parcours simple : 150 kilomètres.

PRIX : Les deux premières personnes paient le plein tarif, la 3e personne bénéficie d'une réduction de 50 %, la 4e et chacune des suivantes d'une réduction de 75 %.

Faculté de prolongation de une ou plusieurs périodes de 15 jours, moyennant supplément de 10 % pour chaque période.

ARRÊTS FACULTATIFS

Demander les billets quatre jours à l'avance à la gare de départ.

Des trains rapides et de luxe composés de confortables voitures à boggies desservent pendant l'hiver les stations du Littoral.

CHEMINS DE FER DU NORD

Paris-Nord à Londres

(Viâ CALAIS ou BOULOGNE)

CINQ services rapides quotidiens dans chaque sens

VOIE LA PLUS RAPIDE

Services officiels de la poste (Viâ CALAIS)

La Gare de Paris-Nord, située au centre des affaires, est le point de départ de tous les grands express européens pour l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Japon, la Suisse, l'Italie, la Côte d'Azur, l'Egypte, les Indes et l'Australie.

CARNETS DE VOYAGES CIRCULAIRES

à prix réduits

en FRANCE et à l'ÉTRANGER

Avec itinéraire tracé au gré des voyageurs.

Chemins de fer de l'Ouest-Etat

PARIS A LONDRES

viâ **Rouen**, **Dieppe** et **Newhaven**

par la gare Saint-Lazare

Services rapides de jour et de nuit tous les jours

(*dimanches et fêtes compris*) **et toute l'année**

Trajet de jour en 8 heures 1/2 (1re et 2e classes seulement)

GRANDE ÉCONOMIE

Billets simples valables pendant 7 jours : 1re classe, 48 fr. 25 ; 2e cl., 35 fr ; 3e cl., 23 fr. 25.

Billets d'aller et retour valables pendant un mois : 1re cl., 82 fr. 75 ; 2e cl . 58 fr. 75 ; 3e cl., 41 fr. 50.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans supplément de prix à toutes les gares situées sur le parcours.

Départs de Paris Saint-Lazare, 10 h 20 matin et 9 h. 20 soir.

Arrivées à Londres : London-Bridge, 7 h. soir et 7 h. 30 matin ; Victoria, 7 h. soir et 7 h. 30 matin

Départs de Londres : London Bridge, 10 h. matin et 9 h. 10 soir ; Victoria, 10 h. matin et 9 h. 10 soir

Arrivées à Paris-St-Lazare, 6 h. 41 soir et 7 h. 05 matin.

Les trains du service de jour entre Paris et Dieppe, et vice-versa, comportent des voitures de 1re classe et de 2e classe à couloir avec W. C. et toilette, ainsi qu'un Wagon-Restaurant ; ceux du service de nuit comportent des voitures à couloir des trois classes avec W. C. et toilette. La voiture de 1re classe à couloir des trains de nuit comporte des compartiments à couchettes (supplément de 5 fr. par place). Les couchettes peuvent être retenues à l'avance aux gares de Paris et de Dieppe moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette.

La Compagnie de l'Ouest-Etat envoie franco sur demande affranchie adressée au Service de la Publicité, 20, rue de Rome, à Paris, un bulletin spécial du service de Paris à Londres.

207, Boul[d] Pereire, PARIS.

URODONAL

Dissout l'Acide urique

Granulé effervescent :
3 cuillerées à café par jour à prendre entre les repas, dans un verre d'eau. 10 jours par mois.

C[ne] Acad de Méd. 10 Nov. 1908.
5 fois plus actif que la Pipérazine.
37 fois plus actif que la Lithine.
Méd d'Or Expos. Franco-Britannique.

Constipation, Entérites

JUBOL

rééduque l'intestin

(Académie des Sciences)

(Agar-agar, extraits biliaires, extraits complets de toutes les glandes intestinales.)

207, Boul[d] Pereire, Paris.

ELIXIR DU Dr MIALHE

à l'extrait complet des glandes pepsiques
Conservation parfaite du pouvoir peptonisant.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution à 1/1000 titrage toujours identique.

AQUINTOL PETIT-MIALHE

Spécifique de la Coqueluche.

Pharmacie **MIALHE**, 8, rue Favart, 8, **PARIS**

RECONSTITUANT
DU
SYSTÈME NERVEUX

NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Avenue Victoria, 6
PARIS
ET PHARMACIES.

Rapport favorable de l'Académie de Médecine

VINAIGRE PENNÈS

Antiseptique, Cicatrisant, Hygiénique

Purifie l'air chargé de miasmes.
Préserve des maladies épidémiques et contagieuses.
Précieux pour les soins intimes du corps.
Exiger Marque de Fabrique.— TOUTES PHARMACIES

BAIN DE PENNÈS

Hygiénique, Reconstituant, Stimulant
Remplace ***Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux***, surtout les ***Bains de mer.***
Exiger Marque de Fabrique.— PHARMACIES, BAINS

INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI
DE LA
PARATOXINE
de M. le Professeur LEMOINE, de Lille

L'emploi de la Paratoxine est sans aucun inconvénient, mais son action est d'autant plus efficace que les doses sont mieux appropriées au cas de chaque malade.

Les hautes doses sont, en général, inutiles. Ce dosage de la Paratoxine est le point le plus délicat du traitement ; il doit être approprié à l'état du malade, car, selon qu'il est plus ou moins bien fait, les résultats sont plus ou moins concluants. La dose moyenne chez un adulte présentant une tuberculose du poumon au second degré, avec peu de température, est d'une à trois ampoules d'un centimètre cube par jour.

Une légère élévation thermique est fréquente une heure après l'injection, elle ne dépasse pas quelques dixièmes, il n'y a pas à s'en inquiéter.

La première série d'injections doit durer un à deux mois et, plus exactement, on ne doit les suspendre que lorsque l'amélioration des signes stéthoscopiques est manifeste. Quand les injections sont faites tous les deux jours, il est bon de donner trois pilules, une avant chaque repas, les jours intercalaires. Les périodes pendant lesquelles on cesse les injections sont de durée variable, quinze à trente jours environ, courtes chez les sujets qui engraissent peu, plus longues chez ceux dont l'embonpoint revient vite. Chez les uns comme chez les autres, l'emploi des pilules est indiqué pendant ces périodes.

La Paratoxine réussit bien chez les *tuberculeux*, mais mal chez les *phtisiques*, c'est-à-dire chez les sujets émaciés et décharnés. Chez ces derniers les injections sont douloureuses et excitantes, les pilules sont préférables à la dose de 3 à 6 par jour, une heure avant les repas.

La Paratoxine employée en pilules donne les mêmes résultats qu'en injections, mais avec beaucoup plus de lenteur. Dans les cas de diarrhée tuberculeuse, il faut élever les doses et donner soit 10 pilules par jour, soit deux ampoules de *Paratoxine B* par la voie buccale, dans de l'eau sucrée ou aromatisée avec de la menthe.

Des guérisons de lupus du nez ont été obtenues par les pulvérisations dans le nez de *Paratoxine B*. Employer également celle-ci pour les lupus de la peau et les abcès, plaies et fistules tuberculeux. Faire en même temps que ce traitement externe un traitement interne par pilules ou injections.

Dans les laryngites, les injections intra-laryngées doivent être faites tous les jours ou tous les deux jours selon les cas.

Chez les enfants au-dessous de 12 ans, les doses doivent être moitié de ce qu'elles sont chez les adultes, sauf exceptions.